

لا يمكن للمرء أن يحصل على المعرفة إلا عندما يتعلم كيف يفكر



الضرب الداخلي والضرب الاتجاهي في الفضاء

رياضيات ٦



فيما سبق:

درست الضرب الداخلي
لمتجهين في المستوى .
الدرس (1-3)



الآن:

- أجد الضرب الداخلي
لمتجهين، والزاوية بينهما
في الفضاء .
- أجد الضرب الاتجاهي
للمتجهات، وأستعمله في
إيجاد المساحات والحجوم.



المفردات:

الضرب الاتجاهي

cross product

متوازي السطوح

parallelepiped

الضرب القياسي الثلاثي

triple scalar product



لماذا؟

يستعمل طارق المتجهات؛ ليتحقق ممّا إذا كان خطًّا سير طائرتين متوازيين أم لا؛ وذلك بمعرفة إحداثيات نقطتي الإقلاع، ونقطتين تصلان إليهما بعد فترة زمنية معينة.

الضرب الداخلي في الفضاء إيجاد الضرب الداخلي لمتجهين في الفضاء يشبه إيجاد لمتجهين في المستوى، وكما هي الحال مع المتجهات في المستوى، يتعامد متجهان غير صفرين في الفضاء، إذا فقط إذا كان حاصل ضربهما الداخلي صفرًا.



الضرب الداخلي والمتجهات المتعامدة في الفضاء

مفهوم أساسي

يُعرَّف الضرب الداخلي للمتجهين: $a = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$, $b = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ في الفضاء كالتالي:

$a \cdot b = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$ ، ويكون المتجهان غير الصفريين a, b متعامدين ، إذا وفقط إذا كان

$$a \cdot b = 0$$



مثال 1

إيجاد الضرب الداخلي لتحديد المتجهات المتعامدة

أوجد حاصل الضرب الداخلي للمتجهين \mathbf{u}, \mathbf{v} في كلِّ مما يأتي، ثم حدّد ما إذا كانا متعامدين أم لا:

$$\mathbf{u} = \langle 3, -3, 3 \rangle, \mathbf{v} = \langle 4, 7, 3 \rangle \quad (\text{b})$$

$$\mathbf{u} = \langle -7, 3, -3 \rangle, \mathbf{v} = \langle 5, 17, 5 \rangle \quad (\text{a})$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3(4) + (-3)(7) + 3(3)$$

$$= 12 + (-21) + 9 = 0$$

وبما أن $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ ، فإن \mathbf{u}, \mathbf{v} متعامدان.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -7(5) + 3(17) + (-3)(5)$$

$$= -35 + 51 + (-15) = 1$$

وبما أن $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \neq 0$ ، فإن \mathbf{u}, \mathbf{v} غير متعامدين.

تحقق من فهمك



أوجد حاصل الضرب الداخلي للمتجهين u, v في كلِّ مما يأتي، ثم حدِّد ما إذا كانا متعامدين أم لا:

$u = \langle 4, -2, -3 \rangle, v = \langle 1, 3, -2 \rangle$ (1B)

$u = \langle 3, -5, 4 \rangle, v = \langle 5, 7, 5 \rangle$ (1A)




وكما هو في المتجهات في المستوى، إذا كانت θ هي الزاوية بين متجهين غير صفريين a, b في الفضاء فإن $\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a| |b|}$.



الزاوية بين متجهين في الفضاء

مثال 2

أوجد قياس الزاوية θ بين \mathbf{u}, \mathbf{v} ، إذا كان: $\mathbf{u} = \langle 3, 2, -1 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle -4, 3, -2 \rangle$ ، إلى أقرب جزء من عشرة.



$$\text{الزاوية بين متجهين} \quad \cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|}$$

$$\mathbf{u} = \langle 3, 2, -1 \rangle , \mathbf{v} = \langle -4, 3, -2 \rangle \quad \cos \theta = \frac{\langle 3, 2, -1 \rangle \cdot \langle -4, 3, -2 \rangle}{|\langle 3, 2, -1 \rangle| |\langle -4, 3, -2 \rangle|}$$

$$\text{أوجد الضرب الداخلي، وطول كل من المتجهين} \quad \cos \theta = \frac{-4}{\sqrt{14} \sqrt{29}}$$

$$\text{بسّط وحل بالنسبة إلى } \theta \quad \theta = \cos^{-1} \frac{-4}{\sqrt{406}} \approx 101.5^\circ$$


أي أن قياس الزاوية بين \mathbf{u}, \mathbf{v} هو 101.5° تقريبًا.

تحقق من فهمك



(2) أوجد قياس الزاوية بين المتجهين: $u = -4i + 2j + k$, $v = 4i + 3k$ ، إلى أقرب منزلة عشرية.






الضرب الاتجاهي هو نوع آخر من الضرب بين المتجهات في الفضاء، وبخلاف الضرب الداخلي، فإن الضرب الاتجاهي لمتجهين a, b هو متجه وليس عددًا، ويُرمز له بالرمز $a \times b$ ، ويُقرأ a cross b ، ويكون المتجه $a \times b$ عموديًا على المستوى الذي يحوي المتجهين a, b .

إرشادات للدراسة

يكون المستقيم عموديًا على مستوى، إذا كان عموديًا على كل مستقيم يقع في هذا المستوى ويتقاطع معه.



مفهوم أساسي

الضرب الاتجاهي للمتجهات في الفضاء

إذا كان: $a = a_1i + a_2j + a_3k, b = b_1i + b_2j + b_3k$ ، فإن الضرب الاتجاهي للمتجهين a, b

$$a \times b = (a_2b_3 - a_3b_2)i - (a_1b_3 - a_3b_1)j + (a_1b_2 - a_2b_1)k$$



مثال 3 إيجاد الضرب الاتجاهي لمتجهين

أوجد الضرب الاتجاهي للمتجهين: $\mathbf{u} = \langle 3, -2, 1 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle -3, 3, 1 \rangle$ ، ثم بين أن $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ يعامد كلياً من \mathbf{u} , \mathbf{v} .

$$\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{v} = -3\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k} \quad \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -2 & 1 \\ -3 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

قاعدة إيجاد قيمة محدد الدرجة الثالثة


أوجد قيمة محدد الدرجة الثانية

بسّط

الصورة الإحداثية

$$\begin{aligned} &= \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= (-2 - 3)\mathbf{i} - [3 - (-3)]\mathbf{j} + (9 - 6)\mathbf{k} \\ &= -5\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 3\mathbf{k} \\ &= \langle -5, -6, 3 \rangle \end{aligned}$$

ولإثبات أن $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ يعامد كلياً من \mathbf{u} , \mathbf{v} جبرياً، أوجد الضرب الداخلي $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ مع كل من \mathbf{u} , \mathbf{v} .



$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v}$$

$$= \langle -5, -6, 3 \rangle \cdot \langle -3, 3, 1 \rangle$$

$$= -5(-3) + (-6)(3) + 3(1)$$

$$= 15 + (-18) + 3 = 0 \checkmark$$

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u}$$

$$= \langle -5, -6, 3 \rangle \cdot \langle 3, -2, 1 \rangle$$

$$= -5(3) + (-6)(-2) + 3(1)$$

$$= -15 + 12 + 3 = 0 \checkmark$$

بما أن حاصل الضرب الداخلي في الحالتين يساوي صفرًا، فإن $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ عمودي على كل من \mathbf{u} , \mathbf{v} .

تنبيه

الضرب الاتجاهي

يطبق الضرب الاتجاهي على المتجهات في نظام الإحداثيات الثلاثي الأبعاد فقط، ولا يطبق على المتجهات في المستوى الإحداثي.

موضوع الدرس: الضرب الداخلي والضرب الاتجاهي في الفضاء



تطوير - إنتاج - توثيق

تحقق من فهمك



أوجد الضرب الاتجاهي للمتجهين \mathbf{u}, \mathbf{v} في كل مما يأتي، ثم بين أن $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ يعامد كلا من \mathbf{u}, \mathbf{v} :

$\mathbf{u} = \langle -2, -1, -3 \rangle, \mathbf{v} = \langle 5, 1, 4 \rangle$ (3B)

$\mathbf{u} = \langle 4, 2, -1 \rangle, \mathbf{v} = \langle 5, 1, 4 \rangle$ (3A)





مساحة متوازي أضلاع في الفضاء

مثال 4

أوجد مساحة متوازي الأضلاع الذي فيه: $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 5\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ ضلعان متجاوران.

الخطوة 1 أوجد $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$

$$\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 3\mathbf{k}, \mathbf{v} = \mathbf{i} - 5\mathbf{j} + 3\mathbf{k} \quad \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 4 & -3 \\ 1 & -5 & 3 \end{vmatrix}$$

بإيجاد قيمة محددة الدرجة الثالثة

$$= \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -5 & 3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

بإيجاد قيمة محددة الدرجة الثانية

$$= -3\mathbf{i} - 9\mathbf{j} - 14\mathbf{k}$$

الخطوة 2 أوجد طول $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = \sqrt{(-3)^2 + (-9)^2 + (-14)^2}$$

طول متجه في الفضاء

بسّط

$$= \sqrt{286} \approx 16.91$$

أي أن مساحة متوازي الأضلاع في الشكل 1.5.1، تساوي 16.91 وحدة مربعة تقريباً.

تحقق من فهمك




4) أوجد مساحة متوازي الأضلاع الذي فيه: $\mathbf{u} = -6\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$ ضلعان متجاوران.





الضرب القياسي الثلاثي إذا التقت ثلاثة متجهات في مستويات مختلفة في نقطة البداية، فإنها تكوّن أحرفاً متجاورة **لمتوازي سطوح**، وهو عبارة عن مجسم له ستة أوجه، كل وجه منها على شكل متوازي أضلاع كما في الشكل 1.5.2 أدناه، إن القيمة المطلقة للضرب القياسي الثلاثي لهذه المتجهات يُمثّل حجم متوازي السطوح.



الضرب القياسي الثلاثي

مفهوم أساسي

إذا كان: $t = t_1i + t_2j + t_3k$, $u = u_1i + u_2j + u_3k$, $v = v_1i + v_2j + v_3k$

$$t \cdot (u \times v) = \begin{vmatrix} t_1 & t_2 & t_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

فإن الضرب القياسي الثلاثي للمتجهات t, u, v يُعرف كالاتي



مثال 5 حجم متوازي السطوح

أوجد حجم متوازي السطوح الذي فيه: $\mathbf{t} = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 5\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ أحرف متجاورة.

$$\begin{aligned} \mathbf{t} &= 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k} \\ \mathbf{u} &= 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 3\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= \mathbf{i} - 5\mathbf{j} + 3\mathbf{k} \end{aligned} \quad \mathbf{t} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \begin{vmatrix} 4 & -2 & -2 \\ 2 & 4 & -3 \\ 1 & -5 & 3 \end{vmatrix}$$

أوجد قيمة محدّدة المصفوفة من الرتبة 3×3

بسّط

$$\begin{aligned} &= \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -5 & 3 \end{vmatrix} (4) - \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} (-2) + \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} (-2) \\ &= -12 + 18 + 28 = 34 \end{aligned}$$

أي أن حجم متوازي السطوح في الشكل 1.5.2 هو $|\mathbf{t} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})|$ ، ويساوي 34 وحدة مكعبة.


تحقق من فهمك



(5) أوجد حجم متوازي السطوح الذي فيه: $t = 2j - 5k$, $u = -6i - 2j + 3k$, $v = 4i + 3j + k$
أحرف متجاورة.




مسائل مهارات التفكير العليا




(42) **تبرير:** حدّد ما إذا كانت العبارة الآتية صحيحة أحيانًا، أو صحيحة دائمًا، أو غير صحيحة أبدًا، برّر إجابتك .
«لأي متجهين غير صفريين وغير متوازيين، يوجد متجه عمودي على هذين المتجهين».

مسائل مهارات التفكير العليا



(43) تحدُّ: إذا كان: $\mathbf{u} = \langle 4, 6, c \rangle$, $\mathbf{v} = \langle -3, -2, 5 \rangle$ ، فأوجد قيمة c التي تجعل: $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = 34\mathbf{i} - 26\mathbf{j} + 10\mathbf{k}$.

مسائل مهارات التفكير العليا



(44) **تبرير:** فسّر لماذا لا يمكن تعريف الضرب الاتجاهي في المستوى.