



صباح الخير لأصدقاء الصباح ، أتمنى أن تشرق أعينكم بهجة ، وأن تزهر
قلوبكم فرحاً ، وأن يصبح يومكم لطيفاً ورائعاً ..

القطوع الزائدة

رياضياتي هـ

القطع الزائد



المفردات :

الرأسان

vertices

المحور القاطع

transverse axis

المحور المرافق

conjugate axis

القطع الزائد

hyperbola

البؤرتان

foci


المركز

center




والآن :

- أحل معادلات القطوع الزائدة، وأمثلها بيانياً.
- أكتب معادلات القطوع الزائدة.



فيما سبق :

درستُ تحليل القطوع
الناقصة والدوائر
وتمثيل منحنياتها بيانياً.
(الدرس 2-4)




القطع الزائد

لماذا:





يدور مذنب هالي حول الشمس في مسارٍ على شكل قطع ناقص؛ لذا فإنه يعاود الظهور في السماء، بينما توجد مذنبات أخرى لا تظهر إلا مرةً واحدةً فقط؛ وذلك لاقتربها من بعض الكواكب العملاقة كالمشتري مثلاً، وهذا القرب يجعل مسار هذه المذنبات إهليلجياً مفتوحاً من إحدى جهتيه، ويزيد سرعتها بشكل غير طبيعي، ويجعلها تنطلق في الفضاء ولا تعود ثانيةً، ومثل هذه المسارات تُسمى قطعاً زائداً.





تحليل القطع الزائد وتمثيله بيانيًا: القطع الزائد هو المحل الهندسي لجميع النقاط الواقعة في المستوى والتي يكون الفرق المطلق (القيمة المطلقة للفرق) بين بعديها عن نقطتين ثابتتين تسميان (البؤرتين) يساوي مقدارًا ثابتًا.

$$|d_1 - d_2| = |d_3 - d_4|$$




يتكون منحنى القطع الزائد من فرعين منفصلين يحاذيان خطي تقارب، ومركز القطع الزائد هو نقطة منتصف المسافة بين البؤرتين، ورأسا القطع الزائد هما نقطتا تقاطع القطعة المستقيمة الواصلة بين البؤرتين مع كل من فرعي المنحنى.

للقطع الزائد محورًا تماثل هما: **المحور القاطع** (وهو القطعة المستقيمة الواصلة بين الرأسين) ويمر بالمركز، و**المحور المرافق** (وهو القطعة المستقيمة العمودية على المحور القاطع) ويمر بالمركز.





لتكن الأطوال a, b, c كما هو موضح في الشكل أدناه، وتختلف العلاقة بينها عمّا في القطع الناقص، ففي القطع الزائد
 $c^2 = a^2 + b^2$ ، والقيمة المطلقة للفرق بين بعدي أي نقطة على منحنى القطع الزائد عن البؤرتين تساوي $2a$.




إرشادات للدراسة

التمثيل البياني للقطع الزائد

يتميز التمثيل البياني للقطع الزائد بارتباطه بمستطيل متناظر حول محوري تماثل القطع نفسه، وله ضلعان متواجهان طول كل منهما $2b$ ، ويمسان القطع عند رأسيه، وضلعاه الآخران طول كل منهما $2a$ ، وطول كل من قطريه المحمولين على خطي التقارب $2c$.





الصورة القياسية لمعادلة القطع الزائد:

يمكن استعمال تعريف القطع الزائد لإيجاد معادلته كما في القطوع المخروطية الأخرى. افترض أن نقطة $P(x, y)$ على منحنى القطع الزائد الذي مركزه $C(h, k)$ ، ومحوره القاطع أفقي. يوضح الشكل المجاور إحداثيات البؤرتين والرأسين. وبحسب تعريف القطع الزائد فإن الفرق المطلق بين بعدي أي نقطة على المنحنى عن البؤرتين هو مقدار ثابت. لذا فإن $|PF_1 - PF_2| = 2a$. وهذا يعني إما $PF_1 - PF_2 = 2a$ أو $PF_2 - PF_1 = 2a$.

$$PF_1 - PF_2 = 2a$$

صيغة المسافة $\sqrt{[x - (h - c)]^2 + (y - k)^2} - \sqrt{[x - (h + c)]^2 + (y - k)^2} = 2a$

خاصية التوزيع ثم التجميع $\sqrt{[(x - h) + c]^2 + (y - k)^2} - \sqrt{[(x - h) - c]^2 + (y - k)^2} = 2a$

اجمع

$$\sqrt{[(x - h) + c]^2 + (y - k)^2} = 2a + \sqrt{[(x - h) - c]^2 + (y - k)^2}$$

رَبِّع الطرفين، ثم أوجد مفكوك مربع

$$(x - h)^2 + 2c(x - h) + c^2 + (y - k)^2 = 4a^2 + 4a\sqrt{[(x - h) - c]^2 + (y - k)^2} + (x - h)^2 - 2c(x - h) + c^2 + (y - k)^2$$

مجموع (أو الفرق) بين حدين

$$-4a\sqrt{[(x - h) - c]^2 + (y - k)^2} = 4a^2 - 4c(x - h)$$

بسط

$$a\sqrt{[(x - h) - c]^2 + (y - k)^2} = -a^2 + c(x - h)$$

اقسم الطرفين على -4 .

رَبِّع الطرفين

$$a^2[(x - h)^2 - 2c(x - h) + c^2 + (y - k)^2] = a^4 - 2a^2c(x - h) + c^2(x - h)^2$$

الخاصية التوزيعية

$$a^2(x - h)^2 - 2a^2c(x - h) + a^2c^2 + a^2(y - k)^2 = a^4 - 2a^2c(x - h) + c^2(x - h)^2$$

بسط

$$a^2(x - h)^2 - c^2(x - h)^2 + a^2(y - k)^2 = a^4 - a^2c^2$$

الخاصية التوزيعية

$$(a^2 - c^2)(x - h)^2 + a^2(y - k)^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

$$a^2 - c^2 = -b^2$$



$$-b^2(x - h)^2 + a^2(y - k)^2 = a^2(-b^2)$$

اقسم الطرفين على $a^2(-b^2)$.

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

المعادلة القياسية للقطع الزائد الذي مركزه (h, k) هي $\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$ عندما يكون المحور القاطع أفقيًا،

كما تكون في الصورة $\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1$ عندما يكون المحور القاطع رأسيًا.




مفهوم أساسي

خصائص القطع الزائد

المعادلة في الصورة القياسية :

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$



الاتجاه :

المركز :

الرأسان :

البؤرتان :

المحور القاطع :

المحور المرافق :

خطا التقارب :


العلاقة بين a, b, c : $c^2 = a^2 + b^2$ أو

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

طول البعد البؤري : $2C$

المعادلة في الصورة القياسية :

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$



الاتجاه :

المركز :

الرأسان :

البؤرتان :

المحور القاطع :

المحور المرافق :

خطا التقارب :

العلاقة بين a, b, c : $c^2 = a^2 + b^2$ أو

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

طول البعد البؤري : $2C$

المحور القاطع رأسي

(h, k)

$(h, k \pm a)$

$(h, k \pm c)$

$x = h$ وطوله $2a$



$y = k$ وطوله $2b$

$$y - k = \pm \frac{a}{b}(x - h)$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

طول البعد البؤري : $2C$



تحديد خصائص قطع زائد معادلته معطاة على الصورة القياسية

مثال 1

حدّد خصائص القطع الزائد الذي معادلته $1 = \frac{(x+1)^2}{9} - \frac{(y+2)^2}{16}$ ، ثم مثلّ منحناه بيانياً.

المعادلة مكتوبة على الصورة القياسية، حيث:

$$h = -1, k = -2, a = \sqrt{9} = 3, b = \sqrt{16} = 4, c = \sqrt{9 + 16} = 5$$

استعمل هذه القيم لتحديد خصائص القطع الزائد.

الاتجاه: أفقي

المطروح منه هو الحد الذي يحتوي x

المركز: $(-1, -2)$

(h, k)

الرأسان: $(2, -2), (-4, -2)$

$(h \pm a, k)$


البؤرتان: $(4, -2), (-6, -2)$

$(h \pm c, k)$

خطا التقارب: $y + 2 = \frac{4}{3}(x + 1)$, $y + 2 = -\frac{4}{3}(x + 1)$

$$y = \frac{4}{3}x - \frac{2}{3} \quad , \quad y = -\frac{4}{3}x - \frac{10}{3}$$

عيّن المركز والرأسين والبؤرتين، ثم ارسم المستطيل الذي مركزه $(-1, -2)$ وأحد بعديه $2a = 6$ ، والبعد الآخر $2b = 8$ ، وطول كل من قطريه المحمولين على خطي التقارب $2c = 10$. ثم مثلّ القطع الزائد بيانياً بحيث يمس جانبي المستطيل عند رأسيه ويكون محصوراً بين امتداد قطريه.




تنبيه!

عندما تمثّل منحنى القطع الزائد بيانياً تذكر أن المنحنى سيقترّب من خطي التقارب بشكل ملحوظ كلما ابتعد عن الرأسين.

إرشادات للدراسة

اتجاه القطع الزائد

إذا كانت معادلة القطع الزائد على الصورة القياسية، وفيها الحد المطروح منه يحتوي x فإن اتجاه القطع أفقي، أما إذا كان الحد المطروح منه يحتوي y ، فإن اتجاه القطع رأسي.







$$\frac{(y + 4)^2}{64} - \frac{(x + 1)^2}{81} = 1 \quad (1B)$$

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{1} = 1 \quad (1A)$$

تحقق من فهمك



كتابة معادلة قطع زائد على الصورة القياسية

مثال 2

اكتب معادلة القطع الزائد $25y^2 - 16x^2 + 100y + 96x = 444$ على الصورة القياسية، ثم حدّد خصائصه ومثّل منحناه بيانياً.

اكتب المعادلة على الصورة القياسية أولاً.

المعادلة الأصلية

$$25y^2 - 16x^2 + 100y + 96x = 444$$

جمع الحدود المتشابهة

$$(25y^2 + 100y) + (-16x^2 + 96x) = 444$$

حلّ

$$25(y^2 + 4y) - 16(x^2 - 6x) = 444$$

أكمل المربع

$$25(y^2 + 4y + 4) - 16(x^2 - 6x + 9) = 444 + 25(4) - 16(9)$$

حلّ وبسط

$$25(y + 2)^2 - 16(x - 3)^2 = 400$$

اقسم كلا الطرفين على 400

$$\frac{(y + 2)^2}{16} - \frac{(x - 3)^2}{25} = 1$$

المعادلة مكتوبة على الصورة القياسية، حيث:



$$.h = 3, k = -2, a = \sqrt{16} = 4, b = \sqrt{25} = 5, c = \sqrt{16 + 25} \approx 6.4$$

استعمل هذه القيم لتحديد خصائص القطع الزائد.

إرشادات للدراسة


الصورة القياسية

تذكر دائماً عند التحويل من الصورة العامة إلى الصورة القياسية بأن الفرق بين الحدين الجبريين يجب أن يكون 1.



كتابة معادلة قطع زائد على الصورة القياسية

مثال 2



المطروح منه هو الحد الذي يحتوي y .

الاتجاه: رأسي

$$(h, k)$$

المركز: $(3, -2)$

$$(h, k \pm a)$$

الرأسان: $(3, 2), (3, -6)$

$$(h, k \pm c)$$

البؤرتان: $(3, 4.4), (3, -8.4)$




الربط مع تاريخ الرياضيات

هايباتيا (415 - 350)


كانت هايباتيا عالمة في الرياضيات، والعلوم، وفيلسوفة من الإسكندرية في مصر. وقامت بتحرير كتاب (أبولونيوس) في القطوع المخروطية، وأضافت إليه مسائل، وأمثلة توضيحية وقد طُوِّر هذا الكتاب مفاهيم كل من: القطع المكافئ، والقطع الناقص، والقطع الزائد.

$$y - k = \pm \frac{a}{b} (x - h) \quad \text{خطا التقارب: } y - (-2) = \frac{4}{5} (x - 3) \text{ , } y - (-2) = -\frac{4}{5} (x - 3)$$

$$y = \frac{4}{5}x - \frac{22}{5} \text{ , } y = -\frac{4}{5}x + \frac{2}{5}$$





عيّن المركز والرأسين والبؤرتين، ثم ارسم المستطيل الذي مركزه $(3, -2)$ وأحد بُعديّه $2a = 8$ ، والبعد الآخر $2b = 10$ ، وطول كلٍّ من قطريه المحمولين على خطّي التقارب $2c = 12.8$ ، ثم مثل القطع الزائد بيانياً، بحيث يمس جانبي المستطيل عند رأسيه، ويكون محصوراً بين امتداد قطريه.





$$2x^2 - 3y^2 - 12x - 36 = 0 \quad (2B)$$

$$4y^2 - 9x^2 - 8y - 36x = 68 \quad (2A) \quad \text{تحقق من فهمك}$$



كتابة معادلة قطع زائد إذا علم بعض خصائصه

مثال 3

اكتب معادلة القطع الزائد الذي يحقق الخصائص المعطاة في كلِّ ممَّا يأتي:

(a) الرأسان $(-3, 2)$ ، $(-3, -6)$ ، والبؤرتان $(-3, 3)$ ، $(-3, -7)$.

بما أن إحداثيَّي x متساويان للرأسين، فإن المحور القاطع رأسي. أوجد المركز وقيم a ، b ، c .

نقطة منتصف القطعة المستقيمة الواصلة بين الرأسين

$$\text{المركز: } \left(\frac{-3-3}{2}, \frac{-6+2}{2} \right) = (-3, -2)$$


المسافة بين أيٍّ من الرأسين والمركز $a = \sqrt{(-3 - (-3))^2 + (-6 - (-2))^2} = 4$

المسافة بين أيٍّ من البؤرتين والمركز $c = \sqrt{(-3 - (-3))^2 + (3 - (-2))^2} = 5$


$$c^2 = a^2 + b^2 \quad b = 3$$

بما أن المحور القاطع رأسي، فإن a^2 ترتبط بالحد y^2 ؛ لذا فمعادلة القطع الزائد هي:

$$\frac{(y + 2)^2}{16} - \frac{(x + 3)^2}{9} = 1. \text{ انظر الشكل 4.3.1.}$$



الشكل 4.3.1



كتابة معادلة قطع زائد إذا علم بعض خصائصه

مثال 3

(b) الرأسان $(-3, 0)$, $(-9, 0)$ ، وخطا التقارب $y = -2x + 12$, $y = 2x - 12$.

بما أن إحداثيي y للرأسين متساويان، فإن المحور القاطع أفقي.

$$\text{المركز: } \left(\frac{-3-9}{2}, \frac{0+0}{2} \right) = (-6, 0)$$

نقطة المنتصف للقطعة الواصلة بين الرأسين

المسافة بين أي من الرأسين والمركز

$$a = 3$$

ميل خطي التقارب: $\pm \frac{b}{a}$. استعمل الميل الموجب لتجد b .

الميل الموجب لخط التقارب


$$\frac{b}{a} = 2$$

$$a = 3$$

$$\frac{b}{3} = 2$$


بسّط

$$b = 6$$




الشكل 4.3.2

بما أن المحور القاطع أفقي، فإن a^2 ترتبط بالحد x^2 . لذا معادلة القطع الزائد هي $\frac{(x+6)^2}{9} - \frac{y^2}{36} = 1$. انظر الشكل 4.3.2.






تحقق من فهمك **3A** الرأسان $(3, 2)$ ، $(3, 6)$ ، وطول المحور المرافق 10 وحدات.







تحقق من فهمك (3B) البؤرتان $(2, -2)$, $(12, -2)$ ، وخطا التقارب $y = \frac{3}{4}x - \frac{29}{4}$, $y = -\frac{3}{4}x + \frac{13}{4}$.





ويمكن استعمال قيمة الاختلاف المركزي لوصف القطع الزائد، فصيغة الاختلاف المركزي هي نفسها $e = \frac{c}{a}$ لكل من القطعين الناقص والزائد. تذكر أن قيمة الاختلاف المركزي للقطع الناقص تقع بين 0 و 1، لكن قيمة الاختلاف المركزي للقطع الزائد أكبر من 1 دائماً، وكلما زادت قيمته زاد اتساع المنحنى.



الاختلاف المركزي للقطع الزائد

مثال 4

حدّد الاختلاف المركزي للقطع الزائد الذي معادلته $1 = \frac{(y - 4)^2}{48} - \frac{(x + 5)^2}{36}$

حدّد أولاً قيمة c ثم الاختلاف المركزي .

العلاقة بين a, b, c $c^2 = a^2 + b^2$

$a^2 = 48, b^2 = 36$ $c^2 = 48 + 36$



بسّط $c = \sqrt{84}$

الاختلاف المركزي يساوي 1.32 تقريباً.

صيغة الاختلاف المركزي $e = \frac{c}{a}$

$a = \sqrt{48}, c = \sqrt{84}$ $= \frac{\sqrt{84}}{\sqrt{48}}$

بسّط ≈ 1.32




حدّد الاختلاف المركزي للقطع الزائد المعطاة معادلته في كل مما يأتي:

تحقق من فهمك

$$\frac{(y - 2)^2}{15} - \frac{(x + 9)^2}{75} = 1 \quad (4B)$$


$$\frac{(x + 8)^2}{64} - \frac{(y - 4)^2}{80} = 1 \quad (4A)$$





تطبيقات على القطع الزائد

أرصاد: يحتوي نظام كشف الصواعق على مجسّين يحولان الأمواج الضوئية للصاعقة إلى صيغة رقمية تسجل تفاصيل تلك الصاعقة، فإذا وُضع مجسّان للكشف عن الصواعق يبعد أحدهما عن الآخر بمقدار 6 km، بحيث كان المجسّ A شمال المجسّ B. ومض برق صاعقة شرق كل من المجسّين، وكان بعده عن المجسّ A يزيد بمقدار 1.5 km على بعده عن المجسّ B.



(a) اكتب معادلة القطع الزائد الذي تقع الصاعقة على منحناه.

حدّد موقع المجسّين على مستوى إحداثي على أن تكون نقطة الأصل هي منتصف القطعة المستقيمة الواصلة بينهما. وبما أن موقع الصاعقة إلى الشرق من كلا المجسّين، وأقرب إلى المجسّ B، فإن موقعها في الربع الرابع. المجسّان موضوعان عند بؤرتي القطع الزائد، لذا $c = 3$. تذكر أن الفرق المطلق بين بعدي أي نقطة على المنحنى عن البؤرتين هو $2a$ ، وبما أن بعد الصاعقة عن المجسّ A يزيد بمقدار 1.5 km على بعدها عن المجسّ B، فإن $2a = 1.5$ ، أي أن $a = 0.75$. استعمل قيمتي a و c لتجد b .

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \text{العلاقة بين } a, b, c$$

$$3^2 = 0.75^2 + b^2 \quad c = 3, a = 0.75$$


$$8.4375 = b^2 \quad \text{بسّط}$$

المحور القاطع رأسي ومركز القطع الزائد عند نقطة الأصل. لذا فالمعادلة

هي $1 = \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2}$. وعند تعويض قيمتي a^2, b^2 تصبح المعادلة



$1 = \frac{y^2}{0.5625} - \frac{x^2}{8.4375}$. أي أن موقع الصاعقة يمثل نقطة على منحنى القطع

$$\frac{y^2}{0.5625} - \frac{x^2}{8.4375} = 1 \quad \text{الزائد الذي معادلته}$$




الربط مع الحياة

تضرب الصواعق أمكنة على سطح الأرض بما يقارب 100 مرة في الثانية.



تطبيقات على القطع الزائد

مثال 5 من واقع الحياة




(b) أوجد إحداثي موقع الصاعقة إذا حدثت على بعد 2.5 km شرق المجسّين.
 بما أن الصاعقة حدثت على بعد 2.5 km شرق المجسّين فإن $x = 2.5$ ، وموقع الصاعقة أقرب إلى
 المجس B منه إلى المجس A، لذا فإن موقعها في الجزء الأسفل من المستوى الإحداثي. عوّض قيمة x في
 المعادلة، وأوجد y .

$$\text{المعادلة الأصلية} \quad \frac{y^2}{0.5625} - \frac{x^2}{8.4375} = 1$$

$$x = 2.5 \quad \frac{y^2}{0.5625} - \frac{2.5^2}{8.4375} = 1$$

$$\text{حل بالنسبة لـ } y \quad y \approx \pm 0.99$$

وحيث إن موقع الصاعقة في الربع الرابع، لذا فإن قيمة y هي -0.99 تقريبًا، وذلك يعني أن موقع الصاعقة هو
 $(2.5, -0.99)$.




(5) **ملاحة بحرية:** تعطلت سفينة عند نقطة في عرض البحر، بحيث كان الفرق بين بعدي السفينة عن أقرب محطتين إليها 80 ميلاً بحرياً .

(5A) إذا كان موقعاً المحطتين يمثلان بؤرتي قطع زائد تقع السفينة عليه، فاكتب معادلة القطع الزائد عندما تقع المحطتان عند النقطتين $(100, 0)$, $(-100, 0)$.

(5B) أوجد إحداثيي موقع السفينة إذا كانت تقع على المستقيم الواصل بين البؤرتين، وكانت أقرب إلى المحطة التي إحداثياتها $(100, 0)$.

تحقق من فهمك



(36) **تبرير:** افترض أنك أُعطيت اثنتين من خصائص القطع الزائد الآتية: رأسين، بؤرتين، المحور القاطع، المحور المرافق، خطي تقارب. هل يمكنك كتابة معادلة هذا القطع: دائماً أو أحياناً أو غير ممكن أبداً؟

مسائل مهارات التفكير العليا

