

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

رياضيات ٢

التعليم الثانوي
(نظام المقررات)

(البرنامج المشترك)

قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين

يُوزع مجاناً ولا يُباع

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

طبعة ١٤٤٤ - ٢٠٢٢

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
وزارة التعليم
الرياضيات ٢ - البرنامج المشترك - نظام المقررات - كتاب الطالب.
وزارة التعليم. الرياض ، ١٤٣٧ هـ
٢٤٨ ص ٥٢٧ ، ٥٢٧ × ٢١ سم
٩٧٨ - ٦٠٣ - ٣٤٨ - ٥٠٨
ردمك : ٥

١- الرياضيات - كتب دراسية ٢- التعليم الشانوي
السعوية - كتب دراسية أ. العنوان
١٤٣٧ / ١٠٣٥٧ ديوي ٥١٠ ، ٧١٢

رقم الإيداع : ١٤٣٧ / ١٠٣٥٧
ردمك : ٥ - ٣٤٨ - ٥٠٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨

حول الغلاف

تسقط أشعة الشمس المتوازية على الطبق الشمسي فترتد
مكونة زوايا متناهية وأخرى متحالية.
تدرس هذه الزوايا في هذا الصف.



حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



IEN.EDU.SA

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي



FB.T4EDU.COM



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المقدمة

الحمد لله والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تعد مادة الرياضيات من المواد الدراسية الأساسية التي تهيئ للطالب فرص اكتساب مستويات عليا من الكفايات التعليمية، مما يتيح له تنمية قدرته على التفكير وحل المشكلات، ويساعده على التعامل مع مواقف الحياة وتلبية متطلباتها.

ومن منطلق الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بتنمية الموارد البشرية، وعيًا بأهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة، كان توجه وزارة التعليم نحو تطوير المناهج الدراسية وفي مقدمتها مناهج الرياضيات، بدءًا من المرحلة الابتدائية، سعيًا للارتقاء بمخرجات التعليم لدى الطلاب، والوصول بهم إلى مصاف أقرانهم في الدول المتقدمة.

وتتميز هذه الكتب بأنها تتناول المادة بأساليب حديثة، تتوافر فيها عناصر الجذب والتشويق، التي تجعل الطالب يقبل على تعلمها ويفتعل معها، من خلال ما تقدمه من تدريبات وأنشطة متنوعة، كما تؤكد هذه الكتب على جوانب مهمة في تعليم الرياضيات وتعلمها، تتمثل فيما يأتي:

- الترابط الوثيق بين محتوى الرياضيات وبين الموقف والمشكلات الحياتية.
 - تنوع طرائق عرض المحتوى بصورة جذابة مشوقة.
 - إبراز دور المتعلم في عمليات التعليم والتعلم.
 - الاهتمام بالمهارات الرياضية، والتي تعمل على ترابط المحتوى الرياضي وتجعل منه كلامًا متكاملًا، ومن بينها: مهارات التواصل الرياضي، ومهارات الحس الرياضي، وحل المشكلات، ومهارات التفكير العليا.
 - الاهتمام بتوظيف التقنية في الموقف الرياضية المختلفة.
 - الاهتمام بتوظيف أساليب متنوعة في تقويم الطلاب بما يتناسب مع الفروق الفردية بينهم.
- ولمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، فإن المناهج المطورة والكتب الجديدة سوف توفر للمعلم مجموعة متكاملة من المواد التعليمية المتنوعة التي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، بالإضافة إلى البرمجيات والمواقع التعليمية، التي توفر للطالب فرصة توظيف التقنيات الحديثة والتواصل المبني على الممارسة، مما يؤكد دوره في عملية التعليم والتعلم.

ونحن إذ نقدم هذه الكتب لأعزائنا الطلاب، لتأمل أن تستحوذ على اهتمامهم، وتلبي متطلباتهم وتجعل تعلمهم لهذه المادة أكثر متعة وفائدة.

والله ولي التوفيق



الأشكال الرباعية

الفصل
1

11	التهيئة للفصل 1
12	1-1 زوايا المضلع
20	توسيع 1-1 معلم الجداول الإلكترونية: زوايا المضلع
21	1-2 متوازي الأضلاع
29	1-3 تمييز متوازي الأضلاع
37	اختبار منتصف الفصل
38	1-4 المستطيل
44	1-5 المعين والمربيع
52	1-6 شبه المنحرف وشكل الطائرة الورقية
61	دليل الدراسة والمراجعة
65	اختبار الفصل
66	الإعداد للاختبارات
68	اختبار تراكمي

الفهرس

التشابه

الفصل
2

71	التهيئة للفصل 2
72	2-1 المضلعات المتشابهة
80	2-2 المثلثات المتشابهة
89	اختبار منتصف الفصل
90	2-3 المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة
99	2-4 عناصر المثلثات المتشابهة
106	توسيع 2-4 معلم الهندسة: الكسريات
108	دليل الدراسة والمراجعة
111	اختبار الفصل
112	الإعداد للاختبارات
114	اختبار تراكمي

الفصل 3

التحويلات الهندسية و التماشل

الفهرس

117	التهيئة للفصل 3
118	3-1 الانعكاس.....
126	3-2 الإزاحة (الانسحاب).....
132	استكشاف 3-3 معلم الهندسة: الدوران.....
133	3-3 الدوران.....
139	اختبار منتصف الفصل
140	استكشاف 3-4 معلم الحاسبة البيانية: تركيب التحويلات الهندسية
141	3-4 تركيب التحويلات الهندسية
149	3-4 توسيع معلم الهندسة: التبليط
154	3-5 التماشل.....
160	3-6 التمدد
167	دليل الدراسة والمراجعة
171	اختبار الفصل
172	الإعداد للاختبارات
174	اختبار تراكمي

الفصل 4

الدائرة

177	التهيئة للفصل 4
178	4-1 الدائرة ومحيطها
186	4-2 قياس الزوايا والأقواس
194	4-3 الأقواس والأوتار
201	4-4 الزوايا المحيطية
208	اختبار منتصف الفصل
209	4-5 المماسات
216	4-6 القاطع والمماس وقياسات الزوايا
224	4-7 قطع مستقيمة خاصة في الدائرة
230	استكشاف 4-8 معلم الحاسبة البيانية: معادلة الدائرة
231	4-8 معادلة الدائرة
236	دليل الدراسة والمراجعة
241	اختبار الفصل
242	الإعداد للاختبارات
244	اختبار تراكمي
246	الصيغ والرموز

إليك عزيزي الطالب

ستركز في دراستك هذا العام على عدة موضوعات هندسية، تشمل ما يأتي:

- **المنطق الرياضي** واستعماله في البراهين الهندسية والجبرية.
- العلاقات بين **الزوايا والمستقيمات**.
- العلاقات في **المثلث**، وتطابق المثلثات، وتشابهها.
- التحويلات الهندسية والتماثل في الأشكال ثنائية والثلاثية الأبعاد.
- خواص **الأشكال رباعية** ونظريات **الدائرة**.

وفي أثناء دراستك، ستعلم طرائق لحل المسائل الهندسية وتمثيلها بصور متعددة وسوف تفهم لغة الرياضيات وتستعمل أدواتها، وتنمي قدراتك الذهنية وتفكيرك الرياضي.




كيف تستعمل كتاب الرياضيات؟

- اقرأ فقرة **فيما سبق** لتعرف ارتباط هذا الدرس بما درسته من قبل، ولتعرف أفكار الدرس الجديد
اقرأ فقرة **والآن**.
- ابحث عن **المفردات** المظللة باللون الأصفر باللغتين العربية والإنجليزية ، واقرأ تعريف كل منها.
- راجع المسائل الواردة في **مثال** والمحلولة بخطوات تفصيلية؛ لتوضيح أفكار الدرس الرئيسية.
- ارجع إلى **إرشادات للدراسة** حيث تجد معلومات وتوجيهات تساعدك في متابعة الأمثلة محلولة.
- ارجع إلى فقرة **قراءة الرياضيات** ؛ لتنتذر نطق بعض الرموز والمصطلحات الرياضية.
- اربط بين المعنى اللغوي والمعنى الرياضي للمفردة، من خلال فقرة **ربط المفردات**
- **تذكّر** بعض المفردات التي تعلّمتها من قبل ، بالرجوع إلى فقرة **مراجعة المفردات**
- ارجع إلى فقرة **تببيه!** دائمًا لتعرف الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الطلاب حول بعض المفاهيم الرياضية فتجتنبها.
- ارجع إلى **الصيغ والرموز** في آخر الكتاب لتعرف الرموز التي تعلّمتها في المرحلة المتوسطة وما يقابلها في المرحلة الثانوية، ولتعرف أيضًا أهم الصيغ والرموز التي وردت في هذا الكتاب.
- ارجع إلى المثال المشار إليه مقابل بعض التمارين في فقرتي **تأكد** و **تدريب وحل المسائل** ليساعدك على حل هذه التمارين وما شابهها.
- **نُفذ اختبار الفصل** في نهاية كل فصل، بعد أن تراجع أفكار الدرس الرئيسية في **دليل الدراسة والمراجعة** . أو بعد مراجعة ما ذكرته من أفكار في **المطويات**
- استعن بصفحتي **الإعداد للاختبارات** ؛ لتتعرف أنواع أسئلة الاختبارات وبعض طرق حلّها .
- **نُفذ الاختبار التراكمي** في نهاية كل فصل لمراجعة الأفكار الرئيسية للفصل وما قبله من فصول.



الأشكال الرباعية

Quadrilaterals



فيما سبق :

درستُ تصنیف المضلعات ومیّزت خصائصها وطبقتها.

والآن :

- أجد مجموع قیاسات كل من الزوايا الداخلية والخارجية لمضلع، وأستعملها.
- أتعرف خصائص الأشكال الرباعية، وأطبقها.
- أقارن بين الأشكال الرباعية.

لماذا؟

أدوات رياضية :

تُستعمل خصائص الأشكال الرباعية لإيجاد قیاسات زوايا أو أطوال أضلاع، كقياس زوايا الملاعب وتحطیطها.

المطويات

منظم أفكار


الأشكال الرباعية : اعمل هذه المطوية لتساعدك على تنظیم معلوماتك حول الفصل 1 . ابدأ بثلاث أوراق A4 .

٤ أكتب عنوان الفصل وأرقام الدروس، وسجل ملاحظاتك.

٣ ثبّت الأوراق على طول خط الطي.

٢ اطو الأوراق بحيث تكون لحوافها الظاهرة العرض نفسه.

١ ضع 3 أوراق بعضها فوق بعض بحيث تبعد كل ورقة عن الأخرى 2 cm






التهيئة للفصل 1

تشخيص الاستعداد:

أجب عن الاختبار الآتي. انظر المراجعة السريعة قبل الإجابة عن الاختبار.

مراجعة سريعة



مثال 1

أوجد (x, y, z) في الشكل الآتي:

معطى

بالتعويض

بالطرح

بالتبسيط

نظرية الزاوية الخارجية للمثلث

بالتبسيط

نظرية الزاوية الخارجية للمثلث

بالجمع

بالتبسيط

$$\begin{aligned} AC &= BC \\ 9x - 6 &= 7x + 4 \\ 2x &= 10 \\ x &= 5 \\ 124^\circ &= y^\circ + 48^\circ \\ (y) &= 76^\circ \\ 124^\circ &= z^\circ + z^\circ \\ 124^\circ &= 2z^\circ \\ z^\circ &= 62^\circ \end{aligned}$$

مثال 2

إذا كان $A(-2, 5)$, $B(4, 17)$, $C(0, 1)$, $D(8, -3)$ فحدد ما إذا كان \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{CD} متوازيين أو متعامدين أو غير ذلك.

صيغة الميل

$$\begin{aligned} m &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \\ \frac{17 - 5}{4 - (-2)} &= \frac{12}{6} = 2 : \overleftrightarrow{AB} \\ \frac{-3 - 1}{8 - 0} &= \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2} : \overleftrightarrow{CD} \end{aligned}$$

بما أن ميلي المستقيمين غير متساوين، فهما غير متوازيين.

حاصل ضرب ميلي \overleftrightarrow{AB} , \overleftrightarrow{CD}

$$2 \left(-\frac{1}{2} \right) = -1$$

وبما أن حاصل ضرب ميليهما يساوي -1 ، فهما متعامدان.

مثال 3

أوجد المسافة بين النقطتين $J(2, -1)$, $K(7, 1)$, ثم أوجد إحداثيات نقطة متصفق القطعة المستقيمة الواقلة بينهما.

صيغة المسافة

بين نقطتين


بالتعويض

بالتبسيط

صيغة نقطة المنتصف


$$\begin{aligned} JK &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(7 - 2)^2 + (1 - (-1))^2} \\ &= \sqrt{29} \\ \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right) &= \left(\frac{2 + 7}{2}, \frac{-1 + 1}{2} \right) \\ &= (4.5, 0) \end{aligned}$$

اختبار سريع

أوجد قيم x, y في كل مما يأتي مقرّباً إلى أقرب عشرة:

(1)

(3) **مدن**: تمثل موقع كل من الرياض وجدة وأبها رؤوس مثلث كما في الشكل أدناه. إذا كان محيط هذا المثلث 2198 km، فأوجد المسافة الجوية بين كل من المدن جدة، أبها.



حدد ما إذا كان \overleftrightarrow{AB} , \overleftrightarrow{CD} متوازيين أو متعامدين أو غير ذلك في كل مما يأتي:

A(3, 3), B(8, 2), C(6, -1), D(1, 0) (4)

A(4, 2), B(1, -3), C(-3, 5), D(2, 2) (5)

A(-8, -7), B(4, -4), C(-2, -5), D(1, 7) (6)

(7) **حديائق**: صمم مهندس رسمًا لحدائق رياضية الشكل إحداثيات رؤوسها: A(-2, 1), B(3, -3), C(5, 7), D(-3, 4). إذا رسم ممررين يقطعانها \overleftrightarrow{AC} , \overleftrightarrow{BD} , فهل الممران متعامدان؟ فسر إجابتك.

أوجد المسافة بين كل نقطتين، ثم أوجد إحداثيات نقطة متصفق القطعة الواقلة بينهما في كل مما يأتي:

R(2, 5), S(8, 4) (9) J(-6, 2), K(-1, 3) (8)

(10) **مسافات**: وقف شخص على النقطة (20, 80) من

مستوى إحداثي، ورحب في الانتقال إلى كل من V(110, 85) و U(20, 60)، فما أقصر مسافة يمكن أن يقطعها الشخص؟ فسر إجابتك.



زوايا المضلع

Angles of Polygon



رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

فيما سبق:

درستُ أسماء المضلعات
وتصنيفها.
(مهارة سابقة)

والآن:

- أجدُ مجموعة قياسات الزوايا الداخلية لمضلع.
- أجدُ مجموعة قياسات الزوايا الخارجية لمضلع، وأستعمله.


المفردات:

القطر
diagonal



تنتج عاملات النحل اليافعة شمعاً تشكّل بعنية نحلات أخرى على صورة خلايا سداسية. ومع أن سُمك جدران الخلايا 0.1 mm إلا أنها تحمل ثقلاً يعادل 25 مثل وزنها. وتشكل جدران الخلايا الزاوية نفسها عند كل التقاء. وقياس هذه الزاوية يساوي قياس الزاوية الداخلية للسداسي المنتظم.


مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع:



قطر المضلع هو قطعة مستقيمة تصل بين أي رأسين غير متتاليين فيه. رأساً المضلع $PQRST$ غير التاليين للرأس P : هما: R, S ; لذا فالمضلع $PQRST$ له قطران من الرأس P : هما: $\overline{PR}, \overline{PS}$.

لاحظ أن هذين القطرين يقسمان الشكل الخماسي إلى ثلاثة مثلثات.

مجموع قياسات زوايا المضلع يساوي مجموع قياسات زوايا المثلثات التي تتشكل عند رسم جميع الأقطار الممكنة من أحد الرؤوس.



بما أن مجموع قياسات زوايا المثلث 180° , فإنه يمكننا إنشاء جدول والبحث عن نمط لإيجاد مجموع قياسات زوايا أي مضلع محدب.

المضلع	ذو n من الأضلاع	عدد الأضلاع	عدد المثلثات	مجموع قياسات الزوايا الداخلية
مثلث	3	3	1	$180^\circ (1) = 180^\circ$
رباعي	4	4	2	$180^\circ (2) = 360^\circ$
خماسي	5	5	3	$180^\circ (3) = 540^\circ$
سداسي	6	6	4	$180^\circ (4) = 720^\circ$
...		n	$n - 2$	$180^\circ (n - 2)$

مراجعة المفردات

المضلع:
هو شكل مغلق، يتكون من ثلاثة قطع مستقيمة أو أكثر، تلتقي كل قطعة بطرف في قطعتين آخرتين من المضلع، ولا تقع أي قطعتين منها على استقامة واحدة، وتكون رؤوس المضلع هي أطراف القطع المستقيمة فيه.

أضف إلى

مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع


مطوية

نظيرية 1.1 نظرية 1.1

مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع محدب
عدد أضلاعه n يساوي $(n - 2) \cdot 180^\circ$.

مثال:

$$m\angle A + m\angle B + m\angle C + m\angle D + m\angle E = (5 - 2) \cdot 180^\circ = 540^\circ$$



مراجعة المفردات

الزاوية الداخلية:
هي الزاوية المحصورة بين ضلعين متتاليين في مضلع وتقع داخله.

يمكنك استعمال النظرية 1.1 لإيجاد مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع والقياسات المجهولة لزواياه.

مثال 1 إيجاد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع

مثال 1

a) أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية للسباعي المحدب.

السباعي المحدب له سبعة أضلاع. استعمل النظرية 1.1؛ لإيجاد مجموع قياسات زواياه الداخلية.


$$n = 7$$

$$(n - 2) \cdot 180^\circ = (7 - 2) \cdot 180^\circ$$

بالتبسيط


$$= 5 \cdot 180^\circ = 900^\circ$$

إذن فمجموع قياسات الزوايا الداخلية للسباعي المحدب يساوي 900° .



ارسم سباعيًّا محدبًا، واستعمل المنقلة لقياس كل زاوية داخلية مقرًّا إلى أقرب درجة، ثم أوجد مجموع هذه القياسات.

$$128^\circ + 145^\circ + 140^\circ + 87^\circ + 134^\circ + 136^\circ + 130^\circ = 900^\circ \quad \checkmark$$



b) جبر: أوجد قياسات جميع الزوايا الداخلية للرباعي المجاور.

الخطوة 1: أوجد قيمة (x) .

بما أن للشكل الرباعي 4 زوايا، فإن مجموع قياسات زواياه الداخلية يساوي $(4 - 2) \cdot 180^\circ = 360^\circ$.

مجموع قياسات الزوايا الداخلية

$$360^\circ = m\angle A + m\angle B + m\angle C + m\angle D$$

بالتعميض

$$360^\circ = 3x + 90^\circ + 90^\circ + x$$

بتجميع الحدود المتشابهة

$$360^\circ = 4x + 180^\circ$$

بطرح 180° من كلا الطرفين

$$180^\circ = 4x$$

بقسمة كلا الطرفين على 4

$$45^\circ = x$$

الخطوة 2: استعمل قيمة x لإيجاد قياس كل زاوية.

$$m\angle A = 3x$$

$$m\angle B = 90^\circ$$

$$m\angle D = x$$

$$= 3(45^\circ)$$

$$m\angle C = 90^\circ$$

$$= 45^\circ$$

$$= 135^\circ$$

اكتب قياسات الزوايا الداخلية للرباعي، ثم أوجد مجموع هذه القياسات.


$$90^\circ, 90^\circ, 45^\circ, 135^\circ$$

$$90^\circ + 90^\circ + 45^\circ + 135^\circ = 360^\circ \quad \checkmark$$

تحقق من فهتمك



1A) أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية للثماناني المحدب.




1B) أوجد قياسات جميع الزوايا الداخلية للخمساسي المجاور.

مراجعة المفردات

المضلع المحدب:

مضلع يكون قياس أي من زواياه الداخلية أقل من 180° ، ولا يقطع امتداد أي ضلع فيه أي ضلع آخر من أضلاع المضلع.



إرشادات للدراسة

المضلع:

عند ذكر الكلمة مضلع في هذا الفصل فإننا نعني المضلع المحدب.

تحقق من فهتمك



1A) أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية للثماناني المحدب.

1B) أوجد قياسات جميع الزوايا الداخلية للخمساسي المجاور.

المضلعل المنتظم:
هو مضلعل محدب جميع
أضلاعه متطابقة،
وجميع زواياه متطابقة.

تذكّر أنّ جميع الزوايا الداخليّة للمضلعل المنتظم متطابقة. ويمكنك استعمال هذه الحقيقة ونظريّة مجموع قياسات الزوايا الداخليّة للمضلعل لإيجاد قياس الزوايا الداخليّة لأي مضلعل منتظم.

مثال 2 من واقع الحياة قياس الزوايا الداخليّة لمضلعل منتظم




مظلة: في المنظر العلوي للمظللة المجاورة، تشكّل الأعمدة رؤوس مضلعل سداسي منتظم. أوجد قياس الزوايا التي تتشكل عند أي من أركان المظللة.

افهم: المعطيات: منظر علوي لمظللة سداسية منتظم الشكل.

المطلوب: إيجاد قياس الزوايا التي تتشكل عند أي ركن من أركان المظللة.

ارسم شكّلاً يمثل المنظر العلوي للمظللة.



الزاوية التي تتشكل عند أي من أركان المظللة هي زاوية داخليّة لسداسي منتظم.

خطّط: استعمل نظريّة مجموع قياسات الزوايا الداخليّة للمضلعل لإيجاد مجموع قياسات الزوايا الداخليّة للسداسي. وبما أنّ الزوايا الداخليّة للسداسي المنتظم متطابقة، فإنّ قياس كل زاوية داخليّة يساوي ناتج قسمة المجموع على عدد الزوايا.

حل: أولاً: أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخليّة.

صيغة مجموع قياسات الزوايا الداخليّة

$$S = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

$$n = 6$$

$$= (6 - 2) \cdot 180^\circ$$


بالتبسيط

$$= 4 \cdot 180^\circ = 720^\circ$$

ثانياً: أوجد قياس كل زاوية داخليّة.

$$\begin{aligned} \text{بالتعويض} & \frac{\text{مجموع قياسات الزوايا الداخلية}}{\text{عدد الزوايا الداخلية}} = \frac{720^\circ}{6} \\ \text{بالقسمة} & = 120^\circ \end{aligned}$$

إذن قياس الزاوية المتكونة عند كل ركن يساوي 120° .



تحقق: للتحقق من أنّ هذا القياس صحيح، استعمل المسطرة والمنقلة لرسم سداسي منتظم قياس زاويته الداخليّة 120° .
سيرتبط الضلع الأخير ب نقطة البداية لأول قطعة مستقيمة رسمت. ✓

تحقق من فهمك

(2A) **سجاد:** أوجد قياس الزوايا الداخليّة لسجاد على شكل ثماني منتظم.

(2B) **نوافير:** تزيّن النوافير الأماكن العامة، ويقام بعضها على شكل مضلعلات منتظمات: أوجد قياس الزوايا الداخليّة لنافورة على شكل تساعي منتظم.

يمكنك أيضًا استعمال نظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع لإيجاد عدد أضلاع مضلع منتظم إذا علمت قياس زاوية داخلية له.

إيجاد عدد الأضلاع إذا علمت قياس زاوية داخلية

مثال 3

إذا كان قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم يساوي 135° ، فأوجد عدد أضلاعه.

افترض أن عدد أضلاع المضلع يساوي n . وبذلك يكون مجموع قياسات زواياه الداخلية $135n$ ؛ لأن جميع الزوايا الداخلية للمضلع منتظم متطابقة. وبناءً على نظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية يمكن التعبير أيضًا عن مجموع قياسات الزوايا الداخلية بالعبارة $180(n - 2)$.

$$\begin{array}{ll} \text{كتابة معادلة} & 135n = (n - 2) \cdot 180^\circ \\ \text{خاصية التوزيع} & 135n = 180^\circ n - 360^\circ \\ \text{طرح } 180n \text{ من كلا الطرفين} & -45^\circ n = -360^\circ \\ \text{بقسمة كلا الطرفين على } -45 & n = 8 \end{array}$$


إذن للمضلع 8 أضلاع.

تحقق من فهمك


3) إذا كان قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم يساوي 144° ، فأوجد عدد أضلاعه.

مراجعة المفردات


الزاوية الخارجية :
الزاوية الخارجية
لمضلع محدب هي
زاوية محصورة بين
أحد أضلاعه وامتداد
ضلع آخر.




مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمضلع : هل توجد علاقة بين عدد أضلاع مضلع محدب ومجموع قياسات زواياه الخارجية؟ انظر المضلعات أدناه التي أعطي في كل منها قياس زاوية خارجية عند كل رأس.



$$105^\circ + 110^\circ + 105^\circ + 40^\circ = 360^\circ$$



$$65^\circ + 98^\circ + 36^\circ + 50^\circ + 111^\circ = 360^\circ$$



$$120^\circ + 100^\circ + 140^\circ = 360^\circ$$

لاحظ أن مجموع قياسات الزوايا الخارجية بأخذ زاوية واحدة عند كل رأس في كل حالة يساوي 360° . وتقدمنا هذه الملاحظة إلى النظرية الآتية :

إرشادات للدراسة

قياس الزاوية الخارجية :

قياس الزاوية الخارجية
لمضلع منتظم عدد
أضلاعه n يساوي

$$\frac{360^\circ}{n}$$

أضف إلى
مطويتك


مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمضلع

نظرية 1.2

مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمضلع المحدب
بأخذ زاوية واحدة عند كل رأس يساوي 360° .


مثال :

$$m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 + m\angle 4 + m\angle 5 + m\angle 6 = 360^\circ$$



ستبرهن نظرية 1.2 في السؤال 39

مثال 4 إيجاد قياسات الزوايا الخارجية للمضلع



(b) أوجد قياس الزاوية الخارجية للتساعي المنتظم.

تطابق الأضلاع والزوايا الداخلية في التساعي المنتظم وتكون الزوايا الخارجية متطابقة لأن المكملات للزوايا المتطابقة تكون متطابقة أيضًا.

افترض أن قياس كل زاوية خارجية يساوي x ، ثم اكتب معادلة وحلّها.

نظرية مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمضلع


$$9x = 360^\circ$$

$$\text{بقسمة كلا الطرفين على } 9$$

$$x = 40^\circ$$

إذن قياس كل زاوية خارجية للمضلع التساعي المنتظم يساوي 40° .

تحقق من فهمك



(4A) أوجد قيمة x في الشكل المجاور.

(4B) أوجد قياس الزاوية الخارجية لمضلع منتظم ذي 12 ضلعًا.

إرشادات للدراسة

طريقة بديلة:

لإيجاد قياس زاوية

خارجية لمضلع

منتظم يمكنك إيجاد

قياس زاوية داخلية

وطرح هذا القياس من

180° لأن الزاوية

الخارجية والزاوية

الداخلية المرتبطة بها

متكمالتان.



تأكد

المثال 1

أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لكل من المضلعين المحددين الآتيين:

(1) العشاري

أوجد قياسات جميع الزوايا الداخلية لكل من المضلعين الآتيين:



المثال 2

(5) **عجلة دوارة:** العجلة الدوارة في الصورة المجاورة

على شكل مضلع منتظم عدد أضلاعه 15 ضلعًا.

أوجد قياس الزاوية الداخلية له.



المثال 3

إذا كان قياس إحدى الزوايا الداخلية لمضلع منتظم معطى،


فأوجد عدد الأضلاع في كل مما يأتي:

$$170^\circ \quad (7) \quad 150^\circ \quad (6)$$


المثال 4

أوجد قيمة x في كلٍ من الشكلين الآتيين :

(9)



(8)



أوجد قياس الزاوية الخارجية لكلٍ من المضلعين المتظمين الآتيين :

(11) ثُمانٍ

(10) رباعٍ

تدريب وحل المسائل

المثال 1

أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لكلٍ من المضلعات المحدبة الآتية :

(15) ذو 32 ضلعاً


(14) ذو 29 ضلعاً

(13) ذو 20 ضلعاً


(12) ذو 12 ضلعاً

أوجد قياسات جميع الزوايا الداخلية لكلٍ من المضلعات الآتية :


(17)




(16)



(19)



(18)



(20) ما مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع في الشكل المجاور؟



أوجد قياس زاوية داخلية لكلٍ من المضلعات المتقطمة الآتية :

المثال 2

(24) التساعي

(23) العشاري

(22) الخامس

(21) ذو 12 ضلعاً

إذا كان قياس إحدى الزوايا الداخلية لمضلع منتظم معطى، فأوجد عدد الأضلاع في كلٍ مما يأتي :

(28) 156°

(27) 120°

(26) 90°


(25) 60°

المثال 3


أوجد قيمة x في كلٍ من الشكلين الآتيين :

المثال 4

(30)



(29)






تاریخ الیاضیات

أبو كامل شجاع بن أسلم بن محمد بن شجاع 236 - 318 هـ مهندس وعالِم بالحساب، عُرف باسم «أبي كامل الحاسِب»، وعاش في القرن الثالث الهجري، له رسالة في «المضلَّع ذي الزوايا الخمس وذي الزوايا العشر».

أُوجِد قياس زاوية خارجية لـكُلِّ المضلَّعات المُنتظمة الآتية:

(34) ذو 15 ضلعاً



(33) السادس

(32) الخامس

(31) العشاري

(35) تصویر: تشکّل الفتحة التي ينفذ منها الضوء إلى عدسة آلة التصوير في الشكل المجاور مضللاً متظماً ذا 14 ضلعاً.

(a) أُوجِد قياس الزاوية الداخلية مقربة إلى أقرب عشر.

(b) أُوجِد قياس الزاوية الخارجية مقربة إلى أقرب عشر.

أُوجِد قياس زاوية خارجية وزاوية داخلية للمضلَّع المُنتظم المعطى عدد أضلاعه في كلِّ ما يأتي، وقرب إجابتك إلى أقرب عشر:

13 (37)

7 (36)

(38) أثبت أن مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلَّع الثمانِي يساوي 1080° ، دون استعمال صيغة مجموع الزوايا الداخلية للمضلَّع.


(39) برهان: استعمل الجبر لإثبات نظرية مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمضلَّع.

جبر: أُوجِد قياسات جميع الزوايا الداخلية لـكُلِّ المضلَّعين الآتيين :

(40) عشاري قياسات زواياه الداخلية:

$$(x+5)^\circ, (x+10)^\circ, (x+20)^\circ, (x+30)^\circ, (x+35)^\circ, (x+40)^\circ, (x+60)^\circ, (x+70)^\circ, (x+80)^\circ, (x+90)^\circ$$

(41) الخامس الذي قياسات زواياه الداخلية: $(4x-1)^\circ, (2x-8)^\circ, (4x+13)^\circ, (x+9)^\circ$



(42) **تمثيلات متعددة:** سوف تستقصي في هذه المسألة العلاقات بين الزوايا والأضلاع في متوازي أضلاع.

(a) هندسيًا: ارسم زوجين من المستقيمات المتوازية تتقاطع كما في الشكل المجاور، وسمِّي الشكل الرباعي الناتج $ABCD$. ثم كرر هذه الخطوات لتكون شكلين آخرين: $FGHJ$, $QRST$.

(b) جدولياً: أكمل الجدول الآتي :

أطوال الأضلاع وقياسات الزوايا					الشكل الرباعي
$m\angle D$		$m\angle C$		$m\angle B$	$ABCD$
DA		CD		BC	
$m\angle J$		$m\angle H$		$m\angle G$	$FGHJ$
JF		HJ		GH	
$m\angle T$		$m\angle S$		$m\angle R$	$QRST$
TQ		ST		RS	
				QR	

(c) لفظياً: خمن العلاقة بين كل زاويتين متقابلتين في الشكل الرباعي الناتج عن زوجين من المستقيمات المتوازية.


(d) لفظياً: خمن العلاقة بين كل زاويتين متحالفتين في الشكل الرباعي الناتج عن زوجين من المستقيمات المتوازية.

وزارة التعليم

Ministry of Education
2022 - 1444

مسائل مهارات التفكير العليا

(43) **اكتشف الخطأ:** قالت مريم: إنّ مجموع قياسات الزوايا الخارجية للعشاري أكبر منه للسباعي؛ لأنّ عدد أضلاع العشاري أكثر من أضلاع السباعي. وقالت لبني: إنّ مجموع قياسات الزوايا الخارجية لكلا المضلعين متساوٍ. فهل أيٌّ منها ادعاؤها صحيح؟ وضح تبريرك.



(44) **تحدد:** أوجد قيم a, b, c في الشكل السداسي المتظالم $QRSTVX$ المجاور. بـر إجابتك.

(45) **تبرير:** إذا مُدَّ ضلعان لسداسي متظالم بحيث يلتقيان في نقطة خارجه، فهل يكون المثلث الناتج متطابق الأضلاع دائمًا، أو أحياناً، أو لا يمكن أن يكون متطابق الأضلاع أبداً؟ بـر إجابتك.

(46) **مسألة مفتوحة:** ارسم مضلعًا، وأوجد مجموع قياسات زواياه الداخلية مثلاً المجموع الذي أوجدهت؟ بـر إجابتك.


(47) **اكتب:** وضح العلاقة بين المثلثات ونظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع.

تدريب على اختبار


(49) إذا كان مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع مثلثي مجموع قياسات زواياه الخارجية، فما نوع هذا المضلع؟

- C** سداسي
- A** مربع
- D** ثماني
- B** خماسي

(48) **إجابة قصيرة:** الشكل $ABCDE$ خماسي منتظم، والمستقيم ℓ يحوي \overline{AE} . ما قياس $\angle(y)$ ؟





مراجعة تراكمية



(50) **جبر:** اكتب متباعدة تمثل مدى القيم الممكنة لـ x (مهارة سابقة)

بيان في كل مما يأتي أن المثلثين متطابقان، وحدّد حالة التطابق، ثم اكتب عبارة تطابق : (مهارة سابقة)




(51)

استعد للدرس اللاحق

في الشكل المجاور $\ell \parallel m$, $\overline{AC} \parallel \overline{BD}$ ، حدّد جميع أزواج الزوايا التي تصنف وفقاً لما يلي:

(55) زاويتان متبادلتان داخليات.



زوايا المضلع

Angles of Polygon

رابط المدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

من الممكن إيجاد قياسات الزوايا الداخلية والزوايا الخارجية بالإضافة إلى مجموع قياسات الزوايا الداخلية لأي مضلع منتظم عدد أضلاعه n ، وذلك باستعمال برنامج المداول الإلكتروني.

نشاط

صمّم جدولًا إلكترونيًّا باتباع الخطوات الآتية:

- اكتب عنوانين للأعمدة كما في الجدول أدناه.
- أدخل الأرقام 10-3 في العمود الأول بدءً من الخلية A2.
- عدد المثلثات في كل مضلع أقل من عدد أضلاعه بـ 2. اكتب صيغة في الخلية B2 لطرح 2 من كل عدد في الخلية A2 وذلك بوضع المؤشر في الخلية B2 وكتابة $=A2-2$ ثم ضغط **enter**.
- اكتب صيغة في الخلية C2 لحساب مجموع قياسات الزوايا الداخلية. تذكر أن مجموع قياسات زوايا مضلع هي $S = (n-2) \cdot 180^\circ$ ، وذلك بوضع المؤشر في الخلية C2 وكتابة $= B2 * 180$ ثم ضغط **enter**.
- استمر في كتابة صيغ لحساب القيم المشار إليها في الجدول، ثم اسحب هذه الصيغ على القيم حتى الصف 9. سيظهر الجدول في النهاية على النحو الآتي:

المضلعات والزوايا						
	A	B	C	D	E	F
1	عدد الأضلاع	عدد المثلثات	مجموع قياسات الزوايا الداخلية	قياس كل زاوية داخلية	قياس كل زاوية خارجية	مجموع قياسات الزوايا الخارجية
2	3	1	180	60	120	360
3	4	2	360	90	90	360
4	5	3	540	108	72	360
5	6	4	720	120	60	360
6	7	5	900	128.57	51.43	360
7	8	6	1080	135	45	360
8	9	7	1260	140	40	360
9	10	8	1440	144	36	360

تمارين ومسائل :

- 1) اكتب الصيغة التي استعملتها لإيجاد قياس زاوية داخلية للمضلع المنتظم.
- 2) اكتب الصيغة التي استعملتها لإيجاد مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمضلع المنتظم.
- 3) ما قياس كل زاوية داخلية إذا كان عدد الأضلاع 1 أو 2؟
- 4) هل من الممكن أن يكون عدد الأضلاع 1 أو 2؟ وضح إجابتك.

استعمل جدولًا إلكترونيًّا لحل الأسئلة الآتية:





- 5) ما عدد المثلثات في مضلع عدد أضلاعه 17 ضلعاً؟
- 6) أوجد قياس الزاوية الخارجية لمضلع منتظم عدد أضلاعه 16 ضلعاً.
- 7) أوجد قياس زاوية داخلية لمضلع منتظم عدد أضلاعه 115 ضلعاً مقرّباً إجابتك إلى أقرب عشرة تسلية
- 8) إذا كان قياس كل من الزوايا الخارجية 0° ، فأوجد قياس الزاوية الداخلية. وهل هذا ممكّن؟ وضح إجابتك.

متوازي الأضلاع

Parallelogram

رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa**لماذا؟**

يمكن التحكم في ارتفاع مرمى كرة السلة من خلال أذرع خلفية كما في الشكل أدناه. لاحظ أنه كلما تم تعديل الارتفاع، يبقى كل ضلعين متقابلين في الشكل رباعي الذي تشكّله الأذرع متوازيين.



أضلاع متوازي الأضلاع وزواياها: متوازي الأضلاع هو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان. ويرمز لمتوازي الأضلاع بالرمز \square . ففي $\square ABCD$ المبين جانباً $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$, $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ بحسب التعريف.

تقدم النظريات الآتية خصائص أخرى لمتوازي الأضلاع.

فيما سبق:

درست تصنيف المضلعات الرباعية .

(مهارة سابقة)

والآن:

- أتعرف خصائص أضلاع وزوايا متوازي الأضلاع وأطبقها.

- أتعرف خصائص أقطار متوازي الأضلاع وأطبقها.


المفردات:

متوازي الأضلاع
parallelogram

نظريات**خصائص متوازي الأضلاع**


1.3 كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع متطابقان.

مثال: $\overline{JK} \cong \overline{ML}$, $\overline{JM} \cong \overline{KL}$




1.4 كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع متطابقتان.

مثال: $\angle J \cong \angle L$, $\angle K \cong \angle M$




1.5 كل زاويتين متحالفتين في متوازي الأضلاع متكاملتان.

مثال: $x^\circ + y^\circ = 180^\circ$



1.6 إذا كانت إحدى زوايا متوازي الأضلاع قائمة، فإن زواياه الأربع قوائم.


مثال: في $\square JKLM$, إذا كانت $\angle J$ قائمة، فإن $\angle K, \angle L, \angle M$ قوائم أيضاً.



إرشادات للدراسة

رسم الأشكال:

تكتب النظريات بمصطلحات عامة، أما في البرهان فيجب رسم شكل بحيث يمكن من خلاله الإشارة إلى القطع المستقيمة والزوايا بصورة دقيقة.



برهان نظرية 1.4

اكتب برهاناً ذا عمودين للنظرية 1.4.


المعطيات: $\square FGHJ$

المطلوب: $\angle F \cong \angle H, \angle J \cong \angle G$

البرهان:

المبررات	العبارات
(1) معطى.	$\square FGHJ$ (1)
(2) تعريف متوازي الأضلاع.	$\overline{FG} \parallel \overline{JH}, \overline{FJ} \parallel \overline{GH}$ (2)
(3) إذا قطع مستقيم متوازيين مستقيمين متوازيين، فإن كل زاويتين متحالفتين متكاملتان.	$\angle F, \angle J$ (3) متكاملتان.
(4) الزاويتان المكملتان للزاوية نفسها تكونان متطابقتين.	$\angle J, \angle H$ (4) متكاملتان.
	$\angle H, \angle G$ (4) متكاملتان.
	$\angle F \cong \angle H, \angle J \cong \angle G$ (4)

استعمال خصائص متوازي الأضلاع



مثال 1 من واقع الحياة

كرة سلة: في $\square ABCD$ ، إذا كان $AB = 2.5 \text{ ft}$, $m\angle A = 55^\circ$, $BC = 1 \text{ ft}$, فأوجد كلاً مما يأتي، وبرر إجابتك.

DC (أ)

$$\overline{DC} \cong \overline{AB}$$

$$DC = AB$$

$$= 2.5 \text{ ft}$$

$m\angle B$ (ب)

كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع متطابقان

تعريف تطابق القطع المستقيمة

بالتعويض

كل زاويتين متحالفتين في متوازي الأضلاع متكاملتان

$$m\angle B + m\angle A = 180^\circ$$

بالتعويض

$$m\angle B + 55^\circ = 180^\circ$$

بطرح 55° من كلا الطرفين

$$m\angle B = 125^\circ$$

$m\angle C$ (ج)

كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع متطابقتان

$$m\angle C = m\angle A$$


بالتعويض

$$= 55^\circ$$



الربط مع الحياة

الأبعاد القياسية لملاعب كرة السلة هي $94 \text{ ft} \times 50 \text{ ft}$ والارتفاع القياسي للهدف عن الأرض 10 ft .



تحقق من فهمك

1) مرآيا: تُستعمل في مرآة الحائط المبنية جانباً متوازيات أضلاع يتغير شكلها كلما مُدّ الذراع. في $\square JKLM$ ، إذا كان $m\angle J = 47^\circ$, $MJ = 8 \text{ cm}$, فأوجد كلاً مما يأتي:

$m\angle L$ (ب)

LK (أ)

ج) إذا مُدّ الذراع حتى أصبح $m\angle J = 90^\circ$, فكم يصبح قياس كلٍ من $\angle K, \angle L, \angle M$? برر إجابتك.


قطرا متوازي الأضلاع: قطرًا متوازي الأضلاع يتحققان الخصائص الآتىين :

نظريات

قطرا متوازي الأضلاع


أضف إلى

مطويتك



1.7 قطرًا متوازي الأضلاع ينصف كل منها الآخر.

مثال: $\overline{AP} \cong \overline{PC}$, $\overline{DP} \cong \overline{PB}$




1.8 قطرًا متوازي الأضلاع يقسمه إلى مثلثين متطابقين.

مثال: $\triangle ABD \cong \triangle CDB$

سوف تبرهن النظريتين 1.7, 1.8 في السؤالين 26, 28 على الترتيب

مثال 2

خصائص متوازي الأضلاع والجبر



جبر: إذا كان $QRST$ متوازي أضلاع،
فأوجد قيمة كل من المتغيرات الآتية:

x (a)

$$\overline{QT} \cong \overline{RS}$$

$$QT = RS$$

$$5x = 27$$

$$x = 5.4$$

y (b)

$$\overline{TP} \cong \overline{PR}$$

$$TP = PR$$

$$2y - 5 = y + 4$$

$$y = 9$$

z (c)

$$\triangle TQS \cong \triangle RSQ$$

$$\angle QST \cong \angle SQR$$

$$m\angle QST = m\angle SQR$$

$$3z = 33^\circ$$

$$z = 11$$

تحقق من فهمك


قطرا متوازي الأضلاع يقسمه إلى مثلثين متطابقين
العناصر المتناظرة في المثلثات المتطابقة تكون متطابقة

تعريف تطابق الزوايا


بالتعويض

بقسمة كلا الطرفين على 3

أوجد قيمة المتغير في كل من متوازي الأضلاع الآتىين :



(2B)



(2A)

يمكنك استعمال النظرية 1.7 لتحديد إحداثيات نقطة تقاطع قطري متوازي أضلاع في المستوى الإحداثي إذا علمت إحداثيات رؤوسه.

مثال 3 متوازي الأضلاع وال الهندسة الإحداثية

هندسة إحداثية: أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطري $\square FGHJ$ الذي إحداثيات رؤوسه $F(-2, 4)$, $G(3, 5)$, $H(2, -3)$, $J(-3, -4)$.

بما أنّ قطري متوازي الأضلاع ينصف كلّ منهما الآخر، فإنّ نقطة تقاطعهما هي نقطة متصف كلّ من \overline{FH} , \overline{GJ} . أوجد نقطة متصف \overline{FH} التي طرفاها $(2, 4)$, $(-3, -4)$.

$$\begin{aligned} \text{صيغة نقطة المنتصف} \quad & \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right) = \left(\frac{-2 + 2}{2}, \frac{4 + (-3)}{2} \right) \\ \text{بالتبسيط} \quad & = (0, 0.5) \end{aligned}$$

إذن إحداثياً نقطة تقاطع قطري $\square FGHJ$ هما $(0, 0.5)$.

تحقق: أوجد نقطة متصف \overline{GJ} التي طرفاها $(3, 5)$, $(-3, -4)$.

$$\left(\frac{3 + (-3)}{2}, \frac{5 + (-4)}{2} \right) = (0, 0.5) \quad \checkmark$$


تحقق من فهمك

3 هندسة إحداثية: أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطري $\square RSTU$ الذي رؤوسه $R(-8, -2)$, $S(-6, 7)$, $T(6, 7)$, $U(4, -2)$.

يمكنك استعمال خصائص متوازي الأضلاع وأقطاره لكتابه برهانين.

استعمال خصائص متوازي الأضلاع لكتابه برهانين

مثال 4



اكتب برهاناً حراً.

$\square ABDG$, $\overline{AF} \cong \overline{CF}$ المعطيات:

$\angle BDG \cong \angle C$ المطلوب:

البرهان:


من المعطيات $ABDG$ متوازي أضلاع. وبما أنّ الزوايا المتقابلة في متوازي الأضلاع متطابقة، فإنّ $\angle A \cong \angle C$. ومن نظرية المثلث المتطابق الضلعين تكون $\angle BDG \cong \angle C$. ومن خاصيّة التعدي للتطابق تكون $\angle BDG \cong \angle C$.

تحقق من فهمك

4) اكتب برهاناً ذا عمودين.


$\square HJKP$, $\square PKLM$ المعطيات:

$\overline{HJ} \cong \overline{ML}$ المطلوب:



إرشادات للدراسة

التحقق من الإجابة: في المثال 3 ، مثل متوازي الأضلاع على المستوى الإحداثي وعيّن نقطة تقاطع القطرين التي أوجدتها. ارسم القطرين لتجد أنّ نقطة تقاطعهما هي $(0, 0.5)$.







المثال 1 (1) **ملاحة:** يستعمل البحارة مسطرتين متوازيتين، يصل بينهما ذراعان متساويان الطول لتحديد اتجاه إبحارهم، فيضعون حافة إحدى المسطرتين بمحاذاة مسار الإبحار، ثم يحركون المسطرة الأخرى حتى تصل إلى قرص بوصلة مرسوم على الخريطة. تشكّل المسطرتان والذراعان الواثلتان بينهما $\square MNPQ$.

إذا كان $MQ = 2\text{in}$ ، فأوجد NP .

إذا كان $m\angle MNP = 38^\circ$ ، فأوجد $m\angle NMQ$.

إذا كان $m\angle MNP = 128^\circ$ ، فأوجد $m\angle MQP$.

جبر: أوجد قيمة المتغير في كل من متوازي الأضلاع الآتيين :





المثال 3 (4) **هندسة إحداثية:** أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطرى $\square ABCD$ الذي رؤوسه $A(-4, 6)$, $B(5, 6)$, $C(4, -2)$, $D(-5, -2)$.

برهان: اكتب برهاناً من النوع المحدد في كل من السؤالين الآتيين :

(6) برهاناً ذات عمودين .

المعطيات: $ABCH$, $DCGF$ متوازي أضلاع، $\angle A$ قائمة.

المطلوب: $\angle A \cong \angle F$. $\angle B, \angle C, \angle D$ قوائم. (النظرية 1.6)



المثال 4


برهان: اكتب برهاناً من النوع المحدد في كل من السؤالين الآتيين :

(5) برهاناً حرّاً .

المثال 5

المثال 1 استعمل $\square PQRS$ المبين جانباً لإيجاد كل مما يأتي :

QR (8)	$m\angle R$ (7)
$m\angle S$ (10)	QP (9)



المثال 11 **ستائر:** في الشكل المقابل صورة لشراوح ستائر النوافذ المتوازية دائمًا؛

لتسمح بدخول أشعة الشمس. في $\square FGHJ$ ، إذا كان

$FJ = \frac{3}{4} \text{ in}$, $FG = 1 \text{ in}$, $m\angle JHG = 62^\circ$ ، فأجد كلاً مما يأتي :


GH (b)

JH (a)


$m\angle FJH$ (d)

$m\angle JFG$ (c)


المثال 2 جبر: أوجد قيمتي y, x في كل من متوازيات الأضلاع الآتية :



(14)




(13)



(12)

هندسة إحداثية: أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطرى $\square WXYZ$ المعطاة رؤوسه في كل من السؤالين الآتى :


$$W(-4, 5), X(5, 7), Y(4, -2), Z(-5, -4) \quad (16) \quad W(-1, 7), X(8, 7), Y(6, -2), Z(-3, -2) \quad (15)$$



برهان: اكتب برهاناً ذا عمودين فيما يأتي :

(17) المعطيات: $\square WXTV, \square ZYVT$

المطلوب: $\overline{WX} \cong \overline{ZY}$



y (19)

$m\angle DAC$ (21)

$m\angle DAB$ (23)

x (18)

$m\angle AFB$ (20)

$m\angle ACD$ (22)

جبر: استعمل $\square ABCD$ المبين جانباً لإيجاد كل مما يأتي :

(24) **هندسة إحداثية:** إذا كانت $A(-2, 5), B(2, 2), C(4, -4)$ رؤوساً في $\square ABCD$ ، فأوجد إحداثيات الرأس D . وبرر إجابتك.

برهان: اكتب برهاناً من النوع المحدد في كل مما يأتي :

(25) برهاناً ذا عمودين.

المعطيات: $WXYZ$ متوازي أضلاع ،

المطلوب: $\triangle WXZ \cong \triangle YZX$


(النظرية 1.8)

المعطيات: $GKLM$ متوازي أضلاع ،

المطلوب: ثبات أن كل زاويتين في الأزواج

التالية متكاملتان $\angle G$ و $\angle K$ ، $\angle L$ و $\angle M$ ، $\angle M$ و $\angle L$.

(النظرية 1.5)




(28) برهاناً حراً.

المعطيات: $ACDE$ متوازي أضلاع.

المطلوب: القطران \overline{AD} و \overline{EC} ينصف كل منهما الآخر.

(النظرية 1.7)






(27) برهاناً ذا عمودين.

المعطيات: $PQRS$ متوازي أضلاع.

المطلوب: $\overline{PQ} \cong \overline{RS}, \overline{QR} \cong \overline{SP}$

(النظرية 1.3)






(29) هندسة إحداثية: استعن بالشكل المجاور

في كل مما يأتي:

- استعمل صيغة المسافة بين نقطتين لتحديد ما إذا كان قطرا $JKLM$ ينصف كل منهما الآخر. وضح إجابتك.
- حدد ما إذا كان قطرا $JKLM$ متطابقين. وضح إجابتك.
- استعمل صيغة الميل لتحديد ما إذا كان كل ضلعين متتاليين متعامدين أم لا. وضح إجابتك.



(30) رافعات: في الشكل المجاور: $ABCD, GDEF$

متوازياً أضلاع متطابقان.

- حدد الزوايا التي تطابق $\angle A$. وضح تبريرك.
- حدد القطع المستقيمة التي تطابق \overline{BC} . وضح تبريرك.
- حدد الزوايا المكملة للزاوية C . وضح تبريرك.



الربط مع الحياة

توفر الرافعات المقصبة
مساحات عمل على
ارتفاعات مختلفة تصل إلى
. 100m

(31) تمثيلات متعددة: سوف تستقصي في هذه المسألة اختبارات لتمييز متوازي الأضلاع.

- (a) هندسياً:** ارسم ثلاثة أزواج من القطع المستقيمة المتطابقة والمتوالية. صل الأطراف لتكون أشكالاً رباعية، وسمّها $ABCD, MNOP, WXYZ$. ثم قيس أطوال الأضلاع وقياسات الزوايا لكل منها.


(b) جدولياً: أكمل الجدول الآتي:

الشكل رباعي	هل المتقابلة متطابقة؟	هل الأضلاع المتقابلة متطابقة؟	هل الزوايا المتقابلة متطابقة؟	هل الأضلاع متوازية؟
$ABCD$				
$MNOP$				
$WXYZ$				

(c) لفظياً: ضع تخميناً حول الأشكال الرباعية التي لها ضلعان متطابقان ومتوازيان.

مسائل مهارات التفكير العليا


(32) تحدّ: إذا كان محيط $\square ABCD$ في الشكل أدناه يساوي 22 in ، فأوجد AB .



(33) اكتب: هل توجد نظرية SSSS في تطابق متوازيات الأضلاع. بّرر إجابتك.



(34) **إجابة مفتوحة:** أعطِ مثلاً مضاداً يبيّن أن متوازيات الأضلاع ذات الأضلاع المتناظرة المتتابعة ليست متطابقة دائماً.




(35) **تبرير:** أوجد $m\angle 1, m\angle 10$, في الشكل المجاور. وبرّر إجابتك.

(36) **أكتب:** لخّص خصائص أضلاع متوازي الأضلاع وزواياه وأقطاره.

تدريب على اختبار

(38) إذا كان $QPNM$ متوازي أضلاع، فما قيمة x ؟



(37) فيسا زاويتين متحالفتين في متوازي أضلاع هما:
 $3x + 42, 9x - 18$. ما قياس الزاويتين؟

- | | |
|---------------------|------------------|
| 58.5, 31.5 B | 13, 167 A |
| 81, 99 D | 39, 141 C |

مراجعة تراكمية

أوجد عدد أضلاع المضلع المنتظم المعطى قياس إحدى زواياه الداخلية في كل مما يأتي : (الدرس 1-1)

147.3° (41)

140° (40)

108° (39)

176.4° (44)

135° (43)

160° (42)

حدد ما إذا كان المستقيمان متوازيين أو متعامدين، أو غير ذلك في كل مما يأتي : (مهارة سابقة)

$y - 7x = 6$ (46)

$y = -x + 6$ (45)

$7y + x = 8$


$x + y = 20$

$2x + 5y = -1$ (48)

$3x + 4y = 12$ (47)

$10y = -4x - 20$

$6x + 2y = 6$



(49) **زراعة:** عند زراعة الأشجار، تسند الشجرة بدعامة (على شكل عصا) ترتكز على الأرض وترتبط في جذع الشجرة لتشتيتها. استعمل متباعدة SAS لتفسير سبب فعالية هذه الطريقة في ثنيت الأشجار المزروعة رأسياً. (مهارة سابقة)

استعد للدرس اللاحق

رؤوس شكل رباعي هي $W(3, -1), X(4, 2), Y(-2, 3), Z(-3, 0)$. حدد ما إذا كانت كل قطعة مستقيمة مما يأتي تمثل ضلعاً أو قطرًا في الشكل الرباعي، وأوجد ميل كل منها.



\overline{ZW} (52)

\overline{YW} (51)

\overline{YZ} (50)

لماذا؟

فيما سبق:

درست خصائص متوازي الأضلاع وطبقتها.

(الدرس 1-2)

والآن:


- أتعرف الشروط التي تؤكد أن شكل رباعي متوازي أضلاعها.

- أبرهن على أن أربع نقاط في المستوى الإحداثي تشكل رؤوس متوازي أضلاع.




تمييز متوازي الأضلاع

Distinguishing Parallelogram



قصت فاطمة شرائح ورقية ملونة لتكون خلفية لللوحة الرياضيات عند مدخل المدرسة. فسألتها صديقتها: كيف قصت الشرائح دون استعمال المنشفة بحيث كان الضلعان العلوي والسفلي في كل منها متوازيين؟




أجبت فاطمة: بما أن الضلعين الأيمن والأيسر للشريحة متوازيان، فإننا نحتاج فقط التأكد من أن لهما الطول نفسه عند قص الضلعين العلوي والسفلي للشريحة حتى نضمن أن الشرائح سوف تتشكل متوازيات أضلاع.

شروط متوازي الأضلاع: في الشكل الرباعي، إذا كان كل ضلعين متقابلين متوازيين، فإنه متوازي أضلاع بحسب التعريف. ولكن ليس هذا هو الشرط الوحيد الذي يمكن استعماله لتحديد ما إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع.


أضف إلى

مطويتك




1.9 في الشكل الرباعي، إذا كان كل ضلعين متقابلين متطابقين، فإن الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

مثال: إذا كان $\overline{AB} \cong \overline{DC}$, $\overline{AD} \cong \overline{BC}$ ،
فإن $ABCD$ متوازي أضلاع.




1.10 في الشكل الرباعي، إذا كانت كل زاويتين متقابلتين متطابقتين، فإن الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

مثال: إذا كانت $\angle A \cong \angle C$, $\angle B \cong \angle D$ ،
فإن $ABCD$ متوازي أضلاع.



1.11 إذا كان قطراً شكل رباعي ينصف كل منهما الآخر، فإن الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

مثال: إذا كان \overline{AC} , \overline{DB} ينصف كل منهما الآخر،
فإن $ABCD$ متوازي أضلاع.




1.12 في الشكل الرباعي، إذا كان فيه ضلعان متقابلان متوازيين ومتطابقين، فإن الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

مثال: إذا كان $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ ،
فإن $ABCD$ متوازي أضلاع.

برهان

نظريّة 1.9



اكتب برهاناً حرّاً للنظريّة 1.9

المعطيات: $\overline{WX} \cong \overline{ZY}$, $\overline{WZ} \cong \overline{XY}$


المطلوب: $\triangle WXYZ$ متوازي الأضلاع.

البرهان:

رسم قطعة مستقيمة مساعدة \overline{ZX} (قطر $\square WXYZ$) لتشكيل $\triangle ZWX$, $\triangle XYZ$. ومن المعطيات $\triangle ZWX \cong \triangle XYZ$. وكذلك $\overline{ZX} \cong \overline{XY}$, $\overline{WZ} \cong \overline{XY}$ بحسب خاصيّة الانعكاس للتطابق؛ إذن $\overline{WX} \cong \overline{ZY}$ بحسب SSS. وبما أن العناصر المتناظرة في المثلثين المتطابقين تكون متطابقة، فإن $\angle WZX \cong \angle XYZ$. وهذا يعني أن $\overline{WX} \parallel \overline{ZY}$, $\overline{WZ} \parallel \overline{XY}$ بحسب عكس نظرية الزاويتين المترادفتين داخليّاً. وبما أن الأضلاع المقابلة في $\triangle WXYZ$ متوازية، فإنه متوازي الأضلاع بحسب التعريف.

مثال 1


تحديد متوازي الأضلاع




حدد ما إذا كانت المعطيات على الشكل الرباعي المجاور كافية ليكون متوازي الأضلاع أم لا. برر إجابتك.

الضلعين المتقابلان \overline{FG} , \overline{JH} متطابقان؛ لأنهما متساويان في الطول. وبما أن $\angle FGH$, $\angle GHJ$ متحالفتان ومتكاملتان، فإن $\overline{FG} \parallel \overline{JH}$. إذن فمن النظريّة 1.12، يكون $\triangle FGH$ متوازي الأضلاع.

تحقق من فهمك



(1B)




(1A)

يمكنك استعمال شروط متوازي الأضلاع لإثبات علاقات من واقع الحياة.


استعمال متوازي الأضلاع لإثبات علاقات

مثال 2 من واقع الحياة



صندوق الأدوات: في الشكل المجاور، إذا كان $PQ = RS$, $PR = QS$ ، فيُبيّن لماذا تبقى الطبقتان العلوية والوسطى متوازيتين عند أي ارتفاع.

بما أن كل ضلعين متقابلين في الشكل الرباعي $PQSR$ متطابقان، فإن $PQSR$ متوازي الأضلاع بحسب النظريّة 1.9. إذن $\overline{PQ} \parallel \overline{RS}$ ؛ لذا وبغض النظر عن ارتفاع الطبقتين، فستبقىان متوازيتين.



الربط مع الحياة

يضع الفنيون أدواتهم في صناديق ذات طبقات متداخلة تسهل تنظيم الأدوات وتبقيها في متناول أيديهم.

تحقق من فهمك



(2) **لوحات:** عُد إلى فقرة لماذا؟ بداية الدرس، ووضح لماذا يكون خطى القص أعلى وأسفل كل شريحة

متوازيتين.


يمكنك استعمال الجبر مع شروط متوازي الأضلاع لإيجاد القيم المجهولة التي تجعل شكلًا رباعيًّا متوازي أضلاع.

تنبيه !

متوازي الأضلاع :

في المثال 3، إذا كانت x تساوي 3، y تساوي 4، فإن y يجب أن تساوي 2.5 حتى يكون الشكل الرباعي $FGHJ$ متوازي أضلاع. وهذا يعني أنه إذا كانت x تساوي 4 و y تساوي 1 مثلاً، فلن يكون $FGHJ$ متوازي أضلاع.

مثال 3 استعمال متوازي الأضلاع لإيجاد القيم المجهولة



في الشكل المجاور: $FK = 3x - 1$, $KG = 4y + 3$, $JK = 6y - 2$, $KH = 2x + 3$. أوجد قيمتي x , y بحيث يكون الشكل الرباعي $FGHJ$ متوازي أضلاع.

بناءً على النظرية 1.11، إذا كان قطرًا شكل رباعي ينصف كل منهما الآخر، فإن الشكل الرباعي متوازي أضلاع؛ لذا أوجد قيمة x التي تجعل $\overline{FK} \cong \overline{KH}$ ؛ وقيمة y التي تجعل $\overline{JK} \cong \overline{KG}$.

تعريف تطابق القطع المستقيمة

بالتعويض

$$FK = KH$$

$$3x - 1 = 2x + 3$$

طرح $2x$ من كلا الطرفين

$$x - 1 = 3$$

إضافة 1 إلى كلا الطرفين

$$x = 4$$

تعريف تطابق القطع المستقيمة

بالتعويض

$$JK = KG$$

$$6y - 2 = 4y + 3$$

طرح $4y$ من كلا الطرفين

$$2y - 2 = 3$$

إضافة 2 إلى كلا الطرفين

$$2y = 5$$


قسمة كلا الطرفين على 2

$$y = 2.5$$


إذن عندما تكون $x = 4$, $y = 2.5$ ، يكون الشكل الرباعي $FGHJ$ متوازي أضلاع.

تحقق من فهمك

أوجد قيمتي x , y في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع.



(3B)



(3A)

تعرفت شروط متوازي الأضلاع، وفيما يأتي ملخص يوضح كيفية استعمال هذه الشروط لإثبات أنَّ شكلًا رباعيًّا يمثل متوازي أضلاع.

أضف إلى

مطويةتك

ملخص المفهوم

إثبات أنَّ شكلًا رباعيًّا يمثل متوازي أضلاع

يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع إذا حقق أيًّا من الشروط الآتية:

1) إذا كان كل ضلعين متقابلين فيه متوازيين. (التعريف)

2) إذا كان كل ضلعين متقابلين فيه متطابقين. (النظرية 1.9)

3) إذا كانت كل زاويتين متقابلتين فيه متطابقتين. (النظرية 1.10)


4) إذا كان قطرًا ينصف كل منهما الآخر. (النظرية 1.11)

5) إذا كان فيه ضلعان متقابلان متوازيين ومتطابقين. (النظرية 1.12)



متوازي الأضلاع في المستوى الإحداثي: يمكننا استعمال صيغ المسافة بين نقطتين والميل ونقطة المنتصف لتحديد ما إذا كان الشكل الرباعي في المستوى الإحداثي متوازي أضلاع أم لا.

مثال 4 متوازي الأضلاع والهندسة الإحداثية



الهندسة إحداثية: مثل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي $KLMN$ الذي رؤوسه $K(2, 3), L(8, 4), M(7, -2), N(1, -3)$. وحدد ما إذا كان متوازي أضلاع أم لا. ببر إجابتك باستعمال صيغة الميل.

إذا كانت الأضلاع المقابلة في الشكل الرباعي متوازية فإنه متوازي أضلاع.

$$\begin{aligned} \text{ميل } \overline{KL} &= \frac{4-3}{8-2} = \frac{1}{6} & : \overline{KL} \\ \text{ميل } \overline{NM} &= \frac{-2-(-3)}{7-1} = \frac{1}{6} & : \overline{NM} \\ \text{ميل } \overline{KN} &= \frac{-3-3}{1-2} = \frac{-6}{-1} = 6 & : \overline{KN} \\ \text{ميل } \overline{LM} &= \frac{-2-4}{7-8} = \frac{-6}{-1} = 6 & : \overline{LM} \end{aligned}$$

بما أنّ الأضلاع المقابلة لها الميل نفسه، فإنّ $\overline{KL} \parallel \overline{NM}, \overline{LM} \parallel \overline{KN}$. لذا فالشكل الرباعي $KLMN$ متوازي أضلاع بحسب التعريف.

إرشادات للدراسة

صيغة نقطة المنتصف:
بيان أنّ شكل رباعيًّا يمثل متوازي أضلاع، يمكنك استعمال صيغة نقطة المنتصف، فإذا كانت نقطتا المنتصف للقطرين متساوين، فإنّ القطرين ينصف كل منهما الآخر.

تحقق من فهمك


مثل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي الذي أعطيت إحداثيات رؤوسه فيما يأتي. وحدد ما إذا كان متوازي أضلاع أم لا. ببر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال:

(4A) $A(3, 3), B(8, 2), C(6, -1), D(1, 0)$ ، صيغة المسافة.

(4B) $F(-2, 4), G(4, 2), H(4, -2), J(-2, -1)$ ، صيغة نقطة المنتصف.

درست سابقاً، أنه يمكن التعبير عن إحداثيات رؤوس المثلثات بمتغيرات. ثم استعمال صيغ المسافة بين نقطتين والميل ونقطة المنتصف لكتابته براهين إحداثية للنظريات. ويمكن عمل الشيء نفسه مع الأشكال الرباعية.

مثال 5 متوازي الأضلاع والبرهان الإحداثي



اكتب برهاناً إحداثياً للعبارة الآتية :


في الشكل الرباعي، إذا كان فيه ضلعان متقابلان متوازيين ومتطابقين، فإنّ الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

الخطوة 1: ارسم الشكل الرباعي $ABCD$ في المستوى الإحداثي $\overline{AB} \parallel \overline{DC}, \overline{AB} \cong \overline{DC}$ على أن يكون

- عين الرأس A عند النقطة $(0, 0)$.
- افترض أن طول \overline{AB} يساوي a وحدة. فيكون إحداثيا B هما $(a, 0)$.
- بما أنّ القطع المستقيمة الأفقيّة متوازية دائمًا، فعين نقطتي طرفي \overline{DC} على أن يكون لهما الإحداثي y نفسه ولتكن c .
- بما أن المسافة من D إلى C تساوي أيضًا a وحدة، وبفرض أنّ الإحداثي x للنقطة D يساوي b ، تكون الإحداثي x للنقطة C يساوي $b + a$.

مراجعة المفردات

البرهان الإحداثي:
هو برهان تستعمل فيه أشكال في المستوى الإحداثي والجبر لإثبات مفاهيم هندسية.



الخطوة 2: استعمل الشكل الذي رسمته لكتابه برهان.

المعطيات: $ABCD$ شكل رباعي فيه $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AB} \cong \overline{DC}$

المطلوب: $ABCD$ متوازي أضلاع.

برهان إدحاثي:

من التعريف يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع إذا كانت أضلاعه المتقابلة متوازية.

ومن المعطيات $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$. يقى أن ثبت أن $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$.

استعمل صيغة الميل.

$$\frac{c-0}{b+a-a} = \frac{c}{b} \quad \text{ميل } \overline{BC}$$

$$\frac{c-0}{b-0} = \frac{c}{b} \quad \text{ميل } \overline{AD}$$

وبما أن \overline{BC} , \overline{AD} لهما الميل نفسه، فإن $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$; لذا فالشكل الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع؛ لأن كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان.

تحقق من فهمك

5) اكتب برهاناً إدحاثياً للعبارة الآتية: إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع فإن أضلاعه المتقابلة متطابقة.

تاريخ الرياضيات

رينيه ديكارت


(1596م - 1650م)

عالم رياضيات فرنسي، وهو أول من استعمل المستوى الإدحاثي. وقيل إنه فكر أولاً بربط كل موقع في مستوى مع زوج من الأعداد.




إنشاءات هندسية

الخطوة 4:




استعمل حافة المسطرة لرسم \overline{AD} , \overline{BC} , \overline{CD} .

الخطوة 3:




افتح الفرجار فتحة متساوية لـ \overline{AB} ، وثبته عند النقطة D وارسم قوساً يقطع القوس المرسوم من النقطة B , سُمّ نقطة التقاطع C .

الخطوة 2:



اختر نقطة على القوس الذي فوق A وسمّها D .

الخطوة 1:




استعمل المسطرة لرسم \overline{AB} . ثم افتح الفرجار، وثبته عند النقطة A ، وارسم قوساً فوقها. ثبت الفرجار عند النقطة B ، وبفتحة الفرجار نفسها ارسم قوساً فوق B .


تأكد

حدّد ما إذا كان كل شكل رباعي فيما يأتي متوازي أضلاع أم لا. برر إجابتك.


المثال 1



(2)



(1)





المثال 2

3) نجارة: صنع نجار درابيناً للدرج يتكون من عمودين رأسين، الأول مثبت فوق الدرجة الأولى، والثاني مثبت فوق الدرجة الأخيرة، يصل بينهما قاطعان خشبيان كما في الشكل المجاور. كيف يمكن للنجار التحقق من أن القاطعين الخشبيين العرضيين متوازيان، وذلك بأقل عدد من مرات القياس، إذا علمت بأن الدرجتين الأولى والأخيرة مستويتان مع الأرض.

المثال 3

جبر: أوجد قيمتي y, x في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع.



المثال 4

هندسة إحداثية: مثل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه فيما يأتي.

وحدّد ما إذا كان متوازي أضلاع أم لا، ببر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال.

(6) $A(-2, 4), B(5, 4), C(8, -1), D(-1, -1)$ ، صيغة الميل.




(7) $W(-5, 4), X(3, 4), Y(1, -3), Z(-7, -3)$ ، صيغة نقطة المنتصف.

(8) اكتب برهاناً إحداثياً للعبارة الآتية: إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع، فإنّ قطره ينصف كل منهما الآخر.


المثال 5

تدريب وحل المسائل


حدّد ما إذا كانت المعطيات في كل مما يأتي كافية ليكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع أم لا. ببر إجابتك.





(14)



(13)



(12)




برهان: إذا كان $WXYZ$ متوازي أضلاع،

حيث $\angle W \cong \angle X$ ، \overline{WX} نقطة متصف ،

فاكتب برهاناً حراً لإثبات أن $\triangle ZMY$ متطابق الضلعين.

المثال 2



16) رافعات: تستعمل رافعات متوازيات الأضلاع

لرفع المركبات الثقيلة عند صيانتها. ففي الشكل




أدناؤه: $ABEF, BCDE$ متوازيات أضلاع. اكتب

برهاناً ذا عمودين لإثبات أن $ACDF$ متوازي




أضلاع أيضًا.

جبر: أوجد قيمتي y, x في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

المثال 3



(22)



المثال 4

هندسة إحداثية: مثل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه فيما يأتي.
وحدد ما إذا كان متوازي أضلاع أم لا، ببرر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال.

$$D(-2, -2), C(5, -1), B(4, 5), A(-3, 4) \quad (23)$$

$$M(3, -3), L(4, 3), K(-3, 1), J(-4, -4) \quad (24)$$

$$Y(-4, 7), X(-6, 2), W(1, -2), V(3, 5) \quad (25)$$


$$T(-5, -1), S(-3, 6), R(4, 3), Q(2, -4) \quad (26)$$

(27) اكتب برهانًا إحداثياً للعبارة: إذا كان كل ضلعين متقابلين في الشكل الرباعي متطابقين، فإنه متوازي أضلاع.

(28) اكتب برهانًا إحداثياً للعبارة: إذا كانت إحدى زوايا متوازي الأضلاع قائمة، فإن جميع زواياه قوائم.

(29) **برهان:** اكتب برهانًا حرجاً للنظرية 1.10.

(30) **المِنسَاخ:** استعن بمعلومات الربط مع الحياة إلى اليمين والشكل أدناه.

**المثال 5****الربط مع الحياة**

المِنسَاخ هو أداة هندسية تستعمل لنسخ صورة أو مخطط وفق مقياس رسم معين.



(a) إذا كان $\overline{BE} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AC} \cong \overline{CF}$, $\overline{AB} \cong \overline{CD} \cong \overline{BE}$, $\overline{DF} \cong \overline{DE}$ ، فاكتب برهانًا حرجاً لإثبات أن $\overline{BE} \parallel \overline{CD}$.

(b) مقياس الرسم للشكل المنسوخ بالنسبة للشكل الأصلي هو نسبة CF إلى BE .

فإذا كان $AB = 12\text{ in}$, $DF = 8\text{ in}$, وطول الشكل الأصلي 1.5 in، فما طول صورة الشكل المنسوخ؟

(31) **برهان:** اكتب برهانًا ذات عمودين للنظرية 1.11.

أوجد الإحداثيات المجهولة لرؤوس كل من متوازيي الأضلاع الآتيين:



(34) **برهان:** اكتب برهانًا إحداثياً لإثبات أن القطع المستقيمة الواضلة بين منتصفات أضلاع أي شكل رباعي تشكل متوازي أضلاع.

(35) **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة سوف تستقصي إحدى خصائص المستطيل.

مراجعة المفردات**مقياس الرسم:**

هو نسبة تستعمل لتمثيل الأشياء التي تكون كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا عندما ترسم بحجمها الحقيقي. ويعطي المقياس نسبة تقارن بين قياسات الرسم أو النموذج وقياسات الأشياء الحقيقية.

الطول	القطر	المستطيل
\overline{AC}	ABCD	
\overline{BD}		
\overline{MO}	MNOP	
\overline{NP}		
\overline{WY}		
\overline{XZ}		WXYZ

(a) **هندسياً:** ارسم ثلاثة مستطيلات بأبعاد مختلفة وسمّها $ABCD$, $MNOP$, $WXYZ$.

(b) قس طولي قطرى كل مستطيل، ثم أكمل الجدول المجاور.


(c) **لفظياً:** اكتب تخميناً حول قطرى المستطيل.

مسائل مهارات التفكير العليا

(36) تحدّ: يتقاطع قطراً متوازي أضلاع عند النقطة (1, 0). ويقع أحد رؤوسه عند النقطة (2, 4)، بينما يقع رأس آخر عند النقطة (3, 1). أوجد موقعي الرأسين الآخرين.

(37) اكتب: بِّين أوجه الشبه والاختلاف بين النظريتين 1.9 و 1.3.

(38) تبرير: إذا كانت الزوايا الممتاظرة في متوازي الأضلاع متطابقة، فهل يكون متوازي الأضلاع متطابقين أحياناً، أم دائمًا، أم لا يكونان متطابقين أبداً؟




(39) تحدّ: في الشكل المجاور، $ABCD$ متوازي أضلاع، $\overline{AJ} \cong \overline{KC}$. بِّين أن الشكل الرباعي $JBKD$ متوازي أضلاع.

(40) اكتب: استعمل العبارات الشرطية الثانية "إذا وفقط إذا" في دمج كل من النظريات: 1.9 و 1.10 و 1.11 و 1.12 و عكسها.

تدريب على اختبار

(41) إجابة قصيرة: في الشكل الرباعي $ABCD$ أدناه، إذا كان متوازيين، فأي المعطيات الآتية كافية لإثبات أن $ABCD$ متوازي أضلاع؟



إذا كان الضلعان \overline{AB} , \overline{DC} في الشكل الرباعي $ABCD$ متوازيين، فأي المعطيات الآتية كافية لإثبات أن $ABCD$ متوازي أضلاع؟

$\overline{AC} \cong \overline{BD}$ **C**

$\overline{AD} \cong \overline{BC}$ **D**


$\overline{AB} \cong \overline{AC}$ **A**

$\overline{AB} \cong \overline{DC}$ **B**


مراجعة تراكمية

هندسة إحداثية: أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطرى متوازي الأضلاع $ABCD$ في كل من السؤالين الآتيين (الدرس 1-2)
 $A(2, 5), B(10, 7), C(7, -2), D(-1, -4)$ (44) $A(-3, 5), B(6, 5), C(5, -4), D(-4, -4)$ (43)


أوجد قيمة x في كل من الأسئلة الآتية : (الدرس 1-1)



(47)



(46)



(45)

أوجد عدد أضلاع المضلع المتظم المعطى قياس إحدى زواياه الداخلية في كل مما يأتي: (الدرس 1-1)

162° (51)

168° (50)

160° (49)

140° (48)

استعد للدرس اللاحق

استعمل الميل لتحديد ما إذا كان \overline{XY} , \overline{YZ} متعامدين أم لا في كل مما يأتي:

$X(4, 1), Y(5, 3), Z(6, 2)$ (53)


$X(-2, 2), Y(0, 1), Z(4, 1)$ (52)

الفصل 1 الأشكال الرباعية 36



اختبار منتصف الفصل

(19) برهان: اكتب برهاناً ذا عمدتين. (الدرس 1-2)

المعطيات: $\square GFBA, \square HACD$ المطلوب: $\angle F \cong \angle D$ 

أوجد قيمتي y, x في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع: (الدرس 1-3)

$$\begin{array}{l} 3x - 2 \\ 6y - 8 \\ \hline 4y + 6 \\ 2x + 6 \end{array}$$

(21)


$$\begin{array}{l} x + 10 \\ y \\ \hline x + 5 \\ 2y + 2 \\ x + 5 \end{array}$$

(20)

(22) طاولات: لماذا يبقى سطح طاولة كي الثياب في الصورة أدناه موازياً لأرضية الغرفة دائمًا؟ (الدرس 1-3)



(23) اختيار من متعدد: أي الأشكال الرباعية الآتية ليس متوازي أضلاع؟ (الدرس 1-3)



هندسة احتمالية: حدد ما إذا كان الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي متوازي أضلاع. برر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال. (الدرس 1-3)

$$A(-6, -5), B(-1, -4), C(0, -1), D(-5, -2) \quad (24)$$

صيغة المسافة بين نقطتين.



$$Q(-5, 2), R(-3, -6), S(2, 2), T(-1, 6) \quad (25)$$

صيغة الميل.


أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية في كل من المضلعين المحدبة الآتية: (الدرس 1-1)

(1) الخماسي


(2) السباعي

(3) ذو 18 ضلعاً

أوجد قياسات جميع الزوايا الداخلية في كل من المضلعين الآتيين: (الدرس 1-1)



(6)




(5)


أوجد عدد أضلاع المضلع المتظم المعطى مجموع قياسات زواياه الداخلية في كل مما يأتي: (الدرس 1-1)

(8) 1260° (7) 720° (10) 4500° (9) 1800°

أوجد قيمة x في كل من الشكليين الآتيين: (الدرس 1-1)




(12)




(11)

استعمل $\square WXYZ$ لإيجاد كل مما يأتي: (الدرس 1-2)


(13) $m\angle WZY$ (14) WZ (15) $m\angle XYZ$ 

(16) إثارة: استعمل مقبض الإنارة العلوى الذي يشكل متوازي أضلاع في إيجاد $m\angle p$ في $\square PQRS$. (الدرس 1-2)

جبر: أوجد قيم المتغيرات في كل من متوازيي الأضلاع الآتيين: (الدرس 1-2)



(18)




(17)

المستطيل

Rectangle

لماذا؟



المستطيل

أحمد هو الطالب المسؤول عن عرض لوحات الرياضيات في يوم النشاط المدرسي. ولعمل خلفية مميزة يعرض عليها لوحات الرياضيات، قام بطلاء جزء من جدار على شكل مستطيل يبدأ طوله من أسفل الجدار ويمتد للأعلى، وكان طوله 80 in ، وعرضه 36 in . كيف يمكنه أن يتحقق من أن الجزء الذي قام بطلائه مستطيل؟

خصائص المستطيل: المستطيل هو متوازي أضلاع زواياه الأربع قوائم. ونجد من ذلك أن للمستطيل الخصائص الآتية :

- الزوايا الأربع قوائم.
- كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتطابقان.
- كل زاويتين متقابلتين متوازيتين.
- القطران ينصف كل منهما الآخر.

وبإضافة إلى ذلك، قطر المستطيل متطابقان، كما توضح النظرية الآتية:

نظريّة 1.13

قطرا المستطيل

إذا كان متوازي الأضلاع مستطيلًا، فإن قطريه متطابقان.

مثال: إذا كان $\square JKLM$ مستطيلًا ، فإن $\overline{MK} \cong \overline{JL}$.


سوف تبرهن النظرية 1.13 في السؤال 33 .

استعمال خصائص المستطيل

مثال 1 من واقع الحياة



حدائق: حديقة مستطيلة الشكل تحتوي على ممرتين كما في الشكل المجاور. إذا كان $PR = 200\text{ m}$ ، فأوجد QT .



$$\text{قطرا المستطيل متطابقان} \quad \overline{QS} \cong \overline{PR}$$

$$\text{تعريف تطابق القطع المستقيمة} \quad QS = PR$$

$$\text{بالتعويض} \quad QS = 200$$

وبما أن $PQRS$ مستطيل، لذا فإن قطريه ينصف كل منهما الآخر؛ لذا

$$QT = \frac{1}{2} QS$$

بالتعويض

$$QT = \frac{1}{2} (200) = 100$$

تحقق من فهمك



استعن بالشكل في المثال 1.

$$1B) \text{ إذا كان } m\angle SQR = 64^\circ , \text{ فأوجد } m\angle PRS .$$

$$1A) \text{ إذا كان } TS = 120 , \text{ فأوجد } PR .$$

فيما سبق:

درست استعمال خصائص متوازي الأضلاع وتحديد ما إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

(الدرس 2-1)

والآن:

- أتعرف خصائص المستطيل وأطبقها.
- أحدد ما إذا كان متوازي الأضلاع مستطيلًا.

المفردات:

المستطيل
rectangle

إرشادات للدراسة

الزوايا القوائم:

تذكّر من النظرية 1.6

أنه إذا كانت إحدى زوايا متوازية الأضلاع قائمة، فإن زواياه الأربع قوائم.

إرشادات للدراسة

الزاويتان المتبادلتان

داخلياً بالنسبة لقطر:

درست سابقاً في نظرية

الزاويتان المتبادلتان

داخلياً أنه إذا قطع قاطع

مستقيمين متوازيين،

فإن كل زاويتين


متبادلتين داخلياً

متطابقتان، وينطبق هذا

على الزاويتين

المتبادلتين بالنسبة

لقطر متوازي الأضلاع.



مثال:

$$\angle 1 \cong \angle 2, \angle 3 \cong \angle 4$$

نظريّة 1.14

إذا كان قطر متساوياً لأضلاع متطابقين فإنه مستطيل.


مثال: في $\square WXYZ$ ، إذا كان $\overline{WY} \cong \overline{XZ}$ ،

فإن $\square WXYZ$ مستطيل.

سوف تبرهن هذه النظرية في السؤال 34.

أضف إلى

مطويتك



إثبات علاقات في المستطيل


مثال 3 من واقع الحياة



كرة طائرة: أنس نادي رياضي ملعباً لكرة الطائرة، وللتتأكد من أنه يحقق المواصفات المطلوبة، قاس المشرفون

أطوال أضلاع الملعب وقطريه، فإذا كان $AB = 60 \text{ ft}$, $BC = 30 \text{ ft}$, $CD = 60 \text{ ft}$, $AD = 30 \text{ ft}$,

$BD = 67 \text{ ft}$, $AC = 67 \text{ ft}$ ، فكيف يمكنهم التتحقق من أنه مستطيل.



الربط مع الحياة


كرة الطائرة هي رياضة جماعية يتنافس فيها فريقان، لكل منهما ستة لاعبين، أما الكرة المستخدمة في هذه اللعبة، فهي متوسطة الحجم وأصغر من كرة القدم وأخف منها وزناً.



بما أن $AB = CD$, $BC = AD$, $AC = BD$ ، فإن $\square ABCD$ متوازي أضلاع. ولأن $\overline{AC} \cong \overline{BD}$, $\overline{BC} \cong \overline{AD}$ ، فإن $\square ABCD$ مستطيل.

تحقق من فهمك

3) تصميم: بالرجوع إلى فقرة "لماذا؟" بداية الدرس. قاس أحمد أبعاد المنطقة التي قام بطلائها كما في الشكل أدناه. وباستعمال زاوية النجارين تحقق من أن الزاوية عند الركن الأيسر السفلي قائمة. فهل يمكنه استنتاج أن المنطقة مستطيلة الشكل؟ وضح إجابتك.




الربط مع الحياة

زاوية النجارين:

عبارة عن ضلع خشبي سميك ومسطرة معدنية مثبتة معه بحيث يصنعن زاوية 90° . وتُصنع من المعدن أو الخشب، وتستخدم لقياس وتحديد الزوايا القائمة، ورسم خطوط عمودية على الأحرف.

يمكنك أيضًا استعمال خصائص المستطيل لإثبات أن شكلًا رباعيًّا مرسومًا في المستوى الإحداثي عُلمت إحداثيات رؤوسه هو مستطيل.

مثال 4 المستطيل والهندسة الإحداثية



هندسة إحداثية: إذا كانت إحداثيات رؤوس الشكل الرباعي $PQRS$ هي $P(-5, 3)$, $Q(1, -1)$, $R(-1, -4)$, $S(-7, 0)$. فهل $PQRS$ مستطيل؟ استعمل صيغة المسافة بين نقطتين.

الخطوة 1: استعمل صيغة المسافة بين نقطتين لتحديد ما إذا كان $PQRS$ متوازي أضلاع، وذلك بالتحقق من أن أضلاعه المتقابلة متطابقة.

$$PQ = \sqrt{(-5 - 1)^2 + [3 - (-1)]^2} = \sqrt{52}$$

$$RS = \sqrt{[-1 - (-7)]^2 + (-4 - 0)^2} = \sqrt{52}$$

$$PS = \sqrt{[-5 - (-7)]^2 + (3 - 0)^2} = \sqrt{13}$$

$$QR = \sqrt{[1 - (-1)]^2 + [-1 - (-4)]^2} = \sqrt{13}$$

بما أن أضلاع $PQRS$ المتقابلة متساوية الطول، فإنها متطابقة؛ لذا فإن $PQRS$ متوازي أضلاع.

الخطوة 2: هل قطرا $\square PQRS$ متطابقان؟

$$PR = \sqrt{[-5 - (-1)]^2 + [3 - (-4)]^2} = \sqrt{65}$$

$$QS = \sqrt{[1 - (-7)]^2 + (-1 - 0)^2} = \sqrt{65}$$

بما أن للقطريين الطول نفسه، فإنهما متطابقان؛ لذا فإن $\square PQRS$ مستطيل.


إرشادات للدراسة

المستطيل

ومتوازي الأضلاع:
كل مستطيل متوازي أضلاع، ولكن ليس كل متوازي أضلاع مستطيلًا.

تحقق من فهمك

4) إذا كانت إحداثيات رؤوس الشكل الرباعي $JKLM$ هي $J(-10, 2)$, $K(-8, -6)$, $L(5, -3)$, $M(2, 5)$ فهل $JKLM$ مستطيل؟ استعمل صيغة الميل.



زراحة: الشكل المجاور يبيّن بوابة مخزن حبوب مستطيلة الشكل، فيها الدعامتان المتتقاطعتان تقويان دفة البوابة، وتحفظانها من الالتواء مع مرور الزمن.

$$PS = 7 \text{ ft}, ST = 3\frac{13}{16} \text{ ft}, m\angle PTQ = 67^\circ$$


إذا كان فأوجد كلاً مما يأتي :

$$SQ \quad (2)$$

$$QR \quad (1)$$

$$m\angle TSR \quad (4)$$

$$m\angle TQR \quad (3)$$




جبر: استعن بالمستطيل $DEFG$ المبيّن جانباً.

$$\text{إذا كان } EG = 3x - 7, EG = x + 5 \quad (5)$$

$$\text{إذا كان } m\angle EFD = (2x - 3)^\circ, m\angle DFG = (x + 12)^\circ \quad (6)$$

فأوجد



(7) **برهان:** إذا كان $ABDE$ مستطيلاً، و

$\overline{BC} \cong \overline{DC}$

المثال 2

المثال 3


المثال 4

الهندسة إحداثية: مثل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل من السؤالين الآتيين، وحدّد ما إذا كان مستطيلاً أم لا. ببر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال.

$$W(-4, 3), X(1, 5), Y(3, 1), Z(-2, -2) \quad (8)$$

$$A(4, 3), B(4, -2), C(-4, -2), D(-4, 3) \quad (9)$$

تدريب وحل المسائل



سياج: سياج مستطيل الشكل تُستعمل فيه دعائم متقاطعة لتقوية السياج.

$$\text{إذا كان } AB = 6 \text{ ft}, AC = 2 \text{ ft}, m\angle CAE = 65^\circ$$


فأوجد كلاً مما يأتي :

$$CB \quad (11)$$

$$BD \quad (10)$$

$$m\angle ECD \quad (13)$$

$$m\angle DEB \quad (12)$$



جبر: استعن بالمستطيل $WXYZ$ المبيّن جانباً.

$$\text{إذا كان } ZY = 2x + 3, WX = x + 4 \quad (14)$$

$$\text{إذا كان } ZP = 3x - 5, WP = 2x + 11 \quad (15)$$

$$\text{إذا كان } m\angle ZYW = (2x - 7)^\circ, m\angle WYX = (2x + 5)^\circ \quad (16)$$

فأوجد

$$ZX, ZP = 4x - 9, PY = 2x + 5 \quad (17)$$

$$\text{إذا كان } m\angle YXZ = (3x + 6)^\circ, m\angle XZW = (5x - 12)^\circ \quad (18)$$

$$\text{إذا كان } m\angle ZXW = (x - 11)^\circ, m\angle WZX = (x - 9)^\circ \quad (19)$$

المثال 1

المثال 2


المثال 3

برهان: اكتب برهانًا ذا عمودين في كل مما يأتي:

(21) المعطيات: $QTVW$ مستطيل.


$$\overline{QR} \cong \overline{ST}$$

المطلوب: $\triangle SWQ \cong \triangle RVT$



(20) المعطيات: $ABCD$ مستطيل.

$$\triangle ADC \cong \triangle BCD$$



هندسة إحداثية: مثل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي، وحدد ما إذا كان مستطيلًا أم لا. ببر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال.


(22) $W(-2, 4), X(5, 5), Y(6, -2), Z(-1, -3)$ ، صيغة الميل.

(23) $J(3, 3), K(-5, 2), L(-4, -4), M(4, -3)$ ، صيغة المسافة بين نقطتين.

(24) $Q(-2, 2), R(0, -2), S(6, 1), T(4, 5)$ ، صيغة المسافة بين نقطتين.

(25) $G(1, 8), H(-7, 7), J(-6, 1), K(2, 2)$ ، صيغة الميل.

في المستطيل $ABCD$ ، إذا كان $m\angle 2 = 40^\circ$ ، فأوجد كلاً مما يأتي :




$m\angle 3$ (28) $m\angle 7$ (27)

$m\angle 1$ (26)

$m\angle 8$ (31) $m\angle 6$ (30)

$m\angle 5$ (29)



مكتبات: أضاف زيد رفًا جديداً لمكتبه ودعائم معدنية متقطعة كما في الشكل المجاور. كم يجب أن يكون طول كل من الدعائم المعدنية بحيث تكون الرفوف عمودية على الجانبيين؟ ووضح إجابتك. (إرشاد: $12 \text{ in} = 1 \text{ ft}$)

برهان: اكتب برهانًا ذا عمودين لإثبات النظرية في كل من السؤالين الآتيين :

(34) النظرية 1.14

(33) النظرية 1.13

(35) **رياضة:** قام سلمان بعمل التخطيط الخارجي لملعب كرة قدم. ووضح كيف يمكنه التتحقق من أن الملعب مستطيل الشكل باستعمال شريط القياس فقط.

المثال 4

تمثيلات متعددة: سوف تستقصي في هذه المسألة خصائص متوازيات أضلاع خاصة.

(a) **هندسياً:** ارسم ثلاثة متوازيات أضلاع كل منها أضلاعه الأربع متطابقة وسمّها

$ABCD$, $MNOP$, $WXYZ$.

(b) **جدولياً:** استعمل المنشلة لقياس الزوايا وأكمل الجدول الآتي.




الربط مع الحياة

حددت رابطة كرة القدم الدولية (IFAP) الأبعاد القياسية لملعب كرة القدم في البطولات الرسمية الدولية فكانت 105m طولاً، و 68m عرضاً.

WXYZ		MNOP		ABCD		متوازي الأضلاع
$\angle XRY$	$\angle WRX$	$\angle NRO$	$\angle MRN$	$\angle BRC$	$\angle ARB$	الزاوية
						قياس الزاوية

(c) **لفظياً:** اكتب تخميناً حول قطرى متوازي الأضلاع المتطابق للأضلاع.






جبر: استعن بالمستطيل $WXYZ$ المبين جانبًا.

(37) إذا كان $XW = 3$, $WZ = 4$, فأوجد YW .

(38) إذا كان $ZY = 6$, $XY = 8$, فأوجد WY .

مسائل مهارات التفكير العليا



(39) **تحدد:** في المستطيل $ABCD$, إذا كان $m\angle EAB = (4x + 6)^\circ$,

$m\angle DEC = (10 - 11y)^\circ$, $m\angle EBC = 60^\circ$. فأوجد قيمة كل من x, y .


(40) **اكتشف الخطأ:** قالت بسمة: إن أي مثلثين حادّي الزوايا ومتطابقين يمكن ترتيبهما ليشكلا مستطيلًا. وقالت شيماء: إن المثلثين القائمي الزاوية المتطابقين هما فقط اللذان يمكن ترتيبهما ليشكلا مستطيلًا. هل أي منهما على صواب؟ ووضح تبريرك.

(41) **مسألة مفتوحة:** اكتب معادلات أربعة مستقيمات بحيث تكون نقاط تقاطعها رؤوس مستطيل. تحقق من إجابتك باستعمال الهندسة الإحديّة.

(42) **اكتب:** وضح لمَ تُعد جميع المستطيلات متوازيات أضلاع، بينما لا تُعد جميع متوازيات الأضلاع مستطيلات.


تدريب على اختبار

(44) **إجابة قصيرة:** ما قياس $\angle APB$ ؟



(43) في الشكل الرباعي $FGHJ$, إذا كان $FJ = -3x + 5y$, $FG = 3x + y$, $GH = 11$, $GM = 13$

فما قيمة كل من x, y اللتين يجعلان $FGHJ$ مستطيلًا؟



$x = 3, y = 4$ **A**

$x = 4, y = 3$ **B**


$x = 7, y = 8$ **C**

$x = 8, y = 7$ **D**


مراجعة تراكمية

جبر: أوجد قيمتي x, y في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع : (الدرس 1-3)


(47)



(46)



(45)



(48) **هندسة إحداية:** أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطرى $\square ABCD$ الذى إحداثيات رؤوسه هي : $A(1, 3), B(6, 2), C(4, -2), D(-1, -1)$:

(الدرس 1-2)

استعد للدرس اللاحق



أوجد المسافة بين النقطتين في كلٌ مما يأتي:

مزاولة التعليم (−4, 3), (3, −4) (51)

(0, 6), (−1, −4) (50)

(4, 2), (2, −5) (49)

Ministry of Education

2022 - 1444



المعين والمربع

Rhombus and Square

رابط المدرس الرقمي



www.ien.edu.sa



لماذا؟
تصمم الألماسات باستعمال أنماط متكررة من الأشكال الهندسية. إذا صمم فنان الألماسة المجاورة، بحيث تكونت من أنماط متكررة من مثلثات وأشكال رباعية، كيف يمكن تحديد نوع الأشكال الرباعية المحددة باللون الأحمر في الألماسة؟

فيما سبق:

درست تحديد ما إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع أو مستطيلًا.

(الدرس 1-4)

والآن:

- أتعرف خصائص المعين والمربع وأطبقها.

- أحدد ما إذا كان الشكل الرباعي مستطيلًا أو معيناً أو مربعاً.

المفردات:


المعين
rhombus

المربع
square

نظريات**قطرا المعين**


1.15 إذا كان متوازي أضلاع معيناً، فإن قطره متعامدان.

مثال: إذا كان $\square ABCD$ معيناً، فإن $\overline{AC} \perp \overline{BD}$.



1.16 إذا كان متوازي أضلاع معيناً فإن كل قطر فيه ينصف كل من الزاويتين اللتين يصل بين رأسيهما.

مثال: إذا كان $\square NPQR$ معيناً، فإن $\angle 1 \cong \angle 2, \angle 3 \cong \angle 4, \angle 5 \cong \angle 6, \angle 7 \cong \angle 8$



سوف تبرهن النظرية 1.16 في السؤال 28


برهان

نظرية 1.15 أكتب برهاناً حراً للنظرية 1.15

المعطيات: $ABCD$ معين.

المطلوب: $\overline{AC} \perp \overline{BD}$

البرهان:




بما أن $ABCD$ معين، فإن $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ بحسب التعريف.

وبما أن المعين متوازي أضلاع، وقاطري متوازي الأضلاع ينصف

كل منهما الآخر، فإن \overline{BD} ينصف \overline{AC} عند P ؛ لذا فإن $\overline{AP} \cong \overline{PC}$. وكذلك $\overline{BP} \cong \overline{CP}$ بحسب خاصية الانعكاس؛ إذن $\triangle APB \cong \triangle CPB$ بحسب SSS.

وبيما أن العناصر المتناظرة في المثلثات المتطابقة تكون متطابقة، فإن $\angle APB \cong \angle CPB$ و $\angle APB = \angle CPB$ ، $\angle APB$ متجاورتان على مستقيم، والزاويتان المتطابقتان المتجاورتان على مستقيم تكونان قائمتين. وبما أن $\angle APB$ قائمة، فإن $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ بحسب تعريف المستقيمين المتعاملين.

مثال 1



استعمال خصائص المعين

استعن بالمعين $FGHJ$ المبين جانباً.

a) إذا كان $m\angle KHJ = 82^\circ$, فأوجد $m\angle FJH$.

بما أن $FGHJ$ معين، فإن القطر \overline{FG} ينصف $\angle FJH$.

$$m\angle KJH = \frac{1}{2} (82^\circ) = 41^\circ. \text{ إذن } m\angle KJH = \frac{1}{2} m\angle FJH$$

و بما أن قطري المعين متعامدان، فإن $m\angle JKH = 90^\circ$ بحسب تعريف المستقيمين المتعامدين.

نظيرية مجموع قياسات زوايا المثلث

$$m\angle KJH + m\angle JKH + m\angle KHJ = 180^\circ$$

بالتعويض

$$41^\circ + 90^\circ + m\angle KHJ = 180^\circ$$

بالتبسيط

$$131^\circ + m\angle KHJ = 180^\circ$$

بطرح 131° من كلا الطرفين

$$m\angle KHJ = 49^\circ$$

b) جبر: إذا كان $GH = x + 9$, $JH = 5x - 2$, فأوجد قيمة x .

تعريف المعين

$$\overline{GH} \cong \overline{JH}$$

تعريف تطابق القطع المستقيمة

$$GH = JH$$

بالتعويض

$$x + 9 = 5x - 2$$

بطرح x من كلا الطرفين

$$9 = 4x - 2$$

بجمع 2 لـ كلا الطرفين

$$11 = 4x$$

بقسمة كلا الطرفين على 4

$$2.75 = x$$


تحقق من فهمك



استعن بالمعين $FGHJ$ أعلاه.

1A) إذا كان $KJ = 13$, $FK = 5$, $FG = 13$, فأوجد قيمة y .

1B) جبر: إذا كان $m\angle JFK = (6y + 7)^\circ$, $m\angle KFG = (9y - 5)^\circ$, فأوجد قيمة y .



المربع

المربع هو متوازي أضلاع جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه قائمة. تذكر أن متوازي الأضلاع الذي زواياه الأربع قوائم يكون مستطيلاً، ومتوازي الأضلاع الذي أضلاعه الأربع متطابقة يكون معيناً؛ لذا نعندما يكون متوازي الأضلاع معيناً وإحدى زواياه قائمة فإنه يكون مربعاً أيضاً، وعليه فإن المربع هو متوازي أضلاع ومستطيل ويعين.

ويلخص شكل ثن الآتي العلاقة بين متوازي الأضلاع والمعين والمربع والمستطيل.

إرشادات للدراسة

المربع والمعين:
كل مربع معين، ولكن ليس كل معين مربعاً، وكل مربع مستطيل وليس كل مستطيل مربعاً.

ملخص المفهوم

أضف إلى مطويتك	متوازي الأضلاع	متوالي الأضلاع (الأضلاع المتقابلة متوازية)
---------------------------------	-----------------------	---

المربع
المربع والمعين
ال平行四边形
المربيع

جميع خصائص متوازي الأضلاع والمستطيل والمعين تتطابق على المربع. فمثلاً قطر المربع ينصف كل منهما الآخر (متوازي أضلاع)، وهما متطابقان (مستطيل)، ومتعاددان (معين).

إثبات أن الشكل الرباعي معين أو مربع: تُحدد النظريات الآتية الشروط الكافية للمعنى والمربع.

اضف إلى
مطويتك

نظريات

تنبيه!

أخطاء شائعة
يخطئ البعض

فيستعمل النظريات

1.17، 1.18، 1.19


مع أي شكل رباعي،

وهذا غير صحيح؛ لأن

هذه النظريات تكون


صحيحة فقط إذا كان

الشكل الرباعي متوازي
أضلاع.




1.17 إذا كان قطراً متوازيَّاً أضلاع متعامدين
فإنه معين. (**عكس النظرية 1.15**)

مثال: إذا كان $JKLM$ متوازيَّاً أضلاع، وكان $JL \perp KM$ ،
فإنَّ $\square JKLM$ معين.



1.18 إذا نصف قطر متوازيَّاً أضلاع كُلَّاً من الزاويتين اللتين يصل بين
رأسيهما، فإنَّ متوازيَّاً أضلاع يكون معيناً. (**عكس النظرية 1.16**)

مثال: إذا كان $WXYZ$ متوازيَّاً أضلاع، وكانت $\angle 4 \cong \angle 2$ ، $\angle 3 \cong \angle 1$ ،
 $\angle 5 \cong \angle 6$ ، $\angle 7 \cong \angle 8$ ،
فإنَّ $\square WXYZ$ معين.




1.19 إذا كان ضلعان متتاليان في متوازيَّاً أضلاع
متطابقين فإنه معين.

مثال: إذا كان $ABCD$ متوازيَّاً أضلاع، وكان $AB \cong BC$ ،
فإنَّ $\square ABCD$ معين.

1.20 إذا كان الشكل الرباعي مستطيلاً ومعيناً فإنه مربع.

سوف تبرهن النظريات 1.17 إلى 1.20 في الأسئلة 29-32 على الترتيب.

يمكنك استعمال خصائص المعين والمربع في البراهين.



استعمال خصائص المعين والمربع في البراهين

مثال 2

اكتب برهاناً حرّاً.

المعطيات: $JKLM$ متوازيَّاً أضلاع.

$\triangle JKL$ متطابق الضلعين.


المطلوب: $\square JKLM$ معين.

برهان حرّ:

بما أنَّ $\triangle JKL$ متطابق الضلعين، فإنَّ $\overline{KL} \cong \overline{JK}$ بحسب التعريف، وهذا الضلعان متتاليان في متوازيَّاً
الأضلاع $JKLM$ ، لذا وبحسب النظرية 1.19، يكون $\square JKLM$ معيناً.

إرشادات للدراسة

المثلثات المتطابقة
بما أنَّ للمعين أربعة
أضلاع متطابقة، فإنَّ
كُلُّ من قطريه يقسمه
إلى مثليثين متطابقي
الضلعين ومتطابقين.
وإذا رسم القطران
فإنهما يقسامان المعين
إلى أربعة مثلثات قائمة
ومتطابقة.



تحقق من فهمك

(2) اكتب برهاناً حرّاً.

المعطيات: \overline{SQ} عمود منصف لـ \overline{PR}

\overline{PR} عمود منصف لـ \overline{SQ} .


$\triangle RMS$ متطابق الضلعين.

المطلوب: $PQRS$ مربع.


استعمال المعين والمربع

مثال 3 من واقع الحياة

علم الآثار: مفتاح الكشف الناجح عن الآثار هو وضع خريطة دقيقة لموقع البحث. كيف يمكن لعالم الآثار في الصورة أدناه أن يتحقق من أن منطقة بحثه هي مربع طول ضلعه 1 m مستعملًا الحبل وشريط القياس فقط؟




طول كل من أضلاع الشكل الرباعي $ABCD$ يساوي 1 m . وبما أن كل ضلعين متقابلين متطابقان، فإن $ABCD$ متوازي أضلاع. وبما أن أضلاع $ABCD$ المترالية متطابقة فإنه معين. وإذا استطاع عالم الآثار بيان أن $\square ABCD$ مستطيل أيضًا فإنه بحسب النظرية 1.20، يكون مربعاً.



إذا كان قطرًا متوازي الأضلاع متطابقين فإنه مستطيل؛ لذا يمكن لعالم الآثار استعمال الحبل لقياس طولي القطرين، فإذا وجدهما متساوين، فإن $\square ABCD$ يكون مربعاً.

تحقق من فهمك



3) خياطة: خاطت كوثر غطاء طاولة باستعمال قطع ملونة من القماش كما في الرسم المجاور.

- (A) رسمت كوثر قطرى كل من القطع الصفراء فوجدت أنهما متعامدان، هل يمكنها استنتاج أن كل قطعة صفراء معين؟ وضح إجابتك.
- (B) إذا كانت الزوايا الأربع للقطعة الخضراء متساوية القياس، والضلوعان الأيسر والسفلي متساوي الطول، فهل يمكنها استنتاج أن القطعة الخضراء مربع؟ وضح إجابتك.



الربط مع الحياة

علم الآثار هو دراسة أعمال الإنسان في العصور القديمة التي يزورنا بمعلومات حول حياته ونشاطاته. وساعد اكتشاف الإنسان للكتابة منذ 5000 عام تقريرياً على فهم أسرار أزمنة ما بعد هذا التاريخ.




استعملت الهندسة الإحداثية سابقاً لتصنيف المثلثات. ويمكن استعمال الهندسة الإحداثية لتصنيف الأشكال الرباعية أيضاً.

مثال 4

تصنيف الأشكال الرباعية باستعمال الهندسة الإحداثية

هندسة إحداثية: حدد ما إذا كان $\square JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه $J(-7, -2)$, $K(0, 4)$, $L(9, 2)$, $M(2, -4)$ معيناً أو مستطيلاً أو مربعاً. اكتب جميع التسميات التي تنطبق عليه. وضح إجابتك.



المعلمات: $\square JKLM$ إحداثيات رؤوسه:
 $J(-7, -2)$, $K(0, 4)$, $L(9, 2)$, $M(2, -4)$

المطلوب: إثبات أن $\square JKLM$ هو معين أو مستطيل أو مربع.

خطوٌ: عَيِّن الرؤوس على المستوى الإحداثي وصل بينها.

يظهر من الرسم أن أضلاع $\square JKLM$ متطابقة. ولكن زواياه ليست قوائم؛ لذا يبدو أنه معين وليس مربعاً أو مستطيلاً.

إذا كان قطراً متوازي الأضلاع متطابقين فإنه مستطيل. وإذا كانا متعامدين فإنه معين. وإذا كانوا متطابقين ومتوازين فإنه مستطيل ومعين؛ أي أنه مربع.

حل: أولاً: استعمل صيغة المسافة بين نقطتين للمقارنة بين طولي القطرين.

$$KM = \sqrt{(2-0)^2 + (-4-4)^2} = \sqrt{68} = 2\sqrt{17}$$

$$JL = \sqrt{[9-(-7)]^2 + [2-(-2)]^2} = \sqrt{272} = 4\sqrt{17}$$

بما أن $2\sqrt{17} \neq 4\sqrt{17}$ ، فإن القطرين ليسا متطابقين؛ لذا $\square JKLM$ ليس مستطيلاً. وبما أنه ليس مستطيلاً فإنه ليس مربعاً أيضاً.

ثانياً: استعمل صيغة الميل لتحديد ما إذا كان القطران متعامدين.

$$\text{مُيل } KM = \frac{-4-4}{2-0} = -4$$

$$\text{مُيل } JL = \frac{2-(-2)}{9-(-7)} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

وبما أن حاصل ضرب الميلين يساوي -1 ، فإن القطرين متعامدان؛ لذا فإن $\square JKLM$ معين.

$$JK = \sqrt{[4-(-2)]^2 + [0-(-7)]^2} = \sqrt{85}$$

$$KL = \sqrt{(9-0)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{85}$$

لذا فإن $\square JKLM$ معين بحسب النظرية 1.20 .

$$\text{مُيل } \frac{2-4}{9-0} = -\frac{2}{9} : \text{مُيل } \frac{4-(-2)}{0-(-7)} = \frac{6}{7} : \overline{JK}$$

وبما أن حاصل ضرب هذين الميلين لا يساوي -1 ، فإن الضلعين المترافقين JK و KL

غير متعامدين؛ لذا فإن $\angle JKL$ ليست قائمة؛ إذن $\square JKLM$ ليس مستطيلاً ولا مربعاً.


تحقق من فهمك




- (4) حدد ما إذا كان $\square JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه $J(5, 0)$, $K(8, -11)$, $L(-3, -14)$, $M(-6, -3)$ معيناً أو مستطيلاً أو مربعاً؟ اكتب جميع التسميات التي تنطبق عليه. وضح إجابتك.

إرشادات للدراسة

تمثيل الشكل بيانياً:
عند تحليل شكل رباعي باستعمال الهندسة الإحداثية، مثله بيانياً لمساعدتك على وضع تخمين، ثم تحقق من تخمينك جبراً.



- 4) بلاط:** تتكون الأرضية أدناه من 64 بلاطة مربعة متطابقة. استعمل هذه المعطيات لإثبات أن الأرضية نفسها مربعة.



هندسة إحداثية: حدد ما إذا كان $\square QRST$ المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي معيناً أو مستطيلاً أو مربعاً. اكتب جميع التسميات التي تنطبق عليه. وضح إجابتك.

$$Q(-2, -1), R(-1, 2), S(4, 1), T(3, -2) \quad (6) \quad Q(1, 2), R(-2, -1), S(1, -4), T(4, -1) \quad (5)$$

المثال 1


جبر: استعن بالمعين $ABCD$ المبين جانباً.

$$(1) \text{ إذا كان } m\angle BAC = 114^\circ, \text{ فأوجد } m\angle BCD.$$

$$(2) \text{ إذا كان } AB = 2x + 3, BC = x + 7, CD = \text{فأوجد } x.$$


برهان: اكتب برهاناً ذا عمودين

لإثبات أنه إذا كان معيناً $ABCD$ وكان $\overline{AP} \cong \overline{CP}$ قطراً فيه، فإن \overline{DB}

**المثالان 2, 3**

لإثبات أنه إذا كان معيناً $ABCD$ معيناً

وكان \overline{DB} قطراً فيه، فإن $\overline{AP} \cong \overline{CP}$.

المثال 4

جبر: استعن بالمعين $ABCD$ المبين جانباً.

$$(7) \text{ إذا كان } AB = 14, \text{ فأوجد } BC.$$

$$(8) \text{ إذا كان } m\angle BAC = 118^\circ, \text{ فأوجد } m\angle BCD.$$

$$(9) \text{ إذا كان } AC = x + 9 \text{ و } AP = 3x - 1, \text{ فأوجد } x.$$

$$(10) \text{ إذا كان } m\angle DAB = (2x + 3)^\circ \text{ و } m\angle ABC = (2x - 7)^\circ, \text{ فأوجد } x.$$

$$(11) \text{ إذا كان } m\angle DPC = (3x - 15)^\circ, \text{ فأوجد قيمة } x.$$


المثال 1

برهان: اكتب برهاناً ذا عمودين في كل مما يأتي :

(13) المعطيات: $JKQP$ مربع.

. \overline{KQ} تنصف كلاً من \overline{JP} و \overline{ML}


المطلوب: $JKLM$ متوازي أضلاع.



(12) المعطيات: $QRST$ متوازي أضلاع.

. $\overline{TR} \cong \overline{QS}$, $m\angle QPR = 90^\circ$


المطلوب: $QRST$ مربع.

**المثال 2**

طريق: يتقاطع طريقان كما في الشكل. إذا كانت

ممارات المشاة لها الطول نفسه، فصنف الشكل الرباعي

المكون من هذه الممارات. ووضح تبريرك.




(14) زراعة: حدد مزارع حقولاً بأوتاد وحبال كما في الشكل المجاور.

إذا كانت أضلاع الشكل الرباعي المتشكل متساوية الطول، وقطراه

متعامدين، فهل هذه المعلومات كافية كي تتحقق من أن الحقل مربع؟


وضوح تبريرك.

المثال 3

هندسة إحداثية: حدد ما إذا كان $\square JKLM$ المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي معيناً أو مستطيلاً أو مربعاً. اكتب جميع التسميات التي تنطبق عليه. ووضح إجابتك.

$$J(-3, -2), K(2, -2), L(5, 2), M(0, 2) \quad (17) \quad J(-4, -1), K(1, -1), L(4, 3), M(-1, 3) \quad (16)$$

$$J(-1, 1), K(4, 1), L(4, 6), M(-1, 6) \quad (19) \quad J(-2, -1), K(-4, 3), L(1, 5), M(3, 1) \quad (18)$$




في المعيّن $ABCD$ ، إذا كان $PB = 12, AB = 15, m\angle ABD = 24^\circ$ ، فأوجد كلاً مما يأتي :

$$CP \quad (21)$$

$$m\angle ACB \quad (23)$$

$$AP \quad (20)$$

$$m\angle BDA \quad (22)$$



في المربع $WXYZ$ ، إذا كان $WT = 3$ ، فأوجد كلاً مما يأتي :

$$XY \quad (25)$$

$$m\angle WYX \quad (27)$$

$$ZX \quad (24)$$

$$m\angle WTZ \quad (26)$$

برهان: اكتب برهاناً حرّاً لكل مما يأتي :

$$(30) \text{ النظرية 1.18}$$

$$(29) \text{ النظرية 1.17}$$

$$1.16 \quad (28)$$


$$(32) \text{ النظرية 1.20}$$

$$1.19 \quad (31)$$


برهان: اكتب برهاناً إحداثياً للعبارة في كل من السؤالين الآتيين :

$$(33) \text{ قطراً المربع متعامدان.}$$

(34) تشّكل القطع المستقيمة الواقعة بين منتصفات أضلاع مستطيل معيناً.



تصميم: يتكون نمط الفسيفساء المبين جانباً من قطع ثمانية متتظمة وأخرى رباعية. صنف الأشكال الرباعية في النمط، ووضح تبريرك.



36 تمثيلات متعددة: سوف تستقصي في هذه المسألة إحدى خصائص شكل الطائرة الورقية، وهو شكل رباعي يتكون من زوجين متمايزين من الأضلاع المجاورة والمتطابقة.

a) هندسياً: ارسم قطعة مستقيمة، ثم افتح الفرجار وثبته عند أحد طرفيها وارسم قوساً فوقها، ومن دون تغيير فتحة الفرجار، ثبت رأس الفرجار عند الطرف الآخر للقطعة المستقيمة، وارسم قوساً يقطع القوس السابق. غير فتحة الفرجار وارسم قوسين أسفل القطعة المستقيمة كما فعلت سابقاً.

استعمل المسطرة وصل بين طرفي القطعة والأقواس، وسيتّج لك شكل طائرة ورقية سمّها $ABCD$. ثم كرر ذلك مرتين، وسمّ شكل الطائرتين الورقيتين، $PQRS$ ، ثم ارسم قطرى كل منها، ولتكن نقطة تقاطع قطرى كل منها N .

b) جدولياً: استعمل مسطرة لقياس المسافة من N إلى كل رأس. وسجل الناتج في جدول على النحو الآتي.




الربط مع الحياة

الفسيفساء صور تُشكّل باستخدام أنماط من أحجار أو زجاج أو قرميد أو أي مواد أخرى. والفصيّفاساء في الصورة أعلاه فسيفساء إغريقية قديمة من الصخر البلوري (الكوارتز). استعمل الإغريق قطعاً صغيرة أو أشكالاً منتظمة من المواد منذ 200 سنة قبل الميلاد بدلًا من الصخر البلوري في أعمال الفسيفساء.

الشكل	المسافة من N إلى كل رأس على القطر الأقصر	المسافة من N إلى كل رأس على القطر الأطول
$ABCD$		
$PQRS$		
$WXYZ$		

٢) **لفظياً:** اكتب تخميناً حول قطرى شكل الطائرة الورقية.

مسائل مهارات التفكير العليا



(37) **اكتشف الخطأ:** في الشكل الرباعي $SRQP$ المبين جانباً، $\overline{PR} \cong \overline{QS}$


قال محمد: إن الشكل مربع. بينما قال إبراهيم: إنه معين.

هل أي منهما على صواب؟ ووضح تبريرك.

(38) **تبرير:** حدد ما إذا كانت العبارة الآتية صحيحة أم خطأ؟ ثم اكتب عكسها ومعكوسها ومعاكسها الإيجابي، وحدد قيمة الصواب لكل منها.

وضوح تبريرك.

إذا كان الشكل الرباعي مربعًا، فإنه مستطيل.



(39) **تحدد:** مساحة المربع $ABCD$ المجاور تساوي 36 وحدة مربعة.

ومساحة $\triangle EBF$ تساوي 20 وحدة مربعة. إذا كانت $\overline{EB} \perp \overline{BF}$


وطول \overline{AE} يساوي وحدتين، فأوجد طول \overline{CF} .

(40) **مسألة مفتوحة:** أوجد إحداثيات رؤوس مربع قطره محتويان في المستقيمين $6x + y = -x$ ، $y = x$. ووضح تبريرك.

(41) **اكتتب:** قارن بين جميع خصائص الأشكال الرباعية الآتية: متوازي الأضلاع، المستطيل، المعين، المربع.


تدريب على اختبار

(43) **جبر:** ما قيمة كل من x ، y بحيث يكون $ABCD$ متوازي أضلاع؟




- $x = 3, y = 2$ **A**
- $x = \frac{3}{2}, y = -1$ **B**
- $x = 2, y = 3$ **C**
- $x = 3, y = -1$ **D**

(42) في المعين $JKLM$ ، إذا كان $JC = 10$ ، $CK = 8$



- | | | | |
|----|----------|---|----------|
| 8 | C | 4 | A |
| 10 | D | 6 | B |



في المستطيل $ABDC$ ، إذا كان $m\angle 1 = 38^\circ$. فأوجد كلاً من القياسات الآتية : (الدرس 1-4)

$m\angle 6$ (46)

$m\angle 5$ (45)

$m\angle 2$ (44)

مراجعة تراكمية


في المستطيل $ABDC$ ، إذا كان $m\angle 1 = 38^\circ$. فأوجد كلاً من القياسات الآتية : (الدرس 1-4)

$m\angle 6$ (46)


$m\angle 5$ (45)

$m\angle 2$ (44)


حدد ما إذا كان الشكل الرباعي في كل مما يأتي متوازي أضلاع أم لا. بره إجابتك. (الدرس 1-3)



(49)



(48)



(47)

(50) **قياسات:** قال مروان: إن الحديقة الخلفية لمنزله على شكل مثلث أطوال أضلاعه .22 ft, 23 ft, 45 ft فهل ترى أن هذه القياسات صحيحة؟ ووضح تبريرك. (مهارة سابقة)



استعد للدرس اللاحق

حل كل معادلة مما يأتي :

$$\frac{1}{2}(5x + 7x - 1) = 11.5 \quad (51)$$

$$\frac{1}{2}(10x + 6x + 2) = 7 \quad (52)$$

$$\frac{1}{2}(12x + 6 - 8x + 7) = 9 \quad (53)$$




شبه المنحرف وشكل الطائرة الورقية

Trapezoid and Kite

لماذا؟



تُسْتَعْمَلُ فِي رِياضَاتِ الْقَفْزِ، صَنَادِيقُ ذَاتِ أَجْزَاءٍ مُتَدَاخِلَةٍ مُصْنَوَّعةٌ مِنِ الإِسْفِنجِ ذِي الضَّغْطِ العَالِيِّ، وَتُتَخَذُ مِنْصَاتٍ وَثُبُّ وَدَرَجَاتٍ صَعُودٍ، وَتُمَثِّلُ جُوَانِبَ كُلِّ مِنَ الْأَجْزَاءِ شَبَهِ مُنْحَرِفٍ.



خصائص شبه المنحرف: شَبَهُ الْمُنْحَرِفِ هُوَ شَكْلٌ رِبَاعِيٌّ فِيهِ ضَلَاعَانِ فَقْطٍ مُتَوَازِيَانِ يُسَمِّيَانِ قَاعِدَتَيْ شَبَهِ الْمُنْحَرِفِ. وَيُسَمِّيُ الضَّلَاعَانِ غَيْرِ المُتَوَازِيَيْنِ سَاقَيْ شَبَهِ الْمُنْحَرِفِ. وَزاوِيتَا الْقَاعِدَةِ مُكْوَنٌ كُلُّ مِنْهُمَا مِنْ قَاعِدَةٍ وَاحِدَةٍ ضَلَاعِيَ السَّاقَيْنِ. فِي شَبَهِ الْمُنْحَرِفِ $ABCD$ الْمُبَيَّنِ جَانِبًاً، $\angle A$ ، $\angle B$ زَاوِيتَا الْقَاعِدَةِ \overline{AB} وَكَذَلِكَ $\angle C$ ، $\angle D$ زَاوِيتَا الْقَاعِدَةِ \overline{DC} .

إِذَا كَانَ سَاقَا شَبَهِ الْمُنْحَرِفِ مُتَطَابِقَيْنِ فَإِنَّهُ يُسَمِّي شَبَهَ مُنْحَرِفٍ مُتَطَابِقَ السَّاقَيْنِ.

فيما سبق:

درستُ استعمال خصائص أنواع خاصة من متوازي الأضلاع.

(الدرس 1-5)

والآن:

■ أتَعْرَفُ خَصَائِصَ شَبَهِ الْمُنْحَرِفِ وَأَطْبِقُهَا.

■ أتَعْرَفُ خَصَائِصَ شَكْلِ الطَّائِرَةِ الْوَرْقِيَّةِ وَأَطْبِقُهَا.

المفردات:

شبه المنحرف
trapezoid

قاعات شبه المنحرف
bases

ساق شبه المنحرف
legs of a trapezoid

زاويا القاعدة
base angles


شبه المنحرف
isosceles trapezoid

القطعة المتوسطة
midsegment of a trapezoid

شكل الطائرة الورقية
kite

نظريات

اضف إلى
مطويتك



شبه المنحرف متطابق الساقين

1.21

إذا


كان شبه المنحرف

متطابق

الساقين

مثال: إذا كان شبه المنحرف $FGHJ$ متطابق الساقين،

$$\angle G \cong \angle H, \angle F \cong \angle J \quad \text{فإن} \quad \angle G \cong \angle H, \angle F \cong \angle J$$



1.22

إذا

كانت زاويا

قاعدة

في شبه المنحرف

متطابقتين


فإنه

متطابق

الساقين

مثال: إذا كان $KLMP$ شبه منحرف، فيه

$$\angle L \cong \angle M \quad \text{فإنه متطابق الساقين.}$$



1.23

يكون

شبه

المنحرف

متطابق

الساقين

مثال: إذا كان شبه المنحرف $QRST$ متطابق الساقين،

$$\text{فإن } \overline{QS} \cong \overline{RT}. \text{ وكذلك إذا كان } QRST \text{ شبه منحرف،}$$

فيه متطابق الساقين.

سوف تبرهن النظريات 1.21, 1.22, 1.23 في الأسئلة 19, 20, 21 على الترتيب.

الحالة الأولى من النظرية 1.23

المعطيات: $ABCD$ شبه منحرف متطابق الساقين.

المطلوب: $\overline{AC} \cong \overline{BD}$

معطى شبه منحرف متطابق الساقين.

خاصية الانعكاس للتطابق

$\overline{DC} \cong \overline{CD}$

خاصية الانعكاس للتطابق

$\overline{AD} \cong \overline{BC}$

تعريف شبه المنحرف

$\angle ADC \cong \angle BCD$

زاويا قاعدة شبه المنحرف

المتطابق الساقين متطابقتان.

المتطابق الساقين متطابقتان.

$\triangle ADC \cong \triangle BCD$


SAS

$\overline{AC} \cong \overline{BD}$

ضلاعان متاظران في

متلقيين متطابقين

استعمال خصائص شبه المنحرف المتطابق الساقين



مكبات الصوت: المنظر الأمامي لمكّبّر الصوت المبيّن جانباً على شكل شبه منحرف متطابق الساقين. إذا كان $m\angle FJH = 85^\circ$, $FK = 8 \text{ in}$, $JG = 19 \text{ in}$ فأوجد كلاً مما يأتي :

$$m\angle FGH \text{ (a)}$$

بما أن $FGHJ$ شبه منحرف متطابق الساقين، فإن $\angle GHJ = \angle FJH$ زاويتا قاعدة متطابقتان، لذا فإن $m\angle GHJ = m\angle FJH = 85^\circ$.

و بما أن $FGHJ$ شبه منحرف، فإن $\overline{FG} \parallel \overline{JH}$.

نظريّة الزاويتين المترافقتين

بالتعويض

بطرح 85 من كلا الطرفين

$$m\angle FGH + m\angle GHJ = 180^\circ$$

$$m\angle FGH + 85^\circ = 180^\circ$$

$$m\angle FGH = 95^\circ$$

$$KH \text{ (b)}$$

بما أن $FGHJ$ شبه منحرف متطابق الساقين، فإن القطرين \overline{FH} و \overline{JG} متطابقان.

تعريف تطابق القطع المستقيمة

$$FH = JG$$

سلمة جمع القطع المستقيمة

$$FK + KH = JG$$

بالتعويض

$$8 + KH = 19$$

بطرح 8 من كلا الطرفين

$$KH = 11 \text{ in}$$

إرشادات للدراسة


شبه المنحرف المتطابق الساقين:
تكون زاويتا كل قاعدة في شبه المنحرف متطابقتين فقط إذا كان شبه المنحرف متطابق الساقين.



الربط مع الحياة

مكبات الصوت هي مضخّمات تُكتَفِّي الأمواج الصوتية حتى تصبح مسموعة بدرجة أكبر. ويحتوي كل من المذياع والتلفاز والحاسوب على مضخّمات صوتية.

تحقق من فهمك



1) مطاعم: لاستغلال مساحة الطاولات المربعة، تستعمل في مطعم أطباق على شكل شبه منحرف كما في الشكل المجاور. إذا كان $WXYZ$ شبه منحرف متطابق الساقين، وكان $m\angle YZW = 85^\circ$, $WV = 15 \text{ cm}$, $VY = 10 \text{ cm}$, فأوجد كلاً مما يأتي :

$$XZ \text{ (C)}$$

$$m\angle WXY \text{ (B)}$$


$$m\angle XWZ \text{ (A)}$$

يمكنك استعمال الهندسة الإحداثية لتحديد ما إذا كان شبه المنحرف متطابق الساقين أم لا.

شبه المنحرف المتطابق الساقين والهندسة الإحداثية

مثال 2


هندسة إحداثية: رؤوس الشكل الرباعي $ABCD$ هي $A(-3, 4)$, $B(2, 5)$, $C(3, 3)$, $D(-1, 0)$.



بين أن $ABCD$ شبه منحرف، وحدّد ما إذا كان متطابق الساقين. ووضّح إجابتك.

ارسم الشكل الرباعي $ABCD$ في مستوى إحداثي.

الخطوة 1: استعمل صيغة الميل لمقارنة ميلي الضلعين المتقابلين \overline{BC} , \overline{AD} , \overline{AB} , \overline{DC} . وكذلك الضلعين المتقابلين \overline{AB} , \overline{DC} . فالشكل الرباعي يكون شبه منحرف إذا كان فيه ضلعان فقط متقابلان متوازيين.



: \overline{BC} , \overline{AD} الضلعان المتقابلان
 $\frac{3-5}{3-2} = \frac{-2}{1} = -2$ ميل : \overline{BC}
 $\frac{0-4}{-1-(-3)} = \frac{-4}{2} = -2$ ميل : \overline{AD}
. $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ متساويان، فإنّ

: \overline{AB} , \overline{DC} الضلعان المتقابلان

$$\frac{5-4}{2-(-3)} = \frac{1}{5} \text{ ميل : } \overline{AB}$$

$$\frac{0-3}{-1-3} = \frac{-3}{-4} = \frac{3}{4} \text{ ميل : } \overline{DC}$$

بما أنّ ميلي \overline{AB} و \overline{DC} ليسا متساوين، فإنّ $\overline{AB} \not\parallel \overline{DC}$. وبما أنّ $ABCD$ فيه ضلعان فقط متوازيان، فإنه شبه منحرف.

الخطوة 2: استعمل صيغة المسافة بين نقطتين للمقارنة بين طولي الساقين \overline{AB} , \overline{DC} وتحديد ما إذا كان شبه المنحرف $ABCD$ متطابق الساقين.

$$AB = \sqrt{(-3 - 2)^2 + (4 - 5)^2} = \sqrt{26}$$

$$DC = \sqrt{(-1 - 3)^2 + (0 - 3)^2} = \sqrt{25} = 5$$

بما أنّ $AB \neq DC$ ، فإنّ شبه المنحرف $ABCD$ ليس متطابق الساقين.

قراءة الرياضيات

رمز التوازي: تذكر
أن الرمز \parallel يعني يوازي،
والرمز $\not\parallel$ يعني لا يوازي.

تحقق من فهمك

- 2) رؤوس الشكل الرباعي $QRST$ هي $Q(-8, -4)$, $R(0, 8)$, $S(6, 8)$, $T(-6, -10)$.
بيّن أن $QRST$ شبه منحرف، وحدّد ما إذا كان متطابق الساقين. ووضّح إجابتك.

القطعة المتوسطة لشبه المنحرف هي قطعة مستقيمة تصل بين منتصفي ساقيه. وتبيّن النظرية الآتية العلاقة بين القطعة المتوسطة وقاعدتي شبه المنحرف.



قراءة الرياضيات

القطعة المتوسطة:
تسمى القطعة
المتوسطة لشبه
المنحرف أيضاً القطعة
المنصفة.


نظريّة 1.24 القطعة المتوسطة لشبه المنحرف

نظريّة 1.24


القطعة المتوسطة لشبه المنحرف توازي كلاً من القاعدتين،
وطولها يساوي نصف مجموع طولي القاعدتين.
مثال: إذا كانت \overline{BE} قطعة متوسطة لشبه المنحرف $ACDF$ ،
فإنّ $\overline{AF} \parallel \overline{BE}$, $\overline{CD} \parallel \overline{BE}$,
 $.BE = \frac{1}{2}(AF + CD)$

أضف إلى

مطويتك



مثال ٣ من اختبار



في الشكل المجاور، قطعة متوسطة \overline{LH} لشبة المنحرف $FGJK$. ما قيمة x ؟

اقرأ سؤال الاختبار

أُعطيت في السؤال طول القطعة المتوسطة لشبة المنحرف وطول إحدى قاعدتيه. ويطلب إليك إيجاد طول القاعدة الأخرى.

حل سؤال الاختبار

نظيرية القطعة المتوسطة لشبة المنحرف

$$LH = \frac{1}{2} (FG + KJ)$$

بالتعويض

$$15 = \frac{1}{2} (x + 18.2)$$

بضرب كلا الطرفين في 2

$$30 = x + 18.2$$



بطرح 18.2 من كلا الطرفين

$$11.8 = x$$

تحقق من فهمك



٣) في الشكل أدناه، قطعة متوسطة لشبة المنحرف $LMNP$. ما قيمة x ؟




خصائص شكل الطائرة الورقية: شكل الطائرة الورقية هو شكل رباعي يتكون من زوجين متباينين من الأضلاع المتقابلة الممتداة. وعلى

عكس متوازي الأضلاع، كل ضلعين متقابلين في شكل الطائرة الورقية ليسا متطابقين ولا متوازيين.

نظريات


شكل الطائرة الورقية

أضف إلى
مطويتك



1.25 قطرًا شكل الطائرة الورقية متعامدان.

مثال: بما أن $ABCD$ شكل طائرة ورقية،
 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$



1.26 يوجد في شكل الطائرة الورقية زوج واحد فقط من الزوايا

المتقابلة المتطابقة، هما الزاويتان المحصورتان بين كل ضلعين متجاورين غير متطابقين.


مثال: بما أن $JKLM$ شكل طائرة ورقية، فإن $\angle J \cong \angle L$, $\angle K \neq \angle M$.

سوف تبرهن النظريتين 1.25 ، 1.26 في السوالين 23 ، 22 على الترتيب.

يمكنك استعمال النظريتين أعلاه ونظرية فيثاغورس ونظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع لإيجاد القياسات المجهولة في شكل الطائرة الورقية.

استعمال خصائص شكل الطائرة الورقية

مثال 4



a) إذا كان $FGHJ$ شكل طائرة ورقية، فأوجد $m\angle F$.

في شكل الطائرة الورقية زوج واحد فقط من الزوايا المقابلة المتطابقة، وبما أن $\angle G \neq \angle J$ ، فإن $\angle F \cong \angle H$ ؛ لذلك $m\angle F = m\angle H$. اكتب معادلة وحلها لإيجاد $m\angle F$.

نظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع

$$m\angle F + m\angle G + m\angle H + m\angle J = 360^\circ$$

بالتعويض

$$m\angle F + 128^\circ + m\angle F + 72^\circ = 360^\circ$$

بالتبسيط

$$2m\angle F + 200^\circ = 360^\circ$$

طرح 200 من كلا الطرفين

$$2m\angle F = 160^\circ$$


قسمة كلا الطرفين على 2

$$m\angle F = 80^\circ$$



الربط مع الحياة

أقصى سرعة مسجلة لطائرة ورقية .120 mi/h وأقصى ارتفاع مسجل لطائرة ورقية .12471 ft



b) إذا كان $WXYZ$ شكل طائرة ورقية، فأجد ZY .

بما أن قطري شكل الطائرة الورقية متعامدان فإنهما يقسمانه إلى أربعة مثلثات قائمة الزاوية. استعمل نظرية فيثاغورس لإيجاد ZY ، وهو طولوتر المثلث القائم الزاوي $\triangle YPZ$.

نظرية فيثاغورس

$$PZ^2 + PY^2 = ZY^2$$

$$8^2 + 24^2 = ZY^2$$

$$640 = ZY^2$$


$$\sqrt{640} = ZY$$

$$8\sqrt{10} = ZY$$

أخذ الجذر التربيعي الموجب للطرفين

بالتبسيط


تحقق من فهمك



4A) إذا كان $ABCD$ شكل طائرة ورقية، فيه:


$m\angle ADC = 38^\circ$, $m\angle BAD = 50^\circ$ ، فأجد $m\angle BCD$.

4B) إذا كان $BT = 5$, $TC = 8$ ، فأجد CD .



أ) إذا كان: $WT = 2$
 $ZX = 20, TY = 15$

أوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:




المثال 1

المثال 2

المثال 3


المثال 4





ب) إجابة قصيرة: في الشكل المجاور: قطعة متوسطة
 لشبه المنحرف $TWYR$. أوجد قيمة x .

إذا كان $ABCD$ على شكل طائرة ورقية، فأوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:

c) $m\angle C = ?$




d) $AB = ?$



أ) إذا كان: $PW = 9$
 $XZ = 18, PY = 3$

أوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:

e) $m\angle K = ?$



المثال 1


المثال 2

المثال 3


ج) $J(-4, -6), K(6, 2), L(1, 3), M(-4, -1)$ (11)
 $W(-5, -1), X(-2, 2), Y(3, 1), Z(5, -3)$ (13)

د) $A(-2, 5), B(-3, 1), C(6, 1), D(3, 5)$ (10)
 $Q(2, 5), R(-2, 1), S(-1, -6), T(9, 4)$ (12)


هـ) في الشكل المجاور، S, V نقطتا متضقي الساقين لشبه المنحرف $QRTU$.
 إذا كان $QR = 12, UT = 22$ ، $VS = 9$ ، $UT = 12$ ، $VS = 9$ ، $QR = 5$ ، $VS = 11$ ، $UT = 22$.



إذا كان $WXYZ$ شكل طائرة ورقية، فأوجد القياس المطلوب في كل مما يأتي :



$m\angle X$ (18)



WP (17)

برهان: اكتب برهاناً حرّاً لـ كلٍ من النظريات الآتية :


(21) النظرية 1.23

(20) النظرية 1.22

(19) النظرية 1.21

(23) النظرية 1.26

(22) النظرية 1.25



(24) نباتات: اشتري مشاري أصيصاً زراعياً أو جهه الأربعه على شكل شبه منحرف أبعاده كما في الشكل المجاور. إذا أراد مشاري وضع رف أفقي عند متصرف الأصيص؛ ل تستند إليه البنية، فكم يكون عرض هذا الرف؟



الربط مع الحياة

تمتاز الأصص الفخارية بالمسامية والتهوية وصرف المياه الزائد، مما يسمح بنمو جيد للجذور، وهي من أفضل الأصص الزراعية.


(25) برهان: اكتب برهاناً إحداثياً للنظرية 1.24.

(26) هندسة إحداثية: استعن بالشكل الرباعي $ABCD$ المجاور.

a) بين أن $ABCD$ شبه منحرف. وحدّد ما إذا كان متطابق الساقين. ووضح إجابتك.

b) هل القطعة المتوسطة محتواة في المستقيم الذي معادله $y = -x + 1$ برر إجابتك.

c) أوجد طول القطعة المتوسطة.



جبر: في الشكل المجاور، $ABCD$ شبه منحرف. أوجد قيمة x بحيث يكون متطابق الساقين في كلٍ مما يأتي :

(27) إذا كان $AC = 3x - 7$, $BD = 2x + 8$


(28) إذا كان $m\angle ABC = (4x + 11)^\circ$, $m\angle DAB = (2x + 33)^\circ$

جبر: في الشكل المجاور، M, P نقطتاً متنصفان للساقين لـ شبه المنحرف $QRST$.
إذا كان $QR = 4x$, $PM = 12$, $TS = 2x + 2$ ، فأوجد قيمة x .

(29) إذا كان $TS = 6x$, $PM = 20$, $QR = 3x$ ، فأوجد قيمة x .

(30) إذا كان $PM = 2x$, $QR = 3x$, $TS = 10$ ، فأوجد PM .

(31) إذا كان $TS = 2x + 2$, $QR = 5x + 3$, $PM = 13$ ، فأوجد TS .





تسوق: الوجه الجانبي لحقيقة التسوق المبينة جانبًا على شكل شبه منحرف متطابق الساقين. إذا كان $EC = 9 \text{ in}$, $DB = 19 \text{ in}$ ، فأوجد كلٌ مما يأتي :

(32) AC (33) AE

(34) $m\angle EDC$ (36) $m\angle BCD$

(35) $m\angle BCD$






جبر: في الشكل المجاور، $WXYZ$ شكل طائرة ورقية.

$$\text{إذا كان } m\angle WXY = 120^\circ, m\angle WZY = (4x)^\circ \quad (37)$$

$$\therefore m\angle ZYX, m\angle ZWX = (10x)^\circ$$

$$\text{إذا كان } m\angle WXY = (13x + 24)^\circ, m\angle WZY = 35^\circ \quad (38)$$


$$\therefore m\angle ZYX, m\angle ZWX = (13x + 14)^\circ$$



برهان: اكتب برهاناً ذا عمودين.

(39) المعطيات: $\overline{ZV} \cong \overline{WZ}$, $\angle W \cong \angle ZXY$, $\angle Z \cong \angle ZV$.

المطلوب: $WXYV$ شبه منحرف متطابق الساقين.



(40) **طائرة ورقية:** استعن بالطائرة الورقية في الشكل المجاور.

اكتب باستعمال خصائص شكل الطائرة الورقية برهاناً ذا عمودين


لبيان أن $\triangle PNR \cong \triangle MNR$ يطابق.

(41) **أشكال فن:** ارسم شكل فن يوضح جميع الأشكال الرباعية متضمناً شبه المنحرف المتطابق الساقين، وشكل الطائرة الورقية وعموم الأشكال الرباعية التي لا أسماء خاصة لها.

هندسة إحداثية: حدد ما إذا كان الشكل المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي شبه منحرف، أم متوازي أضلاع، أم مستطيلًا، أم مربعًا، أم معيناً، أم هو شكل رباعي فحسب؟ اختر أكثر المسميات تحديداً، ووضح إجابتك.

$$W(-3, 4), X(3, 4), Y(5, 3), Z(-5, 1) \quad (43)$$

$$A(-1, 4), B(2, 6), C(3, 3), D(0, 1) \quad (42)$$



(44) **تمثيلات متعددة:** سوف تستقصي في هذه المسألة إحدى خصائص شكل

الطائرة الورقية.

a) **هندسياً:** ارسم قطعة مستقيمة. وأنشئ عموداً منصفاً لها لا تتصفه القطعة المستقيمة ولا تساويه طولاً. ثم صل أطراف القطعتين المستقيمتين لتكونن الشكل الرباعي $ABCD$ كما في الشكل المجاور. كرر هذه العملية مرتين، وسم الشكليين الرباعيين الجديدين $PQRS$, $WXYZ$.

b) **جدولياً:** انقل الجدول الآتي وأكمله.

الشكل	الضلع	الضلع	الضلع	الضلع	الضلع	الضلع	الضلع	الطول	الطول
$ABCD$	\overline{DA}		\overline{CD}		\overline{BC}		\overline{AB}		
$PQRS$	\overline{SP}		\overline{RS}		\overline{QR}		\overline{PQ}		
$WXYZ$	\overline{ZW}		\overline{YZ}		\overline{XY}		\overline{WX}		


c) **لفظياً:** اكتب تخميناً حول الشكل الرباعي الذي قطره متعامدان وغير متطابقين، وأحدهما فقط ينصف الآخر.

برهان: اكتب برهاناً إحداثياً لكل من العبارتين الآتتين :

(45) قطران شبه المنحرف المتطابق الساقين متطابقان.

(46) القطعة المتوسطة لشبه المنحرف المتطابق الساقين توازي كلاً من القاعدتين.

مسائل مهارات التفكير العليا



(47) اكتشف الخطأ: أوجد كل من عادل وسعيد $m\angle A$ في شكل الطائرة الورقية المجاور. هل إجابة أيٍّ منها صحيحة؟ وضح إجابتك.

سعيد
 $m\angle A = 45^\circ$

عادل
 $m\angle A = 115^\circ$

(48) تحد: إذا كان الضلعان المترافقان في شبه منحرف محتويين في المستقيمين $y = x + 4$, $y = x - 8$ ، فما معادلة المستقيم الذي يحتوي القطعة المتوسطة لشبه المنحرف؟

(49) تبرير: هل العبارة "المربع هو أيضاً شكل طائرة ورقية" صحيحة أحياناً أم دائمًا غير صحيحة أبدًا؟ وضح إجابتك.

(50) مسألة مفتوحة: ارسم شبه المنحرف $ABCD$ ، وشبه المنحرف $FGHJ$ غير المتطابقين وفيهما $\overline{AC} \cong \overline{FH}$ غير المتطابقين وفيهما $\overline{BD} \cong \overline{GJ}$ و


(51) اكتب: قارن بين خصائص كلٍّ من: شبه المنحرف وشبه المنحرف المتطابق الساقين وشكل الطائرة الورقية.

تدريب على اختبار

(53) ما الشكل الذي يمكن أن يكون مثلاً مضاداً للتخمين الآتي؟
إذا كان قطرًا شكل رباعي متطابقين فإنه مستطيل.

- A المربع
- B المعين
- C متوازي الأضلاع
- D شبه المنحرف المتطابق الساقين


(52) إذا كان $ABCD$ شكل طائرة ورقية، فما قياس $\angle C$ ؟



جبر: استعن بالمعين $DFGH$ فيما يأتي: (الدرس 1-5)
إذا كان $m\angle MHG = 118^\circ$ ، فأوجد $m\angle FGH$.

(54) إذا كان $DM = 4x - 3$, $MG = x + 6$ ، فأوجد DG .

(55) إذا كان $HM = 12$, $HD = 15$ ، فأوجد MG .




(56) برهان: اكتب برهانًا ذا عمودين. (الدرس 1-5)

المعطيات: $\angle CMF \cong \angle EMF$,

$\angle CFM \cong \angle EFM$

المطلوب: $\triangle DMC \cong \triangle DME$



استعد للدرس اللاحق

أوجد ميل القطعة المستقيمة المعطاة إحداثيات طرفيها في كل مما يأتي:



$(y, x), (y, y)$ (60)

$(-x, 5x), (0, 6x)$ (59)

$(x, 4y), (-x, 4y)$ (58)

دليل الدراسة والمراجعة

ملخص الفصل

ساقا شبه المنحرف (ص. 52)

زاويا القاعدة (ص. 52)

شبه المنحرف

المتطابق الساقين (ص. 52)

القطعة المتوسطة

شبه المنحرف (ص. 54)

شكل الطائرة الورقية (ص. 55)

المفردات الأساسية

القطر (ص. 12)

متوازي الأضلاع (ص. 21)

المستطيل (ص. 38)

المعين (ص. 44)

المربع (ص. 45)

شبه المنحرف (ص. 52)

قاعدتا شبه

المنحرف (ص. 52)

اختبار المفردات

بين ما إذا كانت كل جملة مما يأتي صحيحة أو غير صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فاستبدل بالكلمة التي تحتها خط كلمة من القائمة أعلاه، لجعل الجملة صحيحة:

(1) زاويا قاعدة شبه المنحرف متطابقتان.

(2) إذا كان متوازي الأضلاع مستطيلًا، فإن قطره متطابقان.

(3) القطعة المتوسطة لشبه المنحرف تصل بين رأسين غير متتاليين فيه.

(4) قاعدة شبه المنحرف هي إحدى ضلعه المتوازيين.

(5) قطر المعين متعمدان.

(6) قطر شبه المنحرف قطعة مستقيمة تصل بين نقطتي متضقي ساقيه.

(7) المستطيل يكون دائمًا متوازي أضلاع.

(8) الشكل الرباعي الذي فيه زوج واحد من الأضلاع المتوازية هو متوازي أضلاع.

(9) المعين الذي إحدى زواياه قائمة مستطيل.

(10) ساق شبه المنحرف هو أحد ضلعه غير المتوازيين.

المفاهيم الأساسية

زوايا المضلع (الدرس 1-1)

- يعطى مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع محدب بالصيغة $S = (n - 2) \cdot 180^\circ$ ، حيث n عدد الأضلاع.
- مجموع قياسات الزوايا الخارجية لمضلع محدب بأخذ زاوية واحدة عند كل رأس يساوي 360° .

خصائص متوازي الأضلاع : (الدرسان 1-2 و 1-3)

- كل ضلعين متقابلين متطابقان.
- كل زاويتين متقابليتين متطابقتان.
- كل زاويتين متحالفتين متكاملتان.
- إذا كانت إحدى الزوايا قائمة، فإن الزوايا الأخرى قوائم.
- القطران ينصف كل منهما الآخر.
- قطره يقسمه إلى مثلثين متطابقين.

خصائص المستطيل والمعين والمربع وشبه المنحرف وشكل الطائرة الورقية (الدروس 1-4 إلى 1-6)

- للمستطيل جميع خصائص متوازي الأضلاع. وقطراته متطابقان. وزواياه الأربع قوائم.
- للمعين جميع خصائص متوازي الأضلاع. وجميع أضلاعه متطابقة، وقطراته متعمدان، وينصفان زواياه.
- للمربع جميع خصائص متوازي الأضلاع والممستطيل والمعين.
- زاويا كل قاعدة في شبه المنحرف المتطابق الساقين متطابقتان، والقطران متطابقان أيضًا.
- قطراً شكل الطائرة الورقية متعمدان، ويوجد فيه زوج واحد فقط من الزوايا المقابلة المتطابقة هما الزاويتان المحصورتان بين كل ضلعين متقاربين غير متطابقين.

الموارد المنظمة

تأكد من أن المفاهيم الأساسية
مدونة في مطويتك.



مراجعة الدراسات والمراجعة

زوايا المضلع (ص 12-19)

1-1

مثال 1
أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع محدب عدد أضلاعه 22.

$$\begin{aligned} \text{بكتابة معادلة} \quad S &= (n - 2) \cdot 180^\circ \\ \text{بالتعويض} \quad &= (22 - 2) \cdot 180^\circ \\ \text{بالطرح} \quad &= 20 \cdot 180^\circ \\ \text{بالضرب} \quad &= 3600^\circ \end{aligned}$$

مثال 2
قياس زاوية داخلية لمضلع منتظم 157.5. أوجد عدد أضلاعه.
 بكتابة المعادلة $157.5n = (n - 2) \cdot 180^\circ$
 خاصية التوزيع $157.5n = 180^\circ n - 360^\circ$
 بالطرح $-22.5^\circ n = -360^\circ$
 بالقسمة $n = 16$
 إذن عدد أضلاع المضلع 16 ضلعاً.

أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية في كل من المضلعين المحددين الآتيين :

(11) العشاري.

(12) ذو 15 ضلعاً.



(13) زخرفة : يمثل نموذج الزخرفة المجاور شكلاً سداسيًا منتظمًا.

أوجد مجموع قياسات زواياه الداخلية.

أوجد عدد أضلاع المضلع المنتظم المعطى قياس إحدى زواياه الداخلية في كل مما يأتي :


135° (14)

168° (15)

متوازي الأضلاع (ص 21-28)

1-2

استعمل $\square ABCD$ المبين جانباً لإيجاد كل مما يأتي :




(16) $m\angle ADC$

(17) AD

(18) AB

(19) $m\angle BCD$

جبر: إذا كان $KLMN$ متوازي أضلاع، فأوجد قيمة المتغير في كل مما يأتي :



الأضلاع المتقابلة في \square متطابقة

تعريف تطابق القطع المستقيمة

بالتعويض

بالقسمة

قطرا \square ينصف كل منهما الآخر

تعريف تطابق القطع المستقيمة

بالتعويض

بالطرح

بالقسمة

مثال 3

$\overline{KN} \cong \overline{LM}$

$KN = LM$

$36 = 9x$

$4 = x$

y (b)

$\overline{NJ} \cong \overline{JL}$


$NJ = JL$

$y + 15 = 3y - 7$


$-2y = -22$

$y = 11$

جبر: أوجد قيمتي y , x في كل من متوازي الأضلاع الآتيين :



(21)



(20)


(22) تصميم: ما المعطيات الضرورية لتحديد ما إذا كانت الأجزاء المكونة للنمط أدناه متوازيات أضلاع؟




1-3

تمييز متوازي الأضلاع (ص 36-29)

حدد ما إذا كان الشكل الرباعي في كل مما يأتي متوازي أضلاع أم لا.
برر إجابتك.



(24)




(23)


برهان: اكتب برهاناً ذا عمودين.

المعطيات: $\square ABCD$, $\overline{AE} \cong \overline{CF}$


المطلوب: $EBFD$ متوازي أضلاع.



جبر: أوجد قيمتي y ، x في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع.



(27)




(26)


1-4

المستطيل (ص 43-38)

جبر: الشكل الرباعي $RSTW$ مستطيل، إذا كان $SW = (5x - 20)\text{in}$, $RZ = (2x + 5)\text{in}$ ، فأوجد x .



جبر: استعن بالمستطيل $EFGH$ أدناه.



(29) إذا كان $m\angle GEH = 57^\circ$, فأوجد $m\angle FEG$.

(30) إذا كان $m\angle FGE = 13^\circ$, فأجد $m\angle HGE$.


(31) إذا كان $FK = 32 \text{ ft}$, فأجد EG .

(32) أوجد $m\angle HEF + m\angle EFG$.

مثال 5

جبر: في المستطيل $ABCD$ أدناه، إذا كان

$m\angle ADB = (4x + 8)^\circ$, $m\angle DBA = (6x + 12)^\circ$.



بما أن $ABCD$ مستطيل، فإن $m\angle ABC = 90^\circ$. وبما أن الأضلاع المتقابلة في المستطيل متوازية، والزوايا المتبادلة داخلياً بالنسبة للقطرين متطابقة، فإن $\angle DBC \cong \angle ADB$ ، ومن تعريف التطابق .

$$m\angle DBC = m\angle ADB$$

سلمة جمع الزوايا

$$m\angle DBC + m\angle DBA = 90^\circ$$

بالتعويض

$$m\angle ADB + m\angle DBA = 90^\circ$$

بالتعويض

$$(4x + 8)^\circ + (6x + 12)^\circ = 90^\circ$$

$$10x^\circ + 20^\circ = 90^\circ$$

$$10x^\circ = 70^\circ$$

$$x = 7$$



دليل الدراسة والمراجعة

المعین والمربع (ص 44-51)

1-5

مثال 6

يتقاطع قطراً المعین $QRST$ عند النقطة P . استعمل المعطيات لإيجاد المطلوب في كل مما يأتي:

(a) جبر: إذا كان $QT = x + 7$, $TS = 2x - 9$, فأوجد قيمة x .

تعريف المعین

$$\overline{QT} \cong \overline{TS}$$

تعريف تطابق القطع المستقيمة

بالتعمیض

$$QT = TS$$

بالطرح

$$x + 7 = 2x - 9$$

بالقسمة

$$-x = -16$$

$$x = 16$$

(b) إذا كان $m\angle TSP = 76^\circ$, فأوجد $m\angle QTS$.

$$m\angle PTS = \frac{1}{2} m\angle QTS, \text{ فإن } \angle QTS, \text{ وبما أن قطرى المعین متعامدان,}$$

لذلك $m\angle PTS = \frac{1}{2} (76) = 38^\circ$
فإن $m\angle TPS = 90^\circ$

$$m\angle PTS + m\angle TPS + m\angle TSP = 180^\circ$$

قياسات زوايا المثلث

بالتعمیض

$$38^\circ + 90^\circ + m\angle TSP = 180^\circ$$

بالمجموع

$$128^\circ + m\angle TSP = 180^\circ$$

بالطرح

$$m\angle TSP = 52^\circ$$



جبر: في المعین $ABCD$, إذا كان $EB = 9$, $AB = 12$, $m\angle ABD = 55^\circ$, فأوجد كلاً مما يأتي:

$$AE \quad (33)$$

$$m\angle BDA \quad (34)$$

$$CE \quad (35)$$

$$m\angle ACB \quad (36)$$



(37) شعار: تتخذ شركة سيارات

الشكل المجاور علامة تجارية لها.

إذا كان شكل العلامة التجارية معيناً،

فما طول \overline{FJ} ؟

هندسة إحداثية: حدد ما إذا كان $\square QRST$ المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي معيناً أو مستطيلاً أو مربعاً. اكتب جميع التسميات التي تنطبق عليه. ووضح إجابتك.

$$Q(12, 0), R(6, -6), S(0, 0), T(6, 6) \quad (38)$$


$$Q(-2, 4), R(5, 6), S(12, 4), T(5, 2) \quad (39)$$

1-6

شبه المنحرف وشكل الطائرة الورقية (ص 52-60)

مثال 7

إذا كان $QRST$ شكل طائرة ورقية، فأوجد $m\angle S$.



نظريّة مجموع

$$m\angle Q + m\angle R + m\angle S + m\angle T = 360^\circ$$

قياسات الزوايا

الداخلية للمضلّع

بالتعمیض

$$m\angle S + 136^\circ + m\angle R + 68^\circ = 360^\circ$$

بالتبسيط

$$2m\angle S + 204^\circ = 360^\circ$$

$$2m\angle S = 156^\circ$$

$$m\angle S = 78^\circ$$





بالقسمة

أوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:

$$m\angle Z \quad (41)$$

$$GH \quad (40)$$



(42) تصميم: استعن بقطعة البلاط المرربع

الشكل المبينة جانباً في السؤالين الآتيين:

(a) صنف طريقة لتحديد ما إذا كانت

أشكال شبه المنحرف الظاهر في

البلاطة متطابقة الساقين؟


(b) إذا كان محيط البلاطة 48 in, ومحيط المربع الأحمر

16 in, فما محيط أحد أشكال شبه المنحرف؟


اختبار الفصل

إذا كان $CDFG$ على شكل طائرة ورقية، فأوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:

$$m\angle D \quad (13)$$




$$GF \quad (12)$$



جبر: استعن بالمعين $MNOP$ ، للإجابة عن الأسئلة الآتية:

$$m\angle MRN \quad (14)$$




$$\text{إذا كان } PR = 12, \text{ فأوجد } RN. \quad (15)$$

$$\text{إذا كان } m\angle PON = 124^\circ, \text{ فأوجد } m\angle POM. \quad (16)$$

فأوجد $m\angle POM$

(17) **إنشاءات:** تبني عائلة صالح ملحقاً للمنزل، وتركت فتحة لنافذة جديدة. فإذا قاس صالح الأضلاع المتقابلة فوجدها متطابقة. وقاس القطرين فوجدهما متطابقين، فهل يمكنه القول: إن فتحة النافذة تمثل مستطيلًا؟ وضح إجابتك.

استعمل $\square JKLM$ المبين جانباً لإيجاد كل مما يأتي:




$$m\angle JML \quad (18)$$

$$JK \quad (19)$$

$$m\angle KLM \quad (20)$$

جبر: استعن بالمستطيل $DEFG$ للإجابة عن الأسئلة الآتية:



$$\text{إذا كان } DF = 2(x + 5) - 7, \text{ فأوجد } EG. \quad (21)$$

$$\text{إذا كان } m\angle EDF = (5x - 3)^\circ, m\angle DFG = (3x + 7)^\circ, \text{ فأوجد } m\angle EDF. \quad (22)$$

$$\text{إذا كان } GF = 4(x - 3) + 6, \text{ فأوجد } DE. \quad (23)$$

حدّد ما إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع أم لا في كل مما يأتي. بّرر إجابتك.



(25)




(24)

أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية في كل من المضلعين المحددين الآتيين:


$$(1) \text{ السادس} \quad (2) \text{ ذو 16 ضلعًا}$$

(3) **فن:** تصنع جمانة إطاراً لتبطّس عليه قطعة قماش وترسم عليها بألوان زيتها. ثبّت جمانة أربع قطع من الخشب بعضها بعضًا واعتقدت أنها ستمثل مربعاً.

- a) كيف يمكنها التتحقق من أن الإطار مربع؟
b) إذا كانت أبعاد الإطار كما في الشكل، فأوجد القياسات المجهولة.



الشكل الرباعي $ABCD$ شبه منحرف متطابق الساقين.



$$(4) \text{ ما الزاوية التي تطابق } \angle C \text{؟}$$

$$(5) \text{ ما الضلع الذي يوازي } \overline{AB} \text{؟}$$

$$(6) \text{ ما القطعة المستقيمة التي تطابق } \overline{AC} \text{؟}$$

أوجد عدد أضلاع المضلع المتظم المعطى مجموع قياسات زواياه في كل مما يأتي:


$$1980^\circ \quad (8)$$

$$5400^\circ \quad (10)$$

$$900^\circ \quad (7)$$

$$2880^\circ \quad (9)$$

(11) **اختيار من متعدد:** إذا كان $QRST$ متوازي أضلاع، فما قيمة x ؟



الإعداد للاختبارات

تطبيق التعريفات والخصائص



يتطلب حل كثير من المسائل الهندسية في الاختبارات تطبيق التعريفات والخصائص. استعمل هذه الصفحة والتي تليها للتدريب على تطبيق التعريفات والخصائص عند حل أسئلة الهندسة ذات الإجابات المطلوبة.

استراتيجيات تطبيق التعريفات والخصائص

المخطوة 1

اقرأ نص السؤال بعناية.

- حدد المطلوب في المسألة.

- ادرس الأشكال المعطاة في المسألة.

- اسأل نفسك: ما خصائص هذا الشكل التي يمكنني تطبيقها لحل المسألة؟

المخطوة 2

حل المسألة.

- حدد التعريفات أو المفاهيم الهندسية التي يمكنك استعمالها لمساعدتك على إيجاد القيم المجهولة في المسألة.
- استعمل التعريفات وخصائص الأشكال لكتابة معادلة وحلها.

المخطوة 3

- تحقق من إجابتك.


مثال

اقرأ المسألة جيداً، وحدد المطلوب فيها. ثم استعمل المعطيات لحلها.

يصنع خالد إطاراً خشبياً على شكل ثمانى منتظم محيطه 288 cm.

a) ما طول كل لوح خشبي يشكل ضلعاً للإطار؟

b) ما الزاوية التي سُقط بها كل لوح عند طرفيه الخارجيين حتى تتلاءم الألواح بعضها مع بعض وتشكل الإطار؟ وضُحِّ إجابتك.



a) طول كل ضلع من أضلاع الإطار أو طول كل لوح خشبي.

المخطوة 1: اقرأ المسألة بعناية، علمت أن الألواح ستتشكل ثمانياً منتظمًا محيطه 288 cm. والمطلوب إيجاد طول كل لوح خشبي.

الخطوة 2: حل المسألة، لإيجاد طول كل لوح، اقسم المحيط على عدد الألواح.

$$288 \div 8 = 36$$

إذن طول كل لوح يجب أن يكون 36 cm.

الخطوة 3: تحقق من حلك بإيجاد محيط المضلع: محيط المضلع المنتظم = عدد الأضلاع × طول الضلع الواحد

$$8 \times 36 \text{ cm} = 288 \text{ cm} \checkmark$$

b) قياس الزاوية التي سقط بها كل لوح عند طرفه الخارجيين حتى تلامع الألواح وتشكل الإطار.

الخطوة 1: المطلوب إيجاد قياس الزاوية التي ستقطع بها الألواح عند أطرافها حتى يتلاع بعضها مع بعض تماماً.

الخطوة 2: حل المسألة، استعمل خاصية مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع المحدب لإيجاد قياس زاوية داخلية للثمني المنتظم. أوجد أولاً المجموع S لقياسات الزوايا الداخلية.

$$\begin{aligned} S &= (n - 2) \cdot 180^\circ \\ &= (8 - 2) \cdot 180^\circ \\ &= 1080^\circ \end{aligned}$$


إذن قياس الزاوية الداخلية للثمني المنتظم يساوي $1080^\circ \div 8 = 135^\circ$. وبما أنه سُيُّسْتَعْمَل لوحان لتشكيل كل رأس للإطار، فإن كل طرف للألوح سيُقطِّع بزاوية قياسها $135^\circ \div 2 = 67.5^\circ$.

الخطوة 3: تتحقق من حلك بالحل عكسياً أوجد عدد أضلاع المضلع المنتظم (n) الذي قياس زاويته الداخلية 135° .

$$\begin{aligned} 135^\circ &= \frac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n} \\ 135^\circ n &= 180^\circ n - 360^\circ \\ -45^\circ n &= -360^\circ \\ n &= 8 \checkmark \end{aligned}$$

تمارين ومسائل

3) استعن بالتمثيل البياني أدناه في كل من السؤالين الآتيين:



a) هل ينصف قطر الشكل الرباعي $RSTU$ كل منهما الآخر؟


استعمل صيغة المسافة بين نقطتين لتحقق من إجابتك.

b) ما نوع الشكل الرباعي $RSTU$ ؟ ووضح إجابتك باستعمال


خصائص هذا النوع من الأشكال الرباعية أو تعريفه.

اقرأ كل مسألة مما يأتي، وحدد المطلوب . ثم استعمل المعطيات لحلها، وبين خطوات حلك:

(1) قطعة متوسطة لشبه المترافق $MNOP$. ما طول \overline{RS} ؟




(2) إذا كان $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ، فأوجد قيمة x .



اختبار تراكمي

أسئلة الاختيار من متعدد

4) ما قياس كل زاوية داخلية في الخُماسي المتظم؟



120° C


135° D

96° A

108° B

اقرأ كل سؤال مما يأتي، ثم اكتب رمز الإجابة الصحيحة.

1) إذا كان $a \parallel b$ ، فأي العبارات الآتية ليست صحيحة؟




$\angle 2 \cong \angle 5$ C

$\angle 8 \cong \angle 2$ D

$\angle 1 \cong \angle 3$ A

$\angle 4 \cong \angle 7$ B

2) صنف المثلث أدناه تبعاً لقياسات زواياه. اختر المصطلح الأنسب.




C منفرج الزاوية

A حاد الزاوية

D قائم الزاوية

B متطابق الزوايا

6) ما قيمة x في الشكل أدناه؟




14 C

15 D

10 A

12 B

3) أوجد قيمة x في متوازي الأضلاع RSTU.



25 C

30 D

12 A

18 B

7) قطران للمستطيل DATE يتقاطعان في S . إذا كان $AE = 40$ ، $ST = x + 5$ ، فما قيمة x ؟

15 C

10 D

35 A

25 B

إرشادات للاختبار


السؤال 3: استعمل خصائص متوازي الأضلاع لحل المسألة.
كل زاويتين متقابلتين متطابقتان.




أسئلة ذات إجابات قصيرة

اكتب إجابتك في ورقة الإجابة.

- (8) تشکل أعمدة خيمة رؤوس سداسي متظم، ما قياس الزاوية المتكونة عند أيّ من أركان الخيمة؟





- (9) ما إحداثيات الرأس الرابع لشبه المنحرف المتطابق الساقين LMNJ؟ بين خطوات الحل.



أسئلة ذات إجابات مطولة

اكتب إجابتك في ورقة الإجابة مبيناً خطوات الحل.

- (14) هل يمكنك إثبات أن كل شكل مما يأتي متوازي أضلاع؟ إذا لم تستطع ذلك، فاذكر المعطيات الإضافية التي ستحتاج إليها لإثبات أنه متوازي أضلاع. ووضح تبريرك.



- (10) ماذا نسمي متوازي الأضلاع إذا كان قطره متعامدين؟
وضح إجابتك.

- (11) حدد ما إذا كانت النتيجة صحيحة أم لا فيما يأتي اعتماداً على المعطيات. فسر تبريرك.

المعطيات: إذا كان العدد يقبل القسمة على 9، فإنّه يقبل القسمة على 3.

العدد 144 يقبل القسمة على 9.

النتيجة: العدد 144 يقبل القسمة على 3.

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟

إذا لم تستطع الإجابة عن السؤال..

فعد إلى الدرس..

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1-3	مهارة سابقة	1-6	مهارة سابقة	1-5	1-6	1-1	1-4	مهارة سابقة	1-5	1-1	1-2	مهارة سابقة	مهارة سابقة	

التشابه

Similarity

2

فيما سبق:

درستُ النسبة والتناسب وتطبيقاتهما الحياتية.

والآن:

- أتعرف على المضلعات المتشابهة، وأستعمل النسبة والتناسب لحل المسائل.

لماذا؟

تصميم: يتم تصميم بعض المجسمات والمباني لتشابه أشياء مشهورة بحيث يكون هناك تناسب بين الأطوال في تلك المجسمات ونظيراتها في الشكل الأصلي.



الخطوات منظم أفكار

التشابه، اعمل هذه المطوية؛ لتساعدك على تنظيم ملاحظاتك حول الفصل 2، مبتدئاً بثلاث أوراق من دفتر الملاحظات.


٤ اكتب عنوان الفصل على الصفحة الأولى، وأرقام الدروس على الأشرطة، وخصص الصفحة الأخيرة للمفردات الجديدة.




٣ قصّ الجانب الأيسر لكل ورقة؛ لعمل شرائط فهرسة، ثم ثبت الحافة اليمنى؛ بحيث تشكل الأوراق دفترًا.



٢ قصّ الأوراق على طول خط الطي.



١ اطوي كلاً من الأوراق الثلاث من المنتصف.





التهيئة للفصل 2

تشخيص الاستعداد :

أجب عن الاختبار الآتي. انظر المراجعة السريعة قبل الإجابة عن الاختبار.

مراجعة سريعة

اختبار سريع

مثال 1

$$\text{حل المعادلة: } \frac{4x-3}{5} = \frac{2x+11}{3}$$

$$\text{المعادلة الأصلية: } \frac{4x-3}{5} = \frac{2x+11}{3}$$

$$3(4x-3) = 5(2x+11) \quad \text{خاصية الضرب التبادلي}$$

$$12x - 9 = 10x + 55 \quad \text{خاصية التوزيع}$$


$$2x = 64 \quad \text{خاصية الجمع والطرح للمساواة}$$

$$x = 32 \quad \text{خاصية القسمة للمساواة}$$

مثال 2

في الشكل أدناه، \overrightarrow{QP} ، \overrightarrow{QR} نصفا مستقيم متعاكسان، و \overrightarrow{QT} ينصف $\angle SQR$ ، إذا كان: $m\angle SQR = (6x + 8)^\circ$

$$m\angle SQT = m\angle TQR \quad \text{فأوجد } m\angle TQR = (4x - 14)^\circ$$



بما أن \overrightarrow{QT} ينصف $\angle SQR$ ، فإن:

$$m\angle SQR = 2(m\angle TQR) \quad \text{تعريف منصف الزاوية}$$

$$6x + 8 = 2(4x - 14) \quad \text{بالتعويض}$$

$$6x + 8 = 8x - 28 \quad \text{خاصية التوزيع}$$

$$-2x = -36 \quad \text{خاصية الطرح للمساواة}$$

$$x = 18 \quad \text{خاصية القسمة للمساواة}$$

وبما أن \overrightarrow{QT} ينصف $\angle SQR$ ، فإن:

$$m\angle SQT = m\angle TQR \quad \text{تعريف منصف الزاوية}$$

$$m\angle SQT = 4x - 14 \quad \text{بالتعويض}$$

$$m\angle SQT = 58^\circ \quad \text{بالتعويض عن } x=18 = \text{والتبسيط}$$



حل كلاً من المعادلات الآتية:

$$\frac{7}{3} = \frac{x-4}{6} \quad (2)$$


$$\frac{3}{2x} = \frac{3x}{8} \quad (4)$$

$$\frac{3x}{8} = \frac{6}{x} \quad (1)$$

$$\frac{x+9}{2} = \frac{3x-1}{8} \quad (3)$$

- 5) تعليم:** نسبة عدد الطلاب إلى عدد المعلمين في مدرسة هي 17 إلى 1. إذا كان عدد طلاب المدرسة 1088 طالبًا، فما عدد المعلمين؟


جبر: في الشكل أدناه، \overrightarrow{BA} ، \overrightarrow{BC} نصفا مستقيم متعاكسان، \overrightarrow{BD} ينصف $\angle ABF$. (مهارة سابقة)



- 6)** إذا كان: $m\angle ABF = (3x - 8)^\circ$ ، $m\angle ABD = (x + 14)^\circ$. $m\angle ABD$ فأوجد

- 7)** إذا كان: $m\angle FBC = (2x + 25)^\circ$ ، $m\angle ABF = (10x - 1)^\circ$. $m\angle DBF$ فأوجد

- 8) حدائق:** يخطط مهندس لإضافة ممرات تصل إلى نافورة كما هو مبين أدناه، إذا كان \overrightarrow{BA} ، \overrightarrow{BC} نصفي مستقيم متعاكسان و \overrightarrow{BD} ينصف $\angle ABF$ ، فأوجد $m\angle FBC$



المضلعات المتشابهة

Similar Polygons



رابط المدرس الرقمي

www.iен.edu.sa

**لماذا؟**

يزين بعض الأشخاص شاشات حواسيبهم باستعمال صور شخصية لهم، وذلك بوضع صورة بحجمها الأصلي في وسط الشاشة، أو بتكبيرها لتملا الشاشة، إلا أن الطريقة الثانية تُظهر الصورة مشوّهةً؛ لأن الصورة الأصلية والصورة الجديدة لا تكونان متشابهتين هندسياً.

تحديد المضلعات المتشابهة: المضلعات المتشابهة لها الشكل نفسه، ولكن ليس بالضرورة أن يكون لها القياسات نفسها.

فيما سبق:

درست استعمال التنااسب لحل المسائل.

(مهارة سابقة)

والآن:

استعمل التنااسب لتحديد المضلعات المتشابهة.

أحل مسائل باستعمال خصائص المضلعات المتشابهة.

المفردات:

المضلعات المتشابهة

similar polygons

معامل التشابه

scale factor

نسبة التشابه

similarity ratio

أضف إلى
مطويتك

المضلعات المتشابهة**مفهوم أساسى**

يت SHAPE ة مضلعان إذا وفقط إذا كانت زواياهما المتناظرة متطابقة، وأطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة.


مثال: في الشكل أدناه، $ABCD \sim WXYZ$ يشبه $WXYZ$.

الزوايا المتطابقة:

$$\angle A \cong \angle W, \angle B \cong \angle X, \angle C \cong \angle Y, \angle D \cong \angle Z$$

التناسب:

$$\frac{AB}{WX} = \frac{BC}{XY} = \frac{CD}{YZ} = \frac{DA}{ZW} = \frac{3}{1}$$




الرموز: $ABCD \sim WXYZ$

وكما هو الحال في عبارة التطابق، فإن ترتيب الرؤوس في عبارة التشابه مثل $ABCD \sim WXYZ$ مهم جدًا؛ لأنَّه يحدد الزوايا المتناظرة والأضلاع المتناظرة.

استعمال عبارة التشابه**مثال 1**


إذا كان $\triangle FGH \sim \triangle JKL$ ، فاكتب جميع أزواج الزوايا المتطابقة، واكتب تناسبًا يربط بين الأضلاع المتناظرة.

استعمل عبارة التشابه.




الزوايا المتطابقة: $\angle F \cong \angle J, \angle G \cong \angle K, \angle H \cong \angle L$

التناسب: $\frac{FG}{JK} = \frac{GH}{KL} = \frac{HF}{LJ}$


**قراءة الرياضيات**

الرمز \sim و \cong :
يُقرأ الرمز \sim يشبه،
ويُقرأ الرمز \cong لا يشبه،
أو ليس مشابهًا.



١) إذا كان $NPQR \sim UVST$ ، فاكتب جميع أزواج الزوايا المتطابقة، واكتب تناسبًا يربط بين الأضلاع المتناظرة.

تحقق من فهمي



النسبة بين طولي ضلعين متناظرين لمضلعين متشابهين تُسمى **معامل التشابه** أو (عامل المقياس). ويعتمد معامل التشابه على ترتيب المقارنة.

ففي الشكل المجاور $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$


ومعامل تشابه $\triangle ABC$ إلى $\triangle XYZ$ يساوي $\frac{6}{3}$ أو 2

بينما معامل تشابه $\triangle XYZ$ إلى $\triangle ABC$ يساوي $\frac{3}{6}$ أو $\frac{1}{2}$



معامل التشابه بين مضلعين متشابهين يسمى **نسبة التشابه** أحياناً

تحديد المضلعات المتشابهة

مثال 2 من واقع الحياة



صور: يريد كمال أن يستعمل الصورة المستقطبة الشكل المجاور خلفية لشاشة الحاسوب، ولكنه يحتاج لتغيير أبعادها، حدد ما إذا كانت كل من الصورتين المستطيلتين الآتتين مشابهة لها أم لا؟ وإذا كانت كذلك، فاكتب عباره التشابه ومعامل التشابه. وضح إجابتك.



a) الخطوة 1: قارن الزوايا المتناظرة.

بما أن جميع زوايا المستطيل قوائم، والزوايا القوائم متطابقة، فإن الزوايا المتناظرة متطابقة.

الخطوة 2: قارن النسب بين أطوال الأضلاع المتناظرة.

$$\frac{BC}{FG} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} \quad \frac{DC}{HG} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}$$

وحيث إن $\frac{2}{3} \neq \frac{5}{7}$ ، فإن الأضلاع المتناظرة غير متناسبة، وعليه فإن $\triangle ABCD \sim \triangle EFGH$

إذن فالصورتان غير متشابهتين.


b) الخطوة 1: بما أن $ABCD$ ، $JKLM$ مستطيلان، فإن الزوايا المتناظرة متطابقة.

الخطوة 2: قارن النسب بين أطوال الأضلاع المتناظرة.

$$\frac{BC}{KL} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} \quad \frac{DC}{ML} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$$

وحيث إن $\frac{2}{3} = \frac{2}{3}$ ، فإن الأضلاع المتناظرة متناسبة، وعليه فإن $\triangle ABCD \sim \triangle JKLM$ ؛ إذن

فالصورتان متشابهتان ومعامل تشابه $\triangle ABCD$ إلى $\triangle JKLM$ يساوي $\frac{2}{3}$.



تحقق من فهمك

2) حدد ما إذا كان المثلثان متشابهين أم لا؟ وإذا كانا كذلك، فاكتب عباره التشابه ومعامل التشابه، ووضح إجابتك.

إرشادات للدراسة

تناسب المستطيلات:
لاختبار تناسب أضلاع مستطيلين، يكفي اختبار تناسب ضلعين متناظرين من المستطيل الأول مع الصاعدين المتناظرين لهما في المستطيل الثاني؛ لأن المستطيل فيه كل ضلعين متقابلين متطابقان.

إرشادات للدراسة

التحقق من صحة الحل:
للحصول على معامل التشابه، أوجد النسبة بين طولي ضلعين متناظرين آخرين.


التشابه والتطابق:

إذا كان المضلعان متطابقين فإنهما متشابهان أيضاً. وتكون جميع الزوايا المتناظرة متطابقة، وأطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة، والنسبة بين طول كل ضلعين متناظرين هي 1:1.

استعمال الأشكال المتشابهة : يمكنك استعمال معاملات التشابه والتناسبات، لحل مسائل تتضمن أشكالاً متشابهة.

مثال 3

استعمال الأشكال المتشابهة لإيجاد القيم المجهولة



في الشكل المجاور، $ACDF \sim VWYZ$

(a) أوجد قيمة x .

استعمل أطوال الأضلاع المتناظرة لكتابة تناوب

$$\text{الأضلاع المتناظرة متناسبة} \quad \frac{CD}{WY} = \frac{DF}{YZ}$$


$$CD = 9, WY = 6, DF = x, YZ = 10 \quad \frac{9}{6} = \frac{x}{10}$$

خاصية الضرب التبادلي

بالضرب

بقسمة كلا الطرفين على 6

(b) أوجد قيمة y .



$$\text{الأضلاع المتناظرة متناسبة} \quad \frac{CD}{WY} = \frac{FA}{ZV}$$

$$CD = 9, WY = 6, FA = 12, ZV = 3y - 1 \quad \frac{9}{6} = \frac{12}{3y - 1}$$

خاصية الضرب التبادلي

بالضرب

بإضافة 9 لكلا الطرفين


بقسمة كلا الطرفين على 27

تحقق من فهمك

إذا كان $\triangle QST \sim \triangle JLM$ ، فأوجد قيمة المتغير في كلٌ مما يأتي:

x (3A)

y (3B)



النسبة بين أيّ طولين متناظرين في المضلعين المتشابهين تساوي معامل التشابه بينهما. ويؤدي هذا إلى النظرية الآتية حول محيطي المضلعين المتشابهين.

نظريّة 2.1

محيط المضلعين المتشابهين


إذا تشابه مضلعين، فإنّ النسبة بين محطييهما تساوي معامل التشابه بينهما.

مثال: إذا كان $ABCD \sim JKLM$ ، فإن:

$$\frac{AB}{JK} = \frac{BC}{KL} = \frac{CD}{LM} = \frac{DA}{MJ} = \frac{AB + BC + CD + DA}{JK + KL + LM + MJ}$$

أضف إلى

مطوية



تحديد المثلثات المتشابهة:

عندما تُعطى زوجين من الزوايا المتناظرة المتطابقة في مثلثين، تذكر أنه يمكنك استعمال نظرية الزاوية الثالثة؛ لإثبات أن الزاويتين المتناظرتين المحيطيتين متطابقتان أيضاً.


تنبيه !

المحيط:

تذكر أن المحيط هو المسافة حول الشكل، وعندما تُريد إيجاد محيط مضلع، احرص على أن تجد مجموع أطوال جميع أضلاعه، وقد تستعمل قوانين هندسية: لإيجاد أطوال الأضلاع غير المعطاة.

مثال 4

استعمال معامل التشابه لإيجاد المحيط



إذا كان $ABCDE \sim PQRST$ ، فأوجد معامل تشابه $ABCDE$ إلى $PQRST$ ومحيط كل مضلع.

معامل تشابه $ABCDE$ إلى $PQRST$ يساوي $\frac{CD}{RS}$ أي $\frac{4}{3}$.

وبما أن: $\overline{BC} \cong \overline{AB}$, $\overline{AE} \cong \overline{CD}$

فإن محيط $ABCDE$ يساوي $4 + 8 + 6 + 4 + 6 = 30$.

استعمل محيط $ABCDE$ ، ومعامل التشابه لكتابة تناوب.

افتراض أن محيط $PQRST$ يساوي x .


$$\text{النظرية 2.1} \quad \frac{4}{3} = \frac{\text{محيط } ABCDE}{\text{محيط } PQRST}$$

$$\frac{4}{3} = \frac{30}{x}$$


$$(3)(30) = 4x$$

$$\text{قسمة كلا الطرفين على 4} \quad 22.5 = x$$

إذن محيط $PQRST$ يساوي 22.5.



تحقق من فهمك




4) إذا كان $MNPQ \sim XYZW$ ، فأوجد معامل تشابه $MNPQ$ إلى $XYZW$ ، ومحيط كل مضلع.


تأكد

اكتب جميع الزوايا المتطابقة، واكتب تناوباً يربط بين الأضلاع المتناظرة في كلٌ مما يأتي:



$$JKLM \sim TSRQ \quad (2)$$



$$\triangle ABC \sim \triangle ZYX \quad (1)$$




حدّد ما إذا كان المضلعان في كلٌ من السؤالين الآتيين متشابهين أم لا، وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه ومعامل التشابه، وضح إجابتك.




المثال 1

المثال 3


في كلٌّ ممَّا يأتي، إذا كان المضلعان متباينين، فأوجد قيمة x .



(6)

**المثال 4**



7 تصميم: في مخطط الشقة المجاور، عرض الشرفة 1 in وطولها 1.75 in. إذا كان طول الشرفة الحقيقي 15 ft، فما محيطها؟

**تدريب وحل المسائل****المثال 1**



اكتُب جميع الزوايا المتطابقة، ثم اكتب تناصيًّا يربط الأضلاع المتناظرة للمضلعين في كلٌّ ممَّا يأتي:

$$\triangle DFG \sim \triangle KJM \quad (9)$$


$$ABDF \sim VXZT \quad (8)$$




حدّد ما إذا كان المضلعان في كلٌّ ممَّا يأتي متباينين أم لا، وإذا كانوا كذلك، فاكتُب عبارة التشابه ومعامل التشابه، وإلا فوضح السبب.

المثال 2


(11)




(10)



في كلٍّ ممَّا يأتي، إذا كان المضلعان متباينين، فأوجد قيمة x .

المثال 3

(13)



(12)



14 طول المستطيل $ABCD$ يساوي 20 m، وعرضه 8 m. وطول المستطيل $QRST$ المشابه له يساوي 40 m. أوجد معامل تشابه المستطيل $ABCD$ إلى المستطيل $QRST$ ، ومحيط كلِّ منهما.

المثال 4

أوجد محيط المثلث المحدّد في كلٌ مما يأتي:

$$\triangle CBH \sim \triangle FEH, \text{ إذا كان } \triangle CBH \quad (16)$$

$$\triangle ABC \sim \triangle DEF, \text{ إذا كان } \triangle DEF \quad (15)$$



(17) إذا كان معامل التشابه بين مستطيلين متباينين 2:1، ومحيط المستطيل الكبير 80 m، فأوجد محيط المستطيل الصغير.

(18) إذا كان معامل التشابه بين مربعين متباينين 2:3، ومحيط المربع الصغير 50 ft، فأوجد محيط المربع الكبير.

مُثلثات متتشابهة: في الشكل المجاور، المثلثات: AHB, AGC, AFD :

متتشابهة وفيها: $\angle AHB \cong \angle AGC \cong \angle AFD$.


أوجد الأضلاع التي تناظر الضلع المعطى أو الزوايا التي تتطابق الزاوية المعطاة في كلٌ من الأسئلة الآتية.

$$\overline{AB} \quad (19)$$

$$\overline{FD} \quad (20)$$

$$\angle ACB \quad (21)$$



$$\angle A \quad (22)$$



أوجد قيمة كل متغير فيما يأتي:

$$\triangle JKL \sim \triangle WYZ \quad (24)$$

$$ABCD \sim QSRP \quad (23)$$



الربط مع الحياة

عرض الشرائج: إذا كانت أبعاد صورة على شريحة 13 in في $9\frac{1}{4}$ in، ومعامل تشابه صور الشريحة إلى الصور المعروضة بواسطة جهاز العرض 4:1؛ فما أبعاد الصورة المعروضة؟

يرى بعض التربويين أن نسبة 75% إلى 90% من معارف الشخص يتم الحصول عليها عن طريق الوسائل البصرية، ومن هنا جاءت أهمية استعمال جهاز عرض الشرائج في العملية التعليمية.

هندسة إحداثية: حدد ما إذا كان المستطيلان $ABCD$ ، $WXYZ$ المعطاة إحداثيات رؤوسهما في السؤالين الآتيين متباينين أم لا؟ وإذا كان كذلك، فاكتب عبارة التشابه ومعامل التشابه؛ ووضح إجابتك.

$$A(-1, 5), B(7, 5), C(7, -1), D(-1, -1); W(-2, 10), X(14, 10), Y(14, -2), Z(-2, -2) \quad (26)$$



$$A(5, 5), B(0, 0), C(5, -5), D(10, 0); W(1, 6), X(-3, 2), Y(2, -3), Z(6, 1) \quad (27)$$

حدّد ما إذا كان المثلثان في كلٍّ مما يأتي متشابهين دائمًا أو أحياناً أو غير متشابهين أبداً، وضح إجابتك.

(29) شبه منحرف ومتوازي أضلاع


(31) مثلثان متطابقاً الضلعين

(28) مثلثان منفرجاً الزاوية

(30) مثلثان قائم الزاوية

(32) مثلث مختلف الأضلاع، ومثلث متطابق الضلعين


(33) مثلثان متطابقاً للأضلاع



(34) **برهان:** اكتب برهاناً حراً للنظرية 2.1 (في حالة المثلثات)

$$\Delta ABC \sim \Delta DEF, \frac{AB}{DE} = \frac{m}{n}$$

$$\text{المطلوب: إثبات أن: } \frac{\text{محيط } \triangle ABC}{\text{محيط } \triangle DEF} = \frac{m}{n}$$



(35) **تغيير الأبعاد:** في الشكل المجاور، $\triangle FGH \sim \triangle XYZ$

a) بين أن النسبة بين محيطي المثلثين هي النسبة نفسها بين أضلاعهما المتناظرة.

b) إذا أضيف لطول كل ضلع 6 وحدات، فهل المثلثان الجديدان متشابهان؟


(36) **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة ستكتشف تشابه المربعات.

a) **هندسيًا:** ارسم ثلاثة مربعات مختلفة الأبعاد، وسُمِّها $ABCD, PQRS, WXYZ$ ، وقس طول ضلع كل مربع وسجل الأطوال على المربعات.

b) **جدولياً:** احسب النسب بين أطوال الأضلاع المتناظرة لكل زوج مربعات فيما يأتي ودونها في جدول: $ABCD, PQRS; PQRS, WXYZ; WXYZ, ABCD$. هل كل مربعين من المربعات متشابهان؟

c) **لخطياً:** ضع تخميناً حول تشابه جميع المربعات.


مسائل مهارات التفكير العليا



(37) **تحد:** في الشكل المجاور، ما قيمة (قييم) x التي تجعل $BEFA \sim EDCB$ ؟

(38) **إجابة مفتوحة:** أوجد مثلاً مضاداً للعبارة الآتية: "جميع المستطيلات متشابهة"

(39) **برهان:** إذا كان المستطيل $BCEG$ فيه: $LJAW = 2:3$ ، وكان المستطيل $BC:CE = 2:3$ ، فثبت أن: $BCEG \sim LJAW$



(40) **تبير:** يمكن دمج مثلثين متساويي الأضلاع متطابقين؛ لتكونين شكل رباعي كما في الشكل المجاور. إذا كُوِّنت شكلاً رباعياً آخر من ممثلتين متساويي الأضلاع متطابقين آخرين، فأيُّ العبارات التالية صحيحة حول الشكل المجاور، والشكل الذي كُوِّنته: يجب أن يكونا متشابهين، المجاور قد يكونا متشابهين، أو غير متشابهين. فسر إجابتك.

(41) **تبير:** ارسم مضلعين خماسيين منتظمين أطوال أضلاعهما مختلفة. هل المضلعين متشابهان؟ وهل كل مضلعين منتظمين ومتساوين في عدد الأضلاع متشابهان؟ وضح إجابتك.

(42) **أكتب:** بين أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين المضلعين المتطابقة والمضلعين المتشابه.

تدريب على اختبار

(44) مستطيلان متشابهان. إذا كان معامل التشابه بينهما 5:3، ومحيط المستطيل الكبير 65 m، فيما محيط المستطيل الصغير؟

49 m **C**

59 m **D**

29 m **A**

39 m **B**

(43) إذا كان: $PQRS \cong JKLM$ ومعامل تشابه $PQRS$ إلى $JKLM$ يساوي 4:3 ، وكان $QR = 8 \text{ cm}$ فما طول $?KL$ ؟

8 cm **C**

6 cm **D**

24 cm **A**

$10\frac{2}{3} \text{ cm}$ **B**

مراجعة تراكمية

حل كل تناوب مما يأتي: (مهارة سابقة)

$$\frac{2x+3}{x-1} = \frac{-4}{5} \quad (47)$$

$$\frac{2}{4y+5} = \frac{-4}{y} \quad (46)$$

$$\frac{c-2}{c+3} = \frac{5}{4} \quad (45)$$

(48) هندسة إحداثية أوجد إحداثيات نقطة تقاطع قطرى $\square JKLM$ الذي رؤوسه: $J(2, 5), K(6, 6), L(4, 0), M(0, -1)$. (الدرس 2-2)

اكتب الفرض الذي تبدأ به برهاناً غير مباشرٍ لكل عبارةٍ مما يأتي: (مهارة سابقة)

$$\overline{PQ} \cong \overline{ST} \quad (50)$$

إذا كان $12 > 3x$ ، فإن $x > 4$.


(51) منصف زاوية الرأس لمثلث متطابق الضلعين هو ارتفاع للمثلث أيضاً.

في الشكل المجاور، أوجد قياس كُلّ من الزوايا الآتية. (مهارة سابقة)

$$m\angle 1 \quad (52)$$



$$m\angle 2 \quad (53)$$

$$m\angle 3 \quad (54)$$



استعد للدرس اللاحق

جبر أوجد قيمة x وطول كل ضلع في كُلّ من المثلثين الآتيين: (مهارة سابقة)



المثلثات المتشابهة

Similar Triangles

رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

لماذا؟

أراد خالد أن يرسم نسخة مشابهة لشعار نادي التزلج المجاور على ملصق كبير، فبدأ أولاً برسم قطعة مستقيمة أسفل الملصق، ثم استعمل نسخة من المثلث الأصلي لينسخ زاويتي القاعدة، ثم مد الضلعين غير المشتركين للزاوיתين.

فيما سبق:

درستُ استعمال المثلثين
AAS, SAS والنظرية
لإثبات تطابق مثلثين.



(مهارة سابقة)

والآن:

أحد المثلثات


المتشابهة باستعمال
ملعمة التشابه AA
ونظرية التشابه
. SSS, SAS

استعمال المثلثات
المتشابهة لحل
المسائل.



تحديد المثلثات المتشابهة: في الفصل الثالث تعلمت اختبارات تحديد ما إذا كان مثلثان متطابقين أم لا، ولتشابه المثلثات اختبارات أيضاً. والرسم السابق يبيّن أنه إذا طبقت زاویتان في مثلث زاویتين في مثلث آخر، فإن المثلثين متشابهان.

أضف إلى
مطويتك



التشابه بزواویتين (AA)

إذا طبقت زاویتان في مثلث زاویتين في مثلث آخر،
فإن المثلثين متشابهان.



مثال: في المثلثين $\triangle ABC$, $\triangle FGH$ ، إذا كانت: $\angle A \cong \angle F$, $\angle B \cong \angle G$.
فإن: $\triangle ABC \sim \triangle FGH$

ملعمة 2.1

مثال 1

استعمال ملعمة التشابه AA



حدد في كل مما يأتي ما إذا كان المثلثان متشابهين أم لا؟ وإذا كان كذلك، فاكتب عبارة التشابه.
ووضح إجابتك.



(a) بما أن: $m\angle M = m\angle L$ ، إذن: $\angle M \cong \angle L$. ومن نظرية مجموع قياسات زوايا المثلث يكون:
 $m\angle K = 75^\circ$ ، إذن $57^\circ + 48^\circ + m\angle K = 180^\circ$. وبما أن $m\angle P = 75^\circ$ ، فإن $\angle K \cong \angle P$ ، إذن $\triangle LJK \sim \triangle MQP$ وفق الملعمة AA.

(b) وفق نظرية الزواویتين المتقابلین بالرأس. ولأن $\overline{RX} \parallel \overline{TW}$ ، فإن $\angle R \cong \angle W$ وفق
نظرية الزواویتين المتبادلین داخليًّا؛ إذن $\triangle RSX \sim \triangle WST$ وفق الملعمة AA.

تحقق من فهمك: حدد في كل مما يأتي ما إذا كان المثلثان متشابهين أم لا؟ وإذا كان كذلك ، فاكتب عبارة
التشابه ووضح إجابتك.




رسم الأشكال:

قد تساعدك إعادة رسم المثلثين المتشابهين، بحيث تظهر الأضلاع المتناظرة في الاتجاه نفسه.

نظريتان


أضف إلى
مطويتك



2.2 التشابه بثلاثة أضلاع (SSS)

إذا كانت أطوال الأضلاع المتناظرة لمثلثين متناسبة، فإن المثلثين متشابهان.

مثال: إذا كان: $\frac{JK}{MP} = \frac{KL}{PQ} = \frac{LJ}{QM}$ ، فإن $\triangle JKL \sim \triangle MPQ$.



2.3 التشابه بضلعين وزاوية محصورة (SAS)

إذا كان طولاً ضلعين في مثلث ما متناسبين مع طولى الضلعين المتناظرين لهما في مثلث آخر وكانت الزاويتان المحصورتان بينهما متطابقتين، فإن المثلثين متشابهان.

مثال: إذا كان $\frac{RS}{XY} = \frac{ST}{YZ}$ ، $\angle S \cong \angle Y$ ، فإن $\triangle RST \sim \triangle XYZ$.



ستبرهن النظرية 2.3 في السؤال 17

برهان النظرية 2.2

اكتب برهاناً حرّاً للنظرية 2.2

$$\frac{AB}{FG} = \frac{BC}{GH} = \frac{AC}{FH} \quad \text{المعطيات:}$$

$\triangle ABC \sim \triangle FGH \quad \text{المطلوب:}$



البرهان:

عَيْنَ النَّقْتَةِ J عَلَى \overline{FG} ، بِحِيثُ يَكُون $JG = AB$.
أَرْسِمْ $\overline{JK} \parallel \overline{FH}$ ، بِحِيثُ يَكُون $\overline{JK} \parallel \overline{FH}$.
سَمِّ $\angle GJK$ بِالرَّمْزِ 1 .

بِمَا أَنَّ $\angle G \cong \angle G$ وَفقَ خَاصِيَّةِ الاعْكَاسِ ،
وَمَا أَنَّ $\angle 1 \cong \angle F$ وَفقَ مَسْلِمَةِ الزَّاوِيَّتَيْنِ المُتَنَاظِرَتَيْنِ ،
فَإِنَّ $\triangle GJK \sim \triangle GFH$ وَفقَ مَسْلِمَةِ التَّشَابِهِ AA .

وَمِنْ تَعْرِيفِ الْمُضْلِعَاتِ المُتَشَابِهَاتِ يَكُونُ: $\frac{JG}{FG} = \frac{GK}{GH} = \frac{JK}{FH}$

وَبِالتعويض يَتَجَزَّ أَنْ: $\frac{AB}{FG} = \frac{GK}{GH} = \frac{JK}{FH}$

وَبِمَا أَنَّ: $\frac{GK}{GH} = \frac{BC}{GH}$ ، $\frac{JK}{FH} = \frac{AC}{FH}$ ، إِذْنَ يَمْكُنُنَا اسْتِنْدَاحُ أَنَّ: $\frac{AB}{FG} = \frac{BC}{GH} = \frac{AC}{FH}$ ، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ: $\overline{GK} \cong \overline{BC}$ ، $\overline{JK} \cong \overline{AC}$ ، لِذَلِكَ $GK = BC$ ، $JK = AC$

وَمِنْ مَسْلِمَةِ التَّطَابِقِ SSS ، يَكُونُ $\triangle ABC \cong \triangle JGK$.

وَلِأَنَّ العَناصِيرِ المُتَنَاظِرَةِ فِي الْمُتَلَاثَيْنِ المُتَطَابِقَيْنِ تَكُونُ مُتَطَابِقَةٌ فَإِنَّ: $\angle 1 \cong \angle A$ ، $\angle G \cong \angle B$ ، $\angle K \cong \angle C$ ، وَبِمَا أَنَّ: $\angle 1 \cong \angle F$ ، إِذْنَ $\angle A \cong \angle F$ وَفقَ خَاصِيَّةِ التَّعْدِيِّ ، إِذْنَ وَمِنْ مَسْلِمَةِ التَّشَابِهِ AA ، يَكُونُ $\triangle ABC \sim \triangle FGH$.

الأضلاع المتناظرة:
لتحديد الأضلاع المتناظرة لمثلثين، ابدأ بمقارنة أطول ضلعين ثم الضلعين التاليين لهما طولاً وأخيراً أقصر ضلعين.

مثال 2 استعمال نظريّي التشابه SSS, SAS

حدّد في كلٍّ مما يأتي ما إذا كان المثلثان متشابهين أم لا، وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه، ووضح إجابتك.

$$\frac{PR}{SR} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}, \frac{PQ}{ST} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$




$$\frac{QR}{TR} = \frac{5}{12.5} = \frac{50}{125} = \frac{2}{5}$$

إذن $\triangle PQR \sim \triangle STR$ وفق نظرية التشابه SSS.

. من خاصية الانعكاس $\angle A \cong \angle A$.

$$\frac{AF}{AB} = \frac{10}{10+5} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}, \frac{AE}{AC} = \frac{8}{8+4} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

بما أن طولي الضلعين اللذين يحصران $\angle A$ في $\triangle AEF$ متناسبان مع طولي الضلعين المناظرين لهما في $\triangle ACB$ ، إذن $\triangle AEF \sim \triangle ACB$ وفق نظرية التشابه SAS.

**تحقق من فهمك**

(2B)

J L K


Q M P

(2A)

يمكنك أن تُتَّمرِّر أي الشروط كافية لإثبات تشابه مثلثين.

مثال 3 من اختبار

المثلثان MNQ , MOP في الشكل المجاور متشابهان، ما قيمة x ؟



5 C
4 D

12 A
10 B

اقرأ سؤال الاختبار

في هذا السؤال تعلم، أن $\triangle MNQ \sim \triangle MOP$ ، ومطلوب منك إيجاد طول قطعة مجهولة.

حل سؤال الاختبار

بما أن $\triangle MNQ \sim \triangle MOP$ ، فإن الأضلاع المتناظرة متناسبة أي أن $\frac{MN}{MO} = \frac{MQ}{MP}$ ، وبما أن

$$MN = 9, MO = 12, MQ = 15, MP = 15 + x$$

اختبار كلاً من بدائل الإجابة حتى تجد واحداً منها يحقق التنااسب : $\frac{9}{12} = \frac{15}{15+x}$

$$\frac{9}{12} = \frac{15}{15+12} \quad \text{إذا كان: } x = 12 \text{ فإن: } \text{البديل A:}$$

X غير صحيح $\frac{3}{4} \neq \frac{5}{9}$

$$\frac{9}{12} = \frac{15}{15+10} \quad \text{إذا كان: } x = 10 \text{ فإن: } \text{البديل B:}$$

X غير صحيح $\frac{3}{4} \neq \frac{3}{5}$

$$\frac{9}{12} = \frac{15}{15+5} \quad \text{إذا كان: } x = 5 \text{ فإن: } \text{البديل C:}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$



تحقق من فهمك



٣) في المثال السابق، ما قيمة y ؟

20.7 D

9.2 C

8.4 B

5.2 A

استعمال المثلثات المتشابهة: تشابه المثلثات مثل تطابق المثلثات، يحقق خصائص الانعكاس والتماثل والتعدد.

أضف إلى
مطويتك

خصائص المثلثات المتشابهة

نظريّة 2.4

خاصيّة الانعكاس للتشابه: $\triangle ABC \sim \triangle ABC$

خاصيّة التماشل للتشابه: إذا كان $\triangle DEF \sim \triangle ABC$ ، $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ، فإن

خاصيّة التعدّي للتشابه: إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ، $\triangle DEF \sim \triangle XYZ$ ، فإن $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$

ستبرهن النظريّة 2.4 في السؤال 18

أجزاء المثلثات المتشابهة

مثال 4

أوجد طول BE , AD في الشكل المجاور.

بما أن $\angle ABE \cong \angle ACD$, $\angle AEB \cong \angle ADC$; لأنها زوايا متناظرة، ومن مسلمة التشابه AA، يكون $\triangle ABE \sim \triangle ACD$.

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BE}{CD}$$

$$AC = 5, CD = 3.5, AB = 3, BE = x \quad \frac{3}{5} = \frac{x}{3.5}$$

خاصيّة الضرب التبادلي $(3.5) \cdot 3 = 5 \cdot x$

$$\text{بقسمة كلا الطرفين على } 5 \quad 2.1 = x$$

وعليه فإن BE يساوي 2.1

تعريف المضلعات المتشابهة

$$\frac{AC}{AB} = \frac{AD}{AE}$$

$$AC = 5, AB = 3, AD = y + 3, AE = y \quad \frac{5}{3} = \frac{y+3}{y}$$

خاصيّة الضرب التبادلي $5 \cdot y = 3(y + 3)$

$$\text{خاصيّة التوزيع} \quad 5y = 3y + 9$$

$$\text{طرح } 3y \text{ من كلا الطرفين} \quad 2y = 9$$

$$\text{بقسمة كلا الطرفين على } 2 \quad y = 4.5$$



وعليه فإن: $AD = y + 3 = 7.5$

أوجد كل طول فيما يأتي.



WR, RT (4B)

QP, MP (4A)




أفعوانية: يريد تركي أن يقدّر ارتفاع الأفعوانية في مدينة الألعاب، فلاحظ أنه عندما كان طول ظله 3 ft، كان طول ظل الأفعوانية 40 ft. إذا كان طول تركي 3 in و 5 ft، فكم قدماً ارتفاع الأفعوانية؟

فهم: المعطيات: طول ظل تركي 3 ft، وطول ظل الأفعوانية 40 ft، وطول تركي 5 ft و 3 in

المطلوب: ارتفاع الأفعوانية.

رسم مخططاً توضيحيًا. 5 ft و 3 in تساوي 5.25 ft



خطّط: في مسائل الظل، افترض أن الزاويتين الممتوتين من شعاعي الشمس وأي جسمين رأسين تكونان متطابقتين، وأن المثلث المتشكل من الجسم والأرض وشعاع الشمس المماز بقمة الجسم قائم الزاوية، وبما أن هناك زوجين من الزوايا المتطابقة، فإن المثلثين القائمي الزاوية متتشابهان وفق مسلمة التشابه AA؛ إذن يمكن كتابة التناسب الآتى:

$$\frac{\text{طول ظل تركي}}{\text{ارتفاع الأفعوانية}} = \frac{\text{طول ظل تركي}}{5.25}$$

حل: افترض أن ارتفاع الأفعوانية يساوي x وعوّض القيم المعلومة.

$$\frac{5.25}{x} = \frac{3}{40}$$

$$3 \cdot x = 40(5.25)$$

$$3x = 210$$

$$\text{بقسمة كلا الطرفين على } 3$$

$$\text{إذن ارتفاع الأفعوانية يساوي } 70 \text{ ft}$$

تحقق: طول ظل الأفعوانية يساوي 13.3 مرةً تقريباً من طول ظل تركي. تحقق لترى ما إذا كان ارتفاع

$$\checkmark \frac{70 \text{ ft}}{5.25 \text{ ft}} \approx \frac{40}{3} \text{ مرت من طول تركي، } 13.3 \approx \frac{40}{3}$$

تحقق من فهمك

5) **بنيات:** يقف منصور بجوار بناية، وعندما كان طول ظله 9 ft، كان طول ظل البناء 322.5 ft . إذا كان طول منصور 6 ft ، فكم قدماً ارتفاع البناء؟

إرشادات للدراسة

تحويل الوحدات:

$$12 \text{ in} = 1 \text{ ft}$$

$$3 \text{ in} = \frac{3}{12} \text{ ft}$$

$$= 0.25 \text{ ft}$$

أي أن 5 ft و 3 in تساوي

5.25 ft

إرشادات لحل المسألة

حدد الإجابات:
المعقوله:


عندما تحل مسألة، تحقق من معقولية إجابتك. في هذا المثال، طول ظل تركي أكبر بقليل من نصف طوله، وكذلك طول ظل الأفعوانية أكبر من نصف ارتفاعها بقليل؛ لذا فالإجابة معقولة.

أضف إلى مطويتك

تشابه المثلثات


ملخص المفهوم

SAS نظرية التشابه




$\angle A \cong \angle X, \angle C \cong \angle Z$
إذا كانت: $\frac{AB}{XY} = \frac{CA}{ZX}$
فإن: $\Delta ABC \sim \Delta XYZ$

SSS نظرية التشابه



إذا كانت: $\frac{AB}{XY} = \frac{BC}{YZ} = \frac{CA}{ZX}$
فإن: $\Delta ABC \sim \Delta XYZ$


Mسلمة التشابه AA




إذا كانت: $\angle A \cong \angle X, \angle C \cong \angle Z$
فإن: $\Delta ABC \sim \Delta XYZ$

المثلثان 1, 2


في كل مما يأتي حدد ما إذا كان المثلثان متباينين أم لا؟ وإذا كانوا كذلك فاكتب عبارة التشابه، ووضح إجابتك.




(2)




(1)



(4)



(3)



(5) اختيار من متعدد: استعمل الشكل أدناه في إيجاد ارتفاع الشجرة؟

المثال 3

264 ft **A**

60 ft **B**


72 ft **C**

80 ft **D**


جبر: أوجد الطول المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:

المثال 4

VS (7)



KL (6)




(8) اتصالات: طول ظل برج اتصالاتٍ في لحظة معينة 100 ft، وبجواره لوحة تحذيرية مثبتة على عمود طول ظله في اللحظة ذاتها 3 ft و 4 in، إذا كان ارتفاع عمود اللوحة 4 ft و 6 in، فما ارتفاع البرج؟

المثال 5


تدريب وحل المسائل

في كل مما يأتي، حدد ما إذا كان المثلثان متباينين أم لا؟ وإذا كانوا كذلك، فاكتب عبارة التشابه، وإلا فحدد المعلومات الإضافية الكافية لإثبات أنهما متباينان؟ ووضح إجابتك.


الأمثلة 1-3



(11)



(10)




(9)


المثال 4

جبر: أوجد الطول المطلوب في كلٌ مما يأتي:


DB, CB (14)



WZ, UZ (13)




JK (12)



المثال 5 رياضة: يقف أيمن بجوار مرمي كرة السلة. إذا كان طول أيمن 5 ft و 11 in، وطول ظلّه 2 ft، وكان طول ظلّ مرمي كرة السلة في اللحظة ذاتها 4 ft، فما ارتفاع المرمي تقريباً؟

المثال 6 رياضة: رمى عبد الله الكرة لترَّد نحو أحمد، فارتسمت سطح الأرض على بُعد $\frac{2}{3}$ المسافة بينهما، وكانت الزواياتان الناتجتان عن مسار الكرة وسطح الأرض متطابقتين. إذا رمى عبد الله الكرة من ارتفاع 40 in عن سطح الأرض، فعلى أيّ ارتفاع سيلقّطها أحمد؟




برهان: اكتب برهاناً ذا عمودين في كلٌ مما يأتي:

2.4 النظرية

2.3 النظرية

المعلميات 20: المعطيات: $ABCD$ شبه منحرف.


المطلوب: إثبات أن $\frac{DP}{PB} = \frac{CP}{PA}$



المعلميات 19: المعطيات: $\triangle ABC$ و $\triangle XYZ$ قائمَا الزاوية

$$\frac{XY}{AB} = \frac{YZ}{BC}$$

المطلوب: إثبات أن $\triangle YXZ \sim \triangle BAC$




رؤية: عندما ننظر إلى جسم، فإن صورته تُسَقِّطُ على الشبكيّة عبر البؤبؤ، وتكون المسافتان من البؤبؤ إلى أعلى الجسم وأسفله متساويتين، والمسافتان من البؤبؤ إلى أعلى الصورة وأسفلها على الشبكيّة متساويتين أيضاً. هل المثلثان المتكونان بين الجسم والبؤبؤ وبين البؤبؤ والصورة متتشابهان؟ وضّح إجابتك.



الربط مع الحياة

يحدث قصر النظر عندما تجمّع عدسة العين أشعة الضوء أمام الشبكيّة، ويحدث طول النظر عندما تجمّع عدسة العين أشعة الضوء خلف الشبكيّة.




هندسة إحداثية: إحداثيات رؤوس المثلثين $\triangle XYZ$, $\triangle WYV$ هي:
 $X(-1, -9)$, $Y(5, 3)$, $Z(-1, 6)$, $W(1, -5)$, $V(1, 5)$


(22) مثل المثلثين بيانياً، وأثبت أن $\triangle XYZ \sim \triangle WYV$.

(23) أوجد النسبة بين محيطي المثلثين.

(24) **قياس:** إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle JKL$. وطول كل ضلع في $\triangle JKL$ يساوي نصف طول الضلع الم対اظر له في $\triangle ABC$, ومساحة $\triangle ABC$ تساوي 40 in^2 , فما مساحة $\triangle JKL$? ما العلاقة بين مساحتى $\triangle ABC$ ، $\triangle JKL$ ، ومعامل التشابه بينهما؟



(25) **علاج:** استعمل معلومات الربط بالحياة والشكل المجاور لإيجاد المسافة التي يجب أن تفصل بين مصدري أشعة الليزر حتى تكون المنطقتان المعالجتان المتطابقتان بكل من المصادرتين غير متداخلتين.



الربط مع الحياة

في بعض العلاجات الطبية تستعمل أشعة الليزر التي تلامس الجلد وتخترقه مكونة مثلثات متشابهة.

(26) **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة ستنقصي الأجزاء المتناسبة في مثلث.

a) **هندسياً:** ارسم $\triangle ABC$ وارسم \overline{DE} , بحيث تكون موازية لـ \overline{AC} كما في الشكل المجاور.

b) **جدوياً:** قس الأطوال AD, DB, CE, EB وسجلها في جدول، وأوجد النسبتين $\frac{AD}{DB}$, $\frac{CE}{EB}$ وسجلهما في الجدول نفسه.

c) **لفظياً:** اكتب تخميناً حول القطع المستقيمة الناتجة عن مستقيم يوازي أحد أضلاع مثلث ويقطع الضلعين الآخرين.

مسائل مهارات التفكير العليا


(27) **اكتب:** بين أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين مسلمة التشابه AA ، ونظرية التشابه SSS ، ونظرية التشابه SAS .

تحدد: إذا كانت النسبة بين أطوال أضلاع مثلث هي: 2:3:4 ، فأجب بما يأتي:

(28) إذا كان طول أصغر أضلاع مثلث آخر مشابه هو: 16 in، فما طول كل من الضلعين الآخرين فيه؟

(29) قارن النسبة بين محيطي المثلثين ومعامل التشابه بينهما. ماذا تلاحظ؟

(30) **تبرير:** قياسات زوايا مثلثين متشابهين هي: $50^\circ, 85^\circ, 45^\circ$. وأطوال أضلاع أحدهما 3, 4, 5.2 وحدات، وأطوال أضلاع المثلث الآخر $x, x + 1.8$ وحدة، أوجد قيمة x .




(31) **مسألة مفتوحة:** ارسم مثلثاً مشابهاً لـ $\triangle ABC$ المجاور، ووضح كيف تعرف أنهما متشابهان.

(32) **اكتب:** اشرح طريقة يمكنك استعمالها لرسم مثلث يشابه مثلثاً معلوماً، وأطوال أضلاعه ضعف أطوال أضلاع المثلث المعلوم.



(34) جبر: أيٌ مما يأتي يُمثل مساحة المنطقة المظللة؟




$\pi r^2 + r$ C

πr^2 A

$\pi r^2 - r^2$ D

$\pi r^2 + r^2$ B

(33) إجابة مطولة: في الشكل أدناه $\overline{EB} \parallel \overline{DC}$.




(a) اكتب تناصباً يمكن استعماله لإيجاد قيمة x.

(b) أوجد قيمة x وطول \overline{AB} .


مراجعة تراكمية

اكتب جميع الزوايا المتطابقة ثم اكتب تناصباً يربط الأضلاع المتناظرة للمضلعين في كلٍّ مما يأتي: (الدرس 2-1)


$FGHJ \sim MPQS$ (37)



$WXYZ \sim QRST$ (36)





$\triangle JKL \sim \triangle CDE$ (35)



(38) القطع الهندسية السبع: تكون مجموعة القطع الهندسية السبع (Tangram) في الشكل المجاور من سبع قطع: مربع صغير، مثلثين صغيرين قائمة الزاوية ومتطابقين، مثلثين كبيرين قائمة الزاوية ومتطابقين، مثلث قائم الزاوية متوسط المقاس، وشكل رباعي. كيف يمكنك أن تتحقق من أن الشكل رباعي متوازي أضلاع؟ وضح إجابتك. (الدرس 1-3)

حدد المسألة التي يمكن استعمالها؛ لإثبات تطابق المثلثين في كلٍّ مما يأتي، واتكتب “غير ممكن” في الحالة التي لا يمكنك فيها إثبات التطابق. (مهارة سابقة)



استعد للدرس اللاحق

حل كل تناصٍ مما يأتي:



$\frac{x-2}{2} = \frac{3}{8}$ (45)


$\frac{20.2}{88} = \frac{12}{x}$ (44)

$\frac{x}{10} = \frac{22}{50}$ (43)



$\frac{3}{4} = \frac{x}{16}$ (42)

اختبار منتصف الفصل


- (5) إذا كان: $\triangle WZX \sim \triangle SRT$
 $\triangle WZX$ ، فأوجد محيط $ST = 6$ ، $WX = 5$
إذا كان محيط $\triangle SRT$ يساوي 18 وحدة. (الدرس 2-1)





حدد ما إذا كان المثلثان في السؤالين 6، 7 متشابهين أم لا، وإذا كانوا متشابهين، فاكتب عبارة التشابه. وإنما فحدد المعلومات الإضافية الكافية لإثبات أنهما متشابهان، ووضح إجابتك. (الدرس 2-2)



جبر أوجد الطول المطلوب في كل من السؤالين الآتيين: (الدرس 2-2)



إذا كان المضلعلان في كلٍ من السؤالين الآتيين متشابهين، فأوجد قيمة x . (الدرس 1-2)



(3) **اختيار من متعدد:** إذا كانت المسافة بين الطائف والدمام على خريطة تساوي 98 cm ، وكان مقاييس رسم الخريطة على 2.5 cm : 30 km ، فما المسافة الحقيقية بينهما؟

(الدرس 2-1)


1211 km **A**

964 km **B**

1176 km **C**

1031 km **D**

(4) **قياس:** يستعمل عبدالله زاوية النجارين لحساب KP عبر النهر كما في الشكل أدناه، إذا كان: $OK = 4.5 \text{ ft}$ ، $MK = 1.5 \text{ ft}$ ، فأوجد المسافة KP عبر النهر. (الدرس 2-2)





المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة

Parallel Lines and Proportional Parts

2-3

لماذا؟



يسعمل رسّامو الصور المتحركة طرائق عدّة؛ لإضفاء خداع بصري على أعمالهم. كما يستعملون في الرسومات الثلاثية الأبعاد حقيقة كون الأجسام البعيدة تبدو أصغر من الأجسام القريبة إلى المشاهد. ولتحقيق هذا الخداع، يستعمل الرسّامون نظرية التناوب في المثلث.

فيما سبق:

درستُ استعمال التناوب
لحل مسائل تتضمن
مثلاً متشابهة.

(الدرس 2-2)

والآن:


- استعمل الأجزاء المتناسبة في المثلث.
- استعمل الأجزاء المتناسبة في المستقيمات المتوازية.

المفردات:

القطعة المنصفة في المثلث
midsegment of a triangle

أضف إلى
مطويتك

نظريّة التناوب في المثلث




إذا وازى مستقيم ضلعاً من أضلاع مثلث وقطع ضلعه الآخر، فإنّه يقسمهما إلى قطع متساوية أطوالها متناسبة.

$$\text{مثال: إذا كان } \overline{AB} \parallel \overline{CD}, \text{ فإن } \frac{AB}{BC} = \frac{AE}{ED}.$$

ستبرهن النظريّة 2.5 في السؤال 21

مثال 1 إيجاد طول ضلع

في $\triangle PQR$ ، إذا كان: $PS \parallel RQ$ ، $PT = 7.5$ ، $TQ = 3$ ، $SR = 2.5$. فأوجد PS .



استعمل نظرية التناوب في المثلث.

نظرية التناوب في المثلث

$$\frac{PS}{SR} = \frac{PT}{TQ}$$

$$\frac{PS}{2.5} = \frac{7.5}{3}$$

خاصية الضرب التبادلي

$$PS \cdot 3 = (2.5)(7.5)$$

بالضرب

$$3PS = 18.75$$

بقسمة كلا الطرفين على 3

$$PS = 6.25$$

إرشادات للدراسة

التوازي:

إذا كان المستقيمان $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$ متوازيين، فإن القطعتين المستقيمتين $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$ متوازيتين؛ لأنهما جزء من المستقيمين $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$ على الترتيب.
أي أنه إذا كان $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$ فإن $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$

تحقق من فهمك



1) في الشكل أعلاه، إذا كان: $PS = 12.5$ ، $SR = 5$ ، $PT = 15$. فأوجد TQ .


وعكس النظرية 2.5 صحيح أيضاً، ويمكن إثباته باستعمال الأجزاء المتناسبة في المثلث ونظرية التشابه SAS.

نظريّة 2.6

عكس نظرية التناسب في المثلث

إذا قطع مستقيم ضلعين في مثلث وقسمهما إلى قطع مستقيمة متناظرة أطوالها متناسبة، فإن المستقيم يوازي الضلع الثالث للمثلث.

مثال: إذا كان $\overline{ED} \parallel \overline{AC}$ ، فإن $\frac{AE}{EB} = \frac{CD}{DB}$.




ستبرهن النظرية 2.6 في السؤال 22

مثال 2

تحديد ما إذا كان المستقيمان متوازيين

في $\triangle DEF$ إذا كان: $9 = \frac{1}{3} GF$, $DG = \frac{1}{3} GF$, $EH = 3$, $HF = 9$? ووضح إجابتك.

يتعين عليك إثبات أن $\frac{DG}{GF} = \frac{EH}{HF}$ ، وذلك باستعمال عكس نظرية التناسب في المثلث.



معطى

$$DG = \frac{1}{3} GF$$

$$\frac{DG}{GF} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{EH}{HF} = \frac{3}{9}$$

$$= \frac{1}{3}$$


وبما أن:

$$\frac{DG}{GF} = \frac{EH}{HF} = \frac{1}{3}$$

بحسب عكس نظرية التناسب في المثلث، تكون $\overline{GH} \parallel \overline{DE}$.

تحقق من فهمك

2) في الشكل أعلاه، إذا كان: $10 = \frac{1}{2} GF$, $DG = \frac{1}{2} GF$, $EH = 6$, $HF = 10$? $\overline{DE} \parallel \overline{GH}$ ، فهل



إرشادات للدراسة

مثلث القطع المنصفة:
القطع المنصفة الثلاث
في المثلث تشكل مثلثاً
يُسمى مثلث القطع
المنصفة.


أضف إلى

مطويتك

نظريّة القطعة المنصفة في المثلث

نظريّة 2.7

القطعة المنصفة في المثلث توازي أحد أضلاعه، وطولها يساوي نصف طول ذلك الضلع.



مثال: إذا كانت K نقطتي منتصف \overline{FH} , \overline{HG}


على الترتيب، فإن: $\overline{JK} \parallel \overline{FG}$, $JK = \frac{1}{2} FG$.

ستبرهن النظرية 2.7 في السؤال 23

إرشادات للدراسة

القطعة المنصفة:

نظريّة القطعة المنصفة في المثلث، تشبه نظرية القطعة المنصفة في شبه المنحرف، والتي تنص على أن القطعة المنصفة في شبه المنحرف توازي القاعدتين، وطولها يساوي نصف مجموع طولي القاعدتين.




$$\overline{EF} \parallel \overline{AB} \parallel \overline{DC}$$

$$EF = \frac{1}{2}(AB + DC)$$

مثال 3

استعمال نظرية القطعة المنصفة في المثلث



في $\triangle RST$ ، إذا كانت $\overline{XY}, \overline{XZ}$ قطعتين منصفتين، فأوجد كل قياس مما يأتي:

XZ (a)

نظرية القطعة المنصفة في المثلث

$$XZ = \frac{1}{2}RT$$

بالتعمipض

$$XZ = \frac{1}{2}(13)$$

بالتبسيط

$$XZ = 6.5$$

ST (b)

نظرية القطعة المنصفة في المثلث

$$XY = \frac{1}{2}ST$$

بالتعمipض

$$7 = \frac{1}{2}ST$$

بضرب كلا الطرفين في 2

$$14 = ST$$

$m\angle RYX$ (c)

قطعة منصفة في $\overline{XZ} \parallel \overline{RT}$ ، إذن

نظرية الزاويتين المتبادلتين داخلياً

$$\angle RYX \cong \angle YXZ$$


تعريف تطابق الزوايا

$$m\angle RYX = m\angle YXZ$$

بالتعمipض

$$m\angle RYX = 124^\circ$$

تحقق من فهمك




أوجد كل قياس مما يأتي معتمداً على الشكل المجاور:

DE (3A)

DB (3B)

$m\angle FED$ (3C)




الأجزاء المتناسبة من قاطعين لمستقيمات متوازية

هناك حالة خاصة أخرى لنظرية التناسب في المثلث تتضمن ثلاثة مستقيمات متوازية أو أكثر، يقطعها قاطعان. لاحظ أنه إذا مُدَ القاطعان a, b ، فإنَّهما يصنِّعان ثلاثة مثلثات لها ثلاثة أضلاع متوازية.

أضف إلى
مطويتك

الأجزاء المتناسبة من قاطعين لمستقيمات متوازية

إذا قطع قاطعان ثلاثة مستقيمات متوازية أو أكثر، فإنَّ أطوال أجزاء القاطعين تكون متناسبة.



مثال: إذا كان: $\overline{AE} \parallel \overline{BF} \parallel \overline{CG}$ ، وكان $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{EG}$ قاطعان لها،

$$\frac{AB}{BC} = \frac{EF}{FG}$$

فإن

إرشادات للدراسة

تناسبات أخرى:


في النتيجة 2.1 ، يمكن كتابة تناسبين آخرين للمثال:

$$\frac{AB}{EF} = \frac{BC}{FG}, \frac{AC}{EG} = \frac{BC}{FG}$$

نتيجة 2.1

ستبرهن النتيجة 2.1 في السؤال 19

مثال 4 من واقع الحياة



رسم: ترسم مريم ممّراً في منظورٍ ذي نقطة تلاشٍ واحدة، فاستعملت مريم الخطوط الإرشادية الممّيّنة؛ لرسم نافذتين على الجدار الأيسر. إذا كانت القطع المستقيمة: $\overline{AD}, \overline{BC}, \overline{WZ}, \overline{XY}$ متوازية، وكان: $AB = 8 \text{ cm}, DC = 9 \text{ cm}, ZY = 5 \text{ cm}$.

بما أن $\overline{XY} \parallel \overline{WX}$ ، إذن $\frac{AB}{WX} = \frac{DC}{ZY}$ وفق النتيجة 2.1.

النتيجة 2.1

$$\frac{AB}{WX} = \frac{DC}{ZY}$$

بالتعويض

$$\frac{8}{WX} = \frac{9}{5}$$

خاصية الضرب التبادلي

$$WX \cdot 9 = 8 \cdot 5$$

بالتبسيط

$$9WX = 40$$

بقسمة كلا الطرفين على 9

$$WX = \frac{40}{9} \approx 4.4 \text{ cm}$$

تحقق: نسبة DC إلى ZY هي 9 إلى 5، وهي تقريباً 10 إلى 5 أو 2 إلى 1. وكذلك نسبة AB إلى WX هي 8 إلى 4.4 وهي تقريباً 8 إلى 4 أو 2 إلى 1؛ إذن الإجابة معقولة. ✓

يستعمل الرسامون إيحاءات

إدراكية متنوعة، تجعل

الرسم الثنائي الأبعاد يبدو

ثلاثي الأبعاد منها:

- الحجم: تبدو الأشياء البعيدة أصغر حجماً.


- الوضوح: تبدو الأجسام القريبة أكثر وضوحاً.

- التفاصيل: تتضمن الأجسام القريبة تفاصيل دقيقة، في حين تتضمن الأجسام البعيدة معالم عامة.

تحقق من فهمك



4) عقارات: واجهة قطعة الأرض هي طول حدّها المحاذي لمعلمٍ ما مثل شارع أو بحر أو نهر، أوجد طول الواجهة البحرية للقطعة A إلى أقرب عشر المتر.




إذا كانت النسبة بين أطوال أجزاء القاطعين تساوي 1، فإن المستقيمات المتوازية تقطع أجزاءً متطابقة من القاطعين.

أضف إلى
مطويتك

الأجزاء المتناسبة من قاطعين لمستقيمات متوازية

إذا قطع قاطع ثلاثة مستقيمات متوازية أو أكثر، وكانت أجزاءه متطابقة، فإن أجزاء أي قاطع آخر لها تكون متطابقة.




مثال: إذا كان: $\overline{AE} \parallel \overline{BF} \parallel \overline{CG}$ ، وكان $\overline{AC}, \overline{EG}$ قاطعين لها، $\overline{EF} \cong \overline{FG}$ فإن $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ بحيث

ستبرهن النتيجة 2.2 في السؤال 20



استعمال القطع المتطابقة من قاطعين

مثال 5



جبر: أوجد قيمة x .

بما أن $\overrightarrow{JM} \parallel \overrightarrow{KP} \parallel \overrightarrow{LQ}$, $\overline{MP} \cong \overline{PQ}$
فإن $\overline{JK} \cong \overline{KL}$ وفق الترتيبة 2.2.

تعريف التطابق

$$JK = KL$$

$$\text{بالتعويض} \quad 6x - 5 = 4x + 3$$


$$\text{طرح } 4x \text{ من كلا الطرفين} \quad 2x - 5 = 3$$

$$\text{بإضافة 5 للطرفين} \quad 2x = 8$$


$$\text{بقسمة كلا الطرفين على 2} \quad x = 4$$

تحقق من فهمك

أوجد قيمة كل x, y من y .



(5B)




(5A)

يمكن تقسيم قطعة مستقيمة إلى جزأين متطابقين، برسم العمود المنصف للقطعة المستقيمة، ولكن لا يمكن تقسيم قطعة مستقيمة إلى ثلاثة أجزاء متطابقة برسم أعمدة منصفة، ولعمل ذلك تستعمل المستقيمات المتوازية والنتيجة 2.2.


إنشاءات هندسية

تقسيم قطعة مستقيمة إلى ثلاثة أجزاء متطابقة


الخطوة 1: ارسم قطعة مستقيمة \overline{AB} ، ثم استعمل النتيجة 2.2؛ لتقسيمها إلى 3 أجزاء متطابقة.



الخطوة 2:



الخطوة 3:




أنشئ من X و Y مستقيمين يوازيان \overline{ZB} كما درست سابقاً، وسم نقطتي تقاطعهما بالحرفين J, K .



استعمل الفرجار بالفتحة نفسها، لتعيين النقاطين Y, Z ، بحيث $\overline{AX} \cong \overline{XY} \cong \overline{YZ}$ ، حيث \overline{ZB} ارسم.

ارسم \overrightarrow{AC} ، ثم ثبت الفرجار عند A ، وارسم \overrightarrow{AC} عند X . قوساً يقطع \overrightarrow{AC} عند Z .



في $\triangle XYZ$ ، إذا كان $\overline{MN} \parallel \overline{YZ}$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين:


إذا كان: $XY = 10$ ، $XN = 6$ ، $NZ = 9$. (1)

إذا كان: $XY = 10$ ، $XM = 4$ ، $XN = 6$. (2)

، $JK = 15$ ، $JM = 5$ ، إذا كان: (4)

$\overline{JL} \parallel \overline{MP}$ ، فهل $LK = 13$ ، $PK = 9$


برر إجابتك.




، $BC = 15$ ، $BE = 6$ ، إذا كان: (3)

? $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$ ، فهل $DC = 12$ ، $AD = 8$


برر إجابتك.



إذا كانت \overline{JH} قطعة منصفة في $\triangle KLM$ ، فأجد قيمة x في السؤالين الآتيين:



(6)




(5)

(7) خرائط: الشارعان 3 ، 5 في الخريطة المجاورة متوازيان.


إذا كانت المسافة بين الشارع 3 والمركز التجاري على امتداد شارع أبو عبيدة 3201 m ، فأجد المسافة بين الشارع 5 والمركز التجاري على امتداد شارع الاتحاد، مقرباً إجابتك إلى أقرب عشر من المتر.




جبر: أوجد قيمتي y ، x في كلٍ من السؤالين الآتيين:



(9)



(8)




في $\triangle ACD$ ، إذا كان $\overline{BE} \parallel \overline{CD}$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين:

إذا كان: $AB = 6$ ، $BC = 4$ ، $AE = 9$. (10)

إذا كان: $AB = 12$ ، $AC = 16$ ، $ED = 5$ ، فأجد AE . (11)

المثال 1

تدريب وحل المسائل




حدد ما إذا كان $\overline{ZY} \parallel \overline{ZW}$ أم لا، وبرر إجابتك في كل من السؤالين الآتيين:


$$ZX = 18, ZV = 6, WX = 24, YX = 16 \quad (12)$$

$$WX = 31, YX = 21, ZX = 4ZV \quad (13)$$

في $\triangle KLM$ ، إذا كانت $\overline{JH}, \overline{JP}, \overline{PH}$ قطعاً منصفة ، فأوجد قيمة x في كل من السؤالين الآتيين:



(15)




(14) المثال 3



(16) خرائط: المسافة من مدخل الحديقة إلى طريق المشاة على امتداد الطريق المرصوف 880 m. إذا كان طريق المشاة يوازي الطريق الترابي، فأوجد المسافة من مدخل الحديقة إلى طريق المشاة على امتداد منطقة الأشجار.

المثال 4

جبر: أوجد قيمة كل من y, x في السؤالين الآتيين:



(21) النظرية 2.5

(20) النتيجة 2.2

(19) النتيجة 2.1

برهان: اكتب برهاناً ذا عمودين للنظريتين الآتيتين:


(23) النظرية 2.7

(22) النظرية 2.6

استعمل $\triangle QRS$ للإجابة عن السؤالين الآتيين:


(24) إذا كان: $ST = 8, TR = 4, PT = 6$ ، فأوجد QR .

(25) إذا كان: $SP = 4, PT = 6, QR = 12$ ، فأوجد SQ .



$LK = 4, MP = 3, PQ = 6, KJ = 2$ (27) إذا كان:


، فأوجد قيمة كل من $RS = 6, LP = 2$ ، ML, QR, QK, JH




إذا كان: $CE = t - 2, EB = t + 1$ (26)


، فأوجد قيمة كل من $CD = 2, CA = 10$

. t, CE





(28) تاريخ الرياضيات: في القرن السادس عشر الميلادي، ابتكر غاليلو الفرجار لاستعماله في القياس كما في الشكل المجاور. ورسم قطعة مستقيمة طولها يساوي خمسٍ طول قطعة معلومة. أجعل نهايتي ساقِي الفرجار عند طرفِ القطعة المعلومة، ثم ارسم قطعةً مستقيمةً بين علامتي 40 على ساقِي الفرجار. بَينَ أَنْ طُول \overline{DE} يساوي خمسٍ طول \overline{BC} .



إنشاءات هندسية: أنشئ كل قطعة مستقيمة فيما يأتي وفق التعليمات التالية:

(31) قطعة مستقيمة مقسمة إلى خمس قطع متطابقة.

(32) قطعة مستقيمة مقسمة إلى قطعتين النسبة بين طوليهما 1 إلى 3.

(33) قطعة مستقيمة طولها 11 cm ، ومقسمة إلى أربع قطع متطابقة.

تاریخ الرياضیات

جالیلیو جالیلی

1564 م إلى 1642 م)
ولد غاليلو غاليلي في إيطاليا، ودرس الفلسفة والفلك والرياضيات، ولهم إسهامات جوهرية في كل منها.

المثلث	الطول	النسبة
ABC	AD	$\frac{AD}{CD}$
	CD	
	AB	$\frac{AB}{CB}$
	CB	
MNP	MQ	$\frac{MQ}{PQ}$
	PQ	
	MN	$\frac{MN}{PN}$
	PN	
WXY	WZ	$\frac{WZ}{YZ}$
	YZ	
	WX	$\frac{WX}{YX}$
	YX	

(34) تمثيلات متعددة: في هذه المسألة ستستكشف ت同比تات مرتبطة بمنصفات زوايا المثلث.


(a) هندسياً: ارسم ثلاثة مثلثات:
الأول حاد الزوايا، وسممه ABC وارسم \overrightarrow{BD} منصفاً $\angle B$. والثاني منفرج الزاوية وسممه MNP ، وارسم \overrightarrow{NQ} منصفاً $\angle N$ ، والثالث قائم الزاوية وسممه WXY ، وارسم \overrightarrow{XZ} منصفاً $\angle X$.

(b) جدولياً: أكمل الجدول المجاور بالقيم المناسبة.


(c) لفظياً: اكتب تخميناً حول القطعتين المستقيمتين اللتين ينقسم إليهما ضلع مثلث عند رسم منصف لزوايا المقابلة لذلك الضلع.

إرشادات للدراسة


إنشاءات هندسية:
تدَّرَّكْ أَنَّ الفرجار
والمسطرة غير المدرجة
هما الأدَّاتان الوحيدةتان
المُسْتَعْمَلَتَان فِي
الإنشاءات الهندسية.



(35) اكتشف الخطأ: يجد كُلُّ من أسامة وسلطان قيمة x في $\triangle JHL$ ، يقول أسامة: إن MP يساوي نصف JL ؛ إذن x تساوي 4.5، ويقول سلطان: إن JL يساوي نصف MP ؛ إذن x تساوي 18. فهل إجابة أيٍّ منها صحيحة؟ وضح إجابتك.



(36) تبرير: في $\triangle ABC$ ، إذا كان: $AF = FB$, $AH = HC$ ، $DE = \frac{3}{4} BC$ فهل $DA = \frac{3}{4} AB$, $EA = \frac{3}{4} AC$ لا يساويه أبداً؟



(37) **تحدد:** اكتب برهانًا ذا عمودين.

المعطيات: $AB = 4, BC = 4, CD = DE$


المطلوب: إثبات أن $\overline{BD} \parallel \overline{AE}$

(38) **مسألة مفتوحة:** ارسم ثالث قطع مستقيمة أطوالها مختلفة a, b, c ، ثم ارسم قطعة رابعة طولها d ،


$$\cdot \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

(39) **اكتب:** قارن بين نظرية التنااسب في المثلث ونظرية القطعة المنصفة في المثلث.

تدريب على اختبار




(40) إجابة قصيرة: ما قيمة x ؟




مراجعة تراكمية

جبر: اذكر النظرية أو المسلمة التي تبرر تشابه المثلثين، واكتب عبارة التشابه، ثم أوجد أطوال القطع المذكورة في كلٌ مما يأتي: (الدرس 2-2)


\overline{TY} (44)



$\overline{RT}, \overline{RS}$ (43)



\overline{AB} (42)




إذا كانت النقطة S مركز الدائرة الداخلية لـ $\triangle JPL$ ، فأوجد كل قياسٍ مما يأتي: (مهارة سابقة)

SQ (45)

QJ (46)

$m\angle MPQ$ (47)

$m\angle SJP$ (48)



استعد للدرس اللاحق

حُل كل تنااسب مما يأتي:

$$\frac{x}{12-x} = \frac{8}{3} \quad (53)$$

$$\frac{x-2}{2} = \frac{4}{5} \quad (52)$$

$$\frac{2.3}{4} = \frac{x}{3.7} \quad (51)$$

$$\frac{3}{4} = \frac{5}{x} \quad (50)$$

$$\frac{1}{3} = \frac{x}{2} \quad (49)$$

2-4

عناصر المثلثات المتشابهة Parts of Similar Triangles

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

لماذا؟



في كاميرات التصوير الاحترافي تُستعمل أفلام بمعايير خاصة؛ للحصول على صور واضحة، وعند التقاط الصورة المجاورة، كانت المسافة بين النخلة وعدسة الكاميرا 6.16 m، وكان طول النخلة على الفيلم 35 mm يمكن استعمال المثلثات المتشابهة لإيجاد طول النخلة الحقيقي.

فيما سبق:

درست أن أطوال الأضلاع المتناظرة لمضلعين متشابهين تكون متناسبة.
(مهارة سابقة)


واليآن:

- أتعرف علاقات التناسب الخاصة بكل من منصفات الزوايا والارتفاعات والقطع المتوسطة المتناظرة في المثلثات المتشابهة وأستعملها.
- أستعمل نظرية منصف زاوية في مثلث.

نظريات

قطع مستقيمة خاصة في المثلثين المتشابهين

أضف إلى
مطويتك




إذا تشابه مثلثان، فإن النسبة بين طولي كل ارتفاعين متناظرين تساوي النسبة بين طولي كل ضلعين متناظرين.

2.8

مثال: إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle FGH$ ، $\overline{FJ}, \overline{AD}$ ارتفاعين .

$$\frac{AD}{FJ} = \frac{AB}{FG}$$
 فإن




إذا تشابه مثلثان، فإن النسبة بين طولي القطعتين المنصفتين لكل زاويتين متناظرتين تساوي النسبة بين طولي كل ضلعين متناظرين.

2.9

مثال: إذا كان $\triangle KLM \sim \triangle QRS$ قطعتين منصفتين .

$$\frac{LP}{RT} = \frac{LM}{RS}$$
 فإن




إذا تشابه مثلثان، فإن النسبة بين طولي كل قطعتين متوسطتين متناظرتين تساوي النسبة بين طولي كل ضلعين متناظرين.

2.10

مثال: إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle WXY$ قطعتين $\overline{CD}, \overline{YZ}$ متوسطتين .

$$\frac{CD}{YZ} = \frac{AB}{WX}$$
 فإن

برهان النظرية 2.8



المعطيات: $\triangle FGH \sim \triangle KLM$ ، \overline{FJ} ، \overline{KP} ارتفاعان.

$$\frac{FJ}{KP} = \frac{HF}{MK}$$

برهان حر:

بما أن: $\triangle FGH \sim \triangle KLM$ ، $\angle FJH \cong \angle KPM$ ، كما أن $\angle H \cong \angle M$ ، إذن $\triangle FGH \sim \triangle KLM$ ، لأنهما زاويتان قائمتان ناتجتان عن ارتفاعين، وجميع الزوايا القوائم متطابقة؛ لذلك فإن


$$\frac{FJ}{KP} = \frac{HF}{MK} \text{ بحسب مسلمة التشابه AA ؛ إذن } \triangle HFJ \sim \triangle MKP \text{ وفق تعريف المضلعين المتشابهين.}$$

ويمكنك استعمال القطع المستقيمة الخاصة في المثلثات المتشابهة لإيجاد الأطوال المجهولة.

استعمال القطع الخاصة في المثلثات المتشابهة

مثال 1

إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle FDG$ في الشكل أدناه، فأوجد قيمة x .



\overline{AP} منصفاً زاويتين متناظرتين و \overline{FQ} ضلعان متناظران للمثلثين المتشابهين $\triangle ABC$ ، $\triangle FDG$. النسبة بين طول القطعتين المستقيمتين المنصفتين لزوايتي متناظرتين في مثلثين متشابهين، تساوي النسبة بين طولي ضلعين متناظرين.

$$\frac{AP}{FQ} = \frac{AB}{FD}$$

$$\frac{x}{8} = \frac{15}{12}$$

$$\begin{aligned} &\text{خاصية الضرب التبادلي} \\ &8 \cdot 15 = x \cdot 12 \\ &120 = 12x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{بالتبسيط.} \\ &10 = x \end{aligned}$$


إرشادات للدراسة

استعمال معامل التشابه :


يمكن حل المثال 1 أيضاً بإيجاد معامل التشابه $\triangle ABC$ ، $\triangle FDG$ بين $\triangle ABC$ ، $\triangle FDG$ ، وتكون النسبة $\frac{AP}{FQ}$ طول القطعة المستقيمة المنصفة لزاوية المناظرة لها في $\triangle ABC$ إلى طول القطعة المستقيمة المنصفة لزاوية المناظرة لها في $\triangle FDG$ تساوي معامل التشابه هذا.

تحقق من فهمك ✓

أوجد قيمة x في المثلثين المتشابهين، في كل من السؤالين الآتيين:



(1B)




(1A)

يمكنك استعمال القطع المستقيمة الخاصة في المثلثات المتشابهة لحل مسائل من واقع الحياة.

استعمال المثلثات المتشابهة لحل المسائل

مثال 2 من واقع الحياة

تصوير: بالرجوع إلى فقرة "لماذا؟" بداية الدرس، يبين الرسم التوضيحي أدناه (الرسم ليس على القياس) موقع الكاميرا وطول الصورة والمسافة من عدسة الكاميرا إلى الفيلم. أوجد الارتفاع الحقيقي للنخلة.



افهم: المعطيات: المسافة بين النخلة وعدسة الكاميرا 6.16 m ، وطول النخلة على الفيلم 35 mm ، والمسافة بين العدسة والفيلم 42 mm .

المطلوب: الارتفاع الحقيقي للنخلة.

تكون النخلة وصورتها على الفيلم متوازيتين، ويكون \overline{CH} و \overline{CG} ارتفاعين في المثلثين $\triangle ABC$, $\triangle EFC$.

خطط: بما أن $\overline{AB} \parallel \overline{EF}$ ، فإن: $\angle BAC \cong \angle CFE$, $\angle CBA \cong \angle CEF$ وفق نظرية الزاويتين المترادفات داخلياً؛ لذلك فإن $\triangle ABC \sim \triangle EFC$ وفق مسلمة التشابه AA . اكتب تناصياً وحّلّ لإيجاد قيمة x .

النظرية 2.8

$$\frac{AB}{EF} = \frac{GC}{HC}$$

حل:

$$\frac{x\text{ m}}{35\text{ mm}} = \frac{6.16\text{ m}}{42\text{ mm}}$$

خاصية الضرب التبادلي

$$x(42) = 35(6.16)$$

بالتبسيط

$$42x = 215.6$$

بقسمة كلا الطرفين على 42


$$x \approx 5.13$$

إذن ارتفاع النخلة 5.13 m تقريباً.

تحقق: نسبة طول الصورة إلى المسافة بين العدسة والفيلم هي $35:42$ أو $5:6$ ، ونسبة ارتفاع النخلة إلى المسافة بينها وبين العدسة هي: $6.16 : 5.13$ ، أي $5:6$ تقريباً . ✓

تحقق من فهمك

2) حدائق: في الشكل المجاور حديقتان بجوارهما نافورة، إذا كانت الحديقتان تشكلان مثلثين متشابهين، فأوجد المسافة من مركز النافورة إلى الضلع الأطول في حديقة الفل.




الربط مع الحياة

طرحت الكاميرات الرقمية في الأسواق لأول مرة عام 1994م ، وكانت درجة وضوح الصورة 640×480 بكسل، وفي عام 2005 أمكنأخذ صورة بدرجة وضوح بلغت 2912×4368 بكسل بواسطة كاميرا أكثر وضوحاً لدرجة 12.8 مليون بكسل، وهي صورة أوضح كثيراً مما تعرضه معظم الحواسيب، فظهرت شاشات حواسيب عالية الوضوح تسمى $4K$.

نظريّة منصف زاويّة في مثلث: تعلّمت أن منصف زاويّة هو نصف مستقيم يقسمها إلى زاويتين متقابقيتين، وإضافة لذلك يقسم منصف الزاويّة في مثلث الضلع المقابل وفق تناصٍ مع الضلعين الآخرين.

أضف إلى
مطويتك



نظريّة 2.11 منصف زاويّة في مثلث

منصف زاويّة في مثلث يقسم الضلع المقابل إلى قطعتين متساويتين النسبة بين طوليهما تساوي النسبة بين طولي الضلعين الآخرين.

مثال: إذا كانت \overline{JM} مننصف زاويّة في المثلث

$$\frac{KM}{KJ} = \frac{LJ}{LM} \rightarrow \text{القطعتان المشتركتان بالرأس } K \quad \text{فإن } \frac{KM}{LJ} = \frac{KJ}{LM} \rightarrow \text{القطعتان المشتركتان بالرأس } L$$

إرشادات للدراسة

التناسب: يمكن كتابة تناسب آخر باستعمال نظريّة مننصف زاويّة في مثلث هو

$$\frac{KM}{KJ} = \frac{LM}{LJ}$$

ستبرهن النظريّة 2.11 في السؤال 19

استعمال نظريّة مننصف زاويّة في مثلث

مثال 3

أوجد قيمة x في الشكل المجاور.

بما أن \overline{RT} مننصف زاويّة في $\triangle QRS$ ، فيمكنك استعمال نظريّة مننصف زاويّة في مثلث لكتابة تناسب.

نظريّة مننصف زاويّة في مثلث

بالتعويض

خاصيّة الضرب التبادلي

بالتبسيط

بإضافة x لكلا الطرفين

بقسمة كلا الطرفين على 20

$$\frac{QT}{ST} = \frac{QR}{SR}$$

$$\frac{x}{18-x} = \frac{6}{14}$$

$$(18-x)(6) = x \cdot 14$$

$$108 - 6x = 14x$$

$$108 = 20x$$

$$5.4 = x$$

إرشادات للدراسة

المثلثات الناتجة عن مننصف زاويّة في مثلث:

لا يرتبط التناسب في نظريّة مننصف زاويّة في مثلث بتشابهه مثاليّن؛ إذ إن المثلثين الناشئين عن مننصف زاويّة في مثلث ليسا مشابهين في الحالة العامة، على الرغم من التناسب بين زوجين من أضلاعهما، وجود زاويّة في أحدهما مطابقة لزاويا في الآخر.

لكن المثلثين يتشاربهان في حالة قسمة المثلث إلى مثاليّن متطابقيّن.

تأكد

المثال 1




أوجد قيمة x في كل من الشكلين الآتيين :




(3) صورة: ارتفاع قطّة 10 in ، وارتفاع صورتها على شبكيّة العين 7 mm ، إذا كان $\triangle ABE \sim \triangle DBC$ ، وكانت المسافة من بؤبة العين إلى الشبكيّة 25 mm ، فكم تبعد القطّة عن بؤبة العين مغرياً إجابتكم إلى أقرب جزء من عشرة؟

المثال 2




المثال 3


أوجد قيمة المتغير في كلٌ من السؤالين الآتيين:




(5)




(4)




(7)



(6)




(9)




(8)


- المثال 2** (10) طرق: يشكلُ الطريقان المتقاطعان في الشكل أدناه مثلثين متشابهين، إذا كان $AC = 382 \text{ ft}$ ، $MP = 248 \text{ ft}$ ، وتبعُد محطة المحروقات 50 ft عن التقاطع، فكم يبعد المصرف عن التقاطع مقرّباً إجابتك إلى أقرب عدد صحيح؟



أوجد قيمة المتغير في كلٌ من السؤالين الآتيين.


المثال 3

(12)



(11)


- (13) جبر إذا كانت $\overline{AB}, \overline{JK}$ ارتفاعين، وكان:
 $\triangle DAC \sim \triangle MJL, AB = 9$, $AD = 4x - 8, JK = 21, JM = 5x + 3$
فأوجد قيمة x .




(14) **برهان:** اكتب برهاناً حراً للنظرية 2.9.

(15) **برهان:** اكتب برهاناً ذا عمودين للنظرية 2.10.


جبر: أوجد قيمة x في كلٍ من السؤالين الآتيين:



(17)



(16)



برهان: اكتب برهاناً ذا عمودين في كلٍ من السؤالين الآتيين.


إرشادات للدراسة

التناسب: في التناسب، $a > c$ ، إذا كان $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ فإن $b > d$. والعكس صحيح أيضاً، إذا كان $a > c$ ، فإن $b > d$

(20) **المعطيات:** \overline{AS} تنصف $\angle HAG$

$$\angle H \cong \angle G$$



المطلوب: إثبات أن: $\frac{HS}{GS} = \frac{AH}{AG}$



(21) **المعطيات:** \overline{ACB} تنصف $\angle ACB$.

و بالرسم $\overline{AE} \parallel \overline{CD}$


المطلوب: إثبات أن: $\frac{AD}{DB} = \frac{AC}{BC}$



(21) **أثاث:** يمثل الشكل المجاور خزانة كتب مثلثة الشكل، المسافة بين كل رفٍ فيها تساوي 13 in. وقطعة متواسطة لـ $\triangle ABC$. إذا كان $EF = 3\frac{1}{3}$ in فكم يكون BK ؟


مسائل مهارات التفكير العليا

(22) **اكتشف الخطأ:** يحاول كلٌ من عبد الله وفيصل أن يجد قيمة x في الشكل المجاور. فيقول عبد الله: لإيجاد قيمة x أحل النسبة $\frac{5}{8} = \frac{15}{x}$ ، ويقول فيصل: لإيجاد قيمة x ، أحل النسبة $\frac{8}{15} = \frac{5}{x}$ ، أيٌ منها على صواب؟ وضح إجابتك.



(23) **تبرير:** أوجد مثلاً مصادداً للعبارة الآتية. وضح إجابتك.

"إذا كانت النسبة بين ارتفاع مثليٍ وطول أحد أضلاعه تساوي النسبة بين الارتفاع وطول الضلع الم対ظرين لهما في مثلث آخر، فإن المثلثين متباين."




(24) **تحدد:** إذا كان محيط $\triangle PQR$ يساوي 94 وحدة، و \overline{QS} منصف لـ $\angle PQR$ ، فأوجد $.PS, RS$

(25) **اكتب:** بِّين أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين النظرية 2.9 والنظرية 2.11 .

تدريب على اختبار


(27) **إجابة قصيرة:** في الشكلين أدناه:

$$\overline{DB} \cong \overline{BC}, \overline{FH} \cong \overline{HE}$$



إذا كان: $.AB, \triangle ACD \sim \triangle GEF$ ، فأوجد

(26) أيُّ الحقائق الآتية ليست كافية لإثبات أن المثلثين $ACF \sim HCG$ و HCG متباين؟



$\overline{AF} \parallel \overline{HG}$ **A**

$\frac{AC}{HC} = \frac{FC}{GC}$ **B**

$\frac{CG}{CF} = \frac{1}{2}$ **C**

و $\angle CHG$ و $\angle FAH$ قائمتان. **D**

مراجعة تراكمية


جبر: أوجد قيمة y في كل مما يأتي. (الدرس 3-2)

(30)

(29)

(28)

(31) **طائرات:** في عرض للطائرات النفاثة، شَكَّلت الطائرات تشكيلاً يبدو كمثيلين بينهما ضلوع مشترك. اكتب برهاناً ذا عمودين لإثبات أن $\triangle SRT \cong \triangle QRT$ ، علماً بأن T متصرف \overline{SQ} ، و $\overline{SR} \cong \overline{QR}$. (مهارة سابقة)



استعد للدرس اللاحق

أوجد المسافة بين كل نقطتين في كل مما يأتي:

$C(-2, 0), D(6, 4)$ (34)
 $R(-6, 10), S(8, -2)$ (37)

$A(2, 3), B(5, 7)$ (33)

$J(-4, -5), K(2, 9)$ (36)

$E(-3, -2), F(5, 8)$ (32)

$W(7, 3), Z(-4, -1)$ (35)

الكسريّات

Fractals


2-4




الكسريّات أشكال هندسية تنتج باستعمال تكرار الأجزاء (iteration)، **وتكرار الأجزاء** هو عملية تكرار النمط نفسه مرّةً تلو الأخرى، وتكون الكسريّات **ذاتيّة التشابه**؛ أي أن الأجزاء الصغيرة للشكل لها الخصائص الهندسية نفسها للشكل الأصلي.

نشاط 1


المرحلة 2: كرر العملية مع المثلثات الثلاثة غير المظللة، وصل نقاط متصفات أضلاع المثلث لتشكل مثلثاً آخر، وظلل المثلث الداخلي.



المرحلة 1: صل نقاط متصفات أضلاع المثلث لتشكل مثلثاً آخر، وظلل المثلث الداخلي.



البداية: رسم مثلثاً متطابق الأضلاع طول ضلعه 8 وحدات في ورقة منقطة.



إذا كررت هذه العملية إلى مالانهاية، فإن الشكل الناتج يسمى مثلث سيربنسكي.

تحليل النتائج:

1) إذا استمررت في هذه العملية، فكم يكون عدد المثلثات غير المظللة في المرحلة 3؟

2) ما محيط المثلث غير المظلل في المرحلة 4؟


3) إذا استمررت في هذه العملية إلى مالانهاية، فماذا سيحصل لمحيط كل مثلث غير مظلل؟

4) **تحذ:** استناداً إلى الشكل المجاور، أكمل الآتي باستعمال برهان ذي عمودين:

المعطيات: $\triangle KAP$ متطابق الأضلاع.


متصرفات: D, F, M, B, C, E على الترتيب.

المطلوب: $\triangle BAC \sim \triangle KAP$.



5) يمكن رسم شجرة كسرية، برسم غصنين جديدين من نهاية كل غصن أصلي، بحيث يكون طول كل غصن منها مساوياً لثلاث طول الغصن السابق له.

a) ارسم المرحلة 3 والمرحلة 4 للشجرة الكسرية. ما العدد الكلي للأغصان في المراحل الأربع جميعها؟
(لا تعدد الساق)



b) اكتب عبارةً جبريةً يمكن استعمالها للتنبؤ بالعدد الكلي للأغصان في نهاية كل مرحلة.

جميع العمليات المكررة لا تتضمن رسوماتٍ لأسкаال هندسية، فبعض العمليات المكررة، يمكن أن تترجم إلى صيغٍ أو معادلات مشابهة للعبارة الجبرية التي كتبها في السؤال 5 في الصفحة السابقة، وتسّمى هذه العبارات **صيغًا ترددية**.

نشاط 2

مثلث باسكال هو نمط عددي يبدأ كل صفٍ فيه بالعدد 1 ، وينتهي بالعدد 1 أيضًا ، ويخرج كل حدٌ من حدود الصفوف الأخرى عن جمع الحدين الواقعين فوقه. أوجد صيغةً لمجموع حدود كل صفٍ في مثلث باسكال بدلالة رقم هذا الصف.

الخطوة 1: اكتب الصفوف الخمسة الأولى **الخطوة 2:** أوجد مجموع حدود كل صفٍ.
من مثلث باسكال.
رقم الصف، ويمكن استعماله لإيجاد
مجموع حدود كل صفٍ.

النقط	المجموع	مثلث باسكال	الصف
$2^0 = 2^1 - 1$	1	1	1
$2^1 = 2^2 - 1$	2	1 1	2
$2^2 = 2^3 - 1$	4	1 2 1	3
$2^3 = 2^4 - 1$	8	1 3 3 1	4
$2^4 = 2^5 - 1$	16	1 4 6 4 1	5

تحليل النتائج :

6) اكتب صيغةً للمجموع S لحدود الصف n لمثلث باسكال.

7) ما مجموع حدود الصف الثامن في مثلث باسكال؟

تمارين :

اكتب صيغةً تردديةً لـ $F(x)$.

x	0	5	10	15	20
$F(x)$	0	20	90	210	380

(9)

x	2	4	6	8	10
$F(x)$	3	7	11	15	19

(8)


x	4	9	16	25	36
$F(x)$	5	6	7	8	9

(11)

x	1	2	4	8	10
$F(x)$	1	0.5	0.25	0.125	0.1

(10)

12) **تحدد** يمثل النمط أدناه متتابعةً أعداد مثلثية. ما عدد النقاط في الحد الثامن في هذه المتتابعة؟ هل من الممكن كتابة صيغةً تردديةً يمكن استعمالها لتحديد عدد النقاط في العدد المثلثي ذي الرقم n في هذه المتتابعة؟ وإذا كان ذلك ممكناً فاكتب الصيغة، وإلا فوضح السبب.



دليل الدراسة والمراجعة

ملخص الفصل

المفاهيم الأساسية

المضلعات المتشابهة والمثلثات المتشابهة (الدرس 2-1, 2-2)

• يتشابه مضلعان إذا وفقط إذا كانت زواياهما المتناظرة متطابقة، وأطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة.

• يكون المثلثان متشابهين إذا كانت:

AA: زاويتان في أحدهما متطابقتين لزاويتين في المثلث الآخر.

SSS: أطوال الأضلاع المتناظرة للمثلثين متناسبة.

SAS: طولاً ضلعين في أحدهما متناسبيين مع طولي الضلعين المتناظرين لهما في المثلث الآخر، والزاويتان الممحورتان متطابقتين.

الأجزاء المتناسبة (الدرس 3-2)

• إذا وازى مستقيم أحد أضلاع مثلث، وقطع الضلعين الآخرين في نقطتين محددين، فإنه يقسم هذين الضلعين إلى قطع مستقيمة أطوالها متناسبة.

• القطعة المنصفة في المثلث توازي ضلعاً فيه، وطولها يساوي نصف طوله.

عناصر المثلثين المتشابهين (الدرس 4-2)

• إذا تشابه مثلثان فإن النسبة بين كلٍّ من طولي ارتفاعيهما المتناظرين، وطولي منصفي الزاويتين المتناظرتين، وطولي القطعتين المتوسطتين المتناظرتين تساوي النسبة بين طولي ضلعين متناظرين.

نظم أفكار

الطلوبيات



تأكّد من أن المفاهيم الأساسية مدوّنة في مطويتك.




مراجعة الدروس

2-1

المضلعات المتشابهة (ص 72-79)

مثال 1

حدد ما إذا كان المضلعين أدناه متشابهين أم لا. ببر إجابتك. وإذا كانا كذلك، فاكتتب عبارة التشابه ومعامل التشابه، ووضح إجابتك.



الخطوة 1 : حدد الزوايا المتناظرة المتطابقة
 $\angle J \cong \angle T, \angle K \cong \angle U, \angle L \cong \angle V, \angle M \cong \angle W$


الخطوة 2 : اختبر النسب بين أطوال الأضلاع المتناظرة.

$$\frac{JK}{TU} = \frac{12}{6} = \frac{2}{1}, \quad \frac{KL}{UV} = \frac{24}{16} = \frac{3}{2}$$


$$\frac{LM}{VW} = \frac{24}{14} = \frac{12}{7}, \quad \frac{JM}{TW} = \frac{6}{6} = \frac{1}{1}$$

بما أن الأضلاع المتناظرة غير متناسبة، فإن المضلعين $TUVW, JKLM$ غير متشابهين.

- (1) حدد ما إذا كان المضلعين أدناه متشابهين أم لا، وإذا كانا كذلك، فاكتتب عبارة التشابه ومعامل التشابه، ووضح إجابتك.



(2) المثلثان في الشكل أدناه متشابهان، أوجد قيمة x .




- (3) **النظام الشمسي:** في نموذج دقيق لنظامنا الشمسي، وضعت سميرة الأرض على بعد 1 ft من الشمس، علمًا بأن المسافة الحقيقة بين الأرض والشمس 93000000 mi، إذا كانت المسافة من بلوتو إلى الشمس 3695950000 mi، فعلى أي بُعد من الشمس ستضع سميرة بلوتو في نموذجها؟

2-2

المثلثات المتشابهة (ص 80-88)

مثال 2

حدد ما إذا كان المثلثان الآتيان متشابهين أم لا، وإذا كانا كذلك، فاكتتب عبارة التشابه، ووضح إجابتك.




لأنهما زاويتان قائمتان، والآن اختبر تناسب طولي سأفي المثلثين القائمين.


$$\frac{WZ}{XZ} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} \quad \frac{WZ}{YZ} = \frac{9}{16} = \frac{3}{4}$$

وبيما أنه يوجد ضلائع في المثلث الأول، طولاهما متناسبان مع طولي نظيريهما في الثاني، وأن الزاويتين المحصورتين بيتهما متطابقتان، فإن $\triangle WZX \sim \triangle XZY$ ، وفق نظرية التشابه SAS.

- حدد ما إذا كان المثلثان في كلٍ من السؤالين الآتيين متشابهين أم لا، وإذا كانا كذلك، فاكتتب عبارة التشابه، ووضح إجابتك.



(5)




(4)

- (6) **أشجار:** يريد عبد الله أن يقدر ارتفاع شجرة، فوقف على مسافة 66 ft منها، وكانت نهاية ظله ونهاية ظل الشجرة عند النقطة نفسها، إذا كان طول عبد الله 6 ft و 4 in و طول ظله 15 ft، فما ارتفاع الشجرة؟


دليل الدراسة والمراجعة

المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة (ص 98-90)

2-3


أوجد قيمة x في كلٍ من السؤالين الآتيين:

(8)



(7)


(9) **شوارع:** أوجد المسافة على امتداد شارع المطار بين الشارعين 36، 37، 38، بفرض أن الشوارع متوازية




2-4

عناصر المثلثات المتشابهة (ص 105-99)



أوجد قيمة المتغير في كلٍ من السؤالين الآتيين مقرًّا إجابتك إلى أقرب جزء من عشرة:



(10)



(12) **عين الإنسان:** تستعمل عين الإنسان المثلثات المتشابهة لقلب الشيء وتصغيره، عندما يمر خلال العدسة إلى الشبكية، فما المسافة بين عدسة العين والشبكية؟

**مثال 3** جبر: أوجد قيمة كلٍ من x, y .

تعريف التطابق

$$FK = KG$$

$$3x + 7 = 4x - 1$$

$$-x = -8$$

$$x = 8$$

تعريف التطابق

$$FJ = JH$$

$$y + 12 = 2y - 5$$

$$-y = -17$$

$$y = 17$$


بقسمة كلا الطرفين على (-1)

تعريف التطابق

$$y + 12 = 2y - 5$$

$$-y = -17$$

بقسمة كلا الطرفين على (-1)

**مثال 4**أوجد قيمة x .

استعمل نظرية منصف زاوية في مثلثٍ لكتابة تناوب.

نظرية منصف زاوية في مثلث.

بالتعويض

$$\frac{WX}{YW} = \frac{XZ}{YZ}$$

$$\frac{x}{28-x} = \frac{12}{14}$$

خاصية الضرب التبادلي

$$(28-x)(12) = x \cdot 14$$

بالتبسيط

$$336 - 12x = 14x$$

بإضافة $12x$ لكلا الطرفين

$$336 = 26x$$

بقسمة كلا الطرفين على 26

$$12.9 \approx x$$




اختبار الفصل

6 جبر: $\triangle MNP$ متطابق الأضلاع، محیطه $12a + 18b$ ، إذا كانت \overline{QR} قطعة منصفة فيه، فما قيمة QR ؟


7 جبر: $\triangle ABC$ قائم الزاوية و متطابق الضلعين، و طول وتره h ، إذا كانت \overline{DE} قطعة منصفة للوتر وأحد ضلعى القائمة فيه و طولها $? \triangle ABC$ ، $4x$

8 نماذج: لدى سالم نموذج لسيارة سباق حقيقية، إذا كان طول السيارة الحقيقية 10 ft و 6 in ، و طول النموذج 7 in ، مما معنّى تشابه النموذج إلى السيارة الحقيقية؟

أوجد قيمة x في كلٍ من السؤالين الآتيين:




(9)




(10)

جبر: أوجد كل طول مشار إليه في كلٍ من السؤالين الآتيين:


WZ, UZ (11)




KL (12)



حدّد ما إذا كان المثلثان متشابهين أم لا في كلٍ من السؤالين الآتيين، وإذا كانوا كذلك، فاكتب عبارة التشابه ومعامل التشابه، وصحّح إجابتك.




(1)



(2)


أبراج: استعمل المعلومات الآتية لحل السؤالين الآتيين: لتقدير ارتفاع برج Jin Mao في شنغهاي في الصين، شاهد سائق قمة البرج في مرآة موضوعة على الأرض ووجهها إلى أعلى.




a) كم متراً ارتفاع البرج تقريباً؟

b) لماذا تكون طريقة الانعكاس في المرأة في هذه الحالة أفضل للقياس غير المباشر لارتفاع البرج من استعمال الظل؟

جبر: أوجد قيمتي y, x في كلٍ من السؤالين الآتيين، مقرّباً إجابتك إلى أقرب عشرة إذا كان ذلك ضروريّاً.



(5)



(4)

الإعداد للاختبارات



تعين اللامثال

أحياناً تتطلب أسئلة الاختيار من متعدد، تحديد أيّ البدائل المعطاة تعدّ لا مثلاً صحيحاً، وتتطلب هذه الأسئلة أسلوباً مختلفاً لحلها.

استراتيجيات تعين اللامثال

الخطوة 1

اقرأ المسألة وفهمها.

- اللامثال: اللامثال هو بديل من بدائل الإجابة لا يحقق شروط المسألة.
- كلمات أساسية: ابحث عن الكلمة لا، أو أي كلمة تدلّ على النفي (تكتب عادة بخط غامق، أو يوضع تحتها خط)؛ لفهم منها أن المطلوب منك أن تجد لا مثلاً.


الخطوة 2

اتبع الإرشادات والخطوات الآتية؛ لمساعدتك على تعين اللامثال:

- عين بدائل الإجابة الواضح عدم صحتها واحذفها.
- احذف البدائل التي تبدو بعيدة عن محتوى السؤال.
- احذف البدائل ذات الوحدات غير الصحيحة.
- اخبر بدائل الإجابة المتبقية.

مثال

اقرأ المسألة جيداً، حدّد المطلوب فيها، ثم استعمل المعطيات لحلها.



أيّ مما يأتي لا يكفي لإثبات أنّ $\triangle QMN \sim \triangle QRS$ ؟

$$\angle QMN \cong \angle QRS \quad \mathbf{A}$$

$$\overline{MN} \parallel \overline{RS} \quad \mathbf{B}$$

$$\overline{QN} \cong \overline{NS} \quad \mathbf{C}$$

$$\frac{QM}{QR} = \frac{QN}{QS} \quad \mathbf{D}$$



الحرف "لا" المكتوب بالخط الغامق، يُشير إلى أنه يتبع عليك أن تجد لاماً، اختبر كلاً من بدائل الإجابة باستعمال مبادئ تشابه المثلثات؛ لترى ما إذا كان أي منها لا يثبت أن $\triangle QMN \sim \triangle QRS$.

$$\angle QMN \cong \angle QRS : \text{البديل A}$$

إذا كانت $\angle QMN \cong \angle QRS$ ، فإن $\triangle QMN \sim \triangle QRS$ وفق مسلمة التشابه AA.

$$\overline{MN} \parallel \overline{RS} : \text{البديل B}$$


إذا كان $\overline{QR} \parallel \overline{MN} \parallel \overline{RS}$ ، لأنهما زاويتان متناظرتان بالنسبة لمستقيمين متوازيين قطعهما القاطع ، لذلك $\triangle QMN \sim \triangle QRS$ وفق مسلمة التشابه AA.

$$\overline{QN} \cong \overline{NS} : \text{البديل C}$$

إذا كانت $\overline{QN} \cong \overline{NS}$ ، فإننا لا نستطيع أن نستنتج أن $\triangle QMN \sim \triangle QRS$ ؛ لأننا لا نعرف أي شيء عن \overline{QM} ، \overline{MR} ، لذلك فالبديل C يُعد لاماً، والإجابة الصحيحة هي C. وإذا كان لديك وقت فاخبر البديل D للتتأكد من أنه مثال صحيح.

تمارين ومسائل

(3) أي مما يأتي لا يكفي لإثبات أن $\triangle GIK \sim \triangle HIG$ ؟



$$\angle GKI \cong \angle HGI \quad \text{A}$$

$$\frac{HI}{GI} = \frac{GI}{IK} \quad \text{B}$$

$$\frac{GH}{GI} = \frac{GK}{IK} \quad \text{C}$$

$$\angle IGK \cong \angle IHG \quad \text{D}$$

(4) أي مثنين مما يأتي ليسا بالضرورة متشابهين؟

A مثلثان قائما الزاوية في كلّ منها زاوية قياسها 30°


B مثلثان قائما الزاوية في كلّ منها زاوية قياسها 45°

C مثلثان متطابقان الساقين

D مثلثان متطابقان الأضلاع

أقرأ كل سؤال مما يأتي، ثم اكتب رمز الإجابة الصحيحة:

(1) أي التnasيات التالية غير صحيحة في الشكل أدناه؟



$$\frac{AD}{CD} = \frac{CD}{DB} \quad \text{A}$$

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AC}{AD} \quad \text{B}$$

$$\frac{AB}{CB} = \frac{CB}{DB} \quad \text{C}$$

$$\frac{AC}{AB} = \frac{CD}{AC} \quad \text{D}$$

(2) أي شكل يمكن أن يكون مثلاً مضاداً للتخمين أدناه؟

"إذا كانت جميع زوايا شكل رباعي قوائم فإنه مربع"

A متوازي الأضلاع

B المستطيل


C المعين

D شبه المنحرف



أسئلة الاختيار من متعدد

(4) أوجد $m\angle RST$ في المعيّن $QRST$ أدناه.




120° C

150° D

60° A

90° B

(5) ما مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع أدناه؟




630° C

720° D

450° A

540° B

(6) أوجد قيمة x .



5 C

6 D

3 A

4 B

(7) شكلان رباعيان متباينان بمعامل تشابه 3:2، إذا كان محيط الشكل الرباعي الأكبر 21 m، فما محيط الشكل الرباعي الأصغر؟

28m C


31.5m D

14m A

17.5m B

اقرأ كل سؤال فيما يأتي، ثم حدد رمز الإجابة الصحيحة:

(1) يُريد عادل أن يقيس عرض نهر صغير. فعين الأطوال المبيّنة في الشكل أدناه.



العرض التقريري للنهر هو:


7ft C

8ft D

40.5ft A

6ft B

(2) أوجد قيمة x في الشكل أدناه؟



8 C

10 D

5 A

7 B

(3) إذا كان $EG = 15m$ ، فما طول \overline{EF} ؟



10m C

12m D

6m A

9m B

إرشادات للاختبار


السؤال 2: عين مثلثين متباينين، واتب تناصباً وحله لإيجاد قيمة x .

أسئلة ذات إجابات قصيرة

اكتب إجابتك في ورقة الإجابة.

- 8) هندسة إحداثية :** مثل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي $ABCD$ الذي رؤوسه: $A(3, 3), B(8, 2), C(6, -1), D(1, 0)$ وحدد ما إذا كان متوازي أضلاع أم لا.


- 9) إذا كان $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$ في المثلث أدناه، فأوجد قيمة x .**



أسئلة ذات إجابات مطولة

اكتب إجابتك في ورقة الإجابة مبيناً خطوات الحل.

- 15) استعمل الشكل أدناه للإجابة عن كل من الأسئلة الآتية:**



- a) إذا كان $\overline{XY} \parallel \overline{QR}$ ، فما العلاقة بين الأطوال:

? RZ, YR, QZ, XQ

- b) إذا كان: $\overline{QR} \parallel \overline{XY}, XQ = 15, QZ = 12, YR = 20$


فما طول \overline{RZ}

- c) إذا كان: $\overline{QR} \parallel \overline{XY}, XQ = QZ, QR = 9.5$

فما طول \overline{XY}

- 11) ما المعاكس الإيجابي للعبارة أدناه؟**

إذا كان صالح مولوداً في الرياض،
فإنّه مولود في السعودية.



هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟

إذا لم تستطع الإجابة عن السؤال..

فعد إلى الدرس..

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
2-3	مهارة سابقة	2-1	2-4	مهارة سابقة	1-5	2-3	1-3	2-1	مهارة سابقة	1-1	1-4	مهارة سابقة	2-2	2-2	

التحوييلات الهندسية والتماثل

Transformations and Symmetry



فيما سبق:

درست التحوييلات الهندسية:
الانعكاس والإزاحة والدوران.

والآن:

- رسم صور أشكال بالانعكاس أو الانسحاب أو الدوران أو التمدد.
- أتعرف تركيب تحويلين هندسيين.
- أتعرف التماثل في الأشكال الثنائية الأبعاد والثلاثية الأبعاد.

لماذا؟


تصوير: يستعمل المصوروون الانعكاس والدوران والتماثل؛ لجعل الصورة مثيرة للاهتمام وجذابة بصرياً.

المطويات


منظم أفكار

التحوييلات الهندسية والتماثل: اعمل هذه المطوية؛ لمساعدتك على تنظيم ملاحظاتك حول الفصل 3 ، مبتدئاً بأربع أوراق A4.

4 ضع عنواناً لكل جيب كما في الشكل أدناه، استعمل أوراقاً أو بطاقات لتسجيل الملاحظات والأمثلة وخصص الجيب الأخير لمفردات الجديدة.



3 أقصِّ الأوراق ثم اطْوُها جنباً إلى جنب على طول خط الطيّ، لتكون كتيباً كما في الشكل أدناه.



2 ابْطِّلْ ورقة من المنتصف.

1 اطْوِ كل ورقة من المنتصف.





التهيئة للفصل 3


تشخيص الاستعداد :

أجب عن الاختبار الآتي. انظر المراجعة السريعة قبل الإجابة عن الاختبار.

اختبار سريع

مراجعة سريعة

مثال 1



صنف التحويل الهندسي المبين في الشكل المجاور إلى انعكاس أو إزاحة أو دوران.

يعد كل رأس وصورته بعد نفسه عن المحور z ، ولذلك فهذا التحويل انعكاس.

مثال 2

وقف مقدم استعراض رياضي عند النقطة (1, 4)، وتحرك منها 4 وحدات إلى اليمين، ثم 3 وحدات إلى أسفل. ما إحداثيات النقطة التي وصل إليها؟

يمكن التعبير عن حركة 4 وحدات إلى اليمين، ثم 3 وحدات إلى أسفل بالقاعدة:

$$(x, y) \rightarrow (x+4, y-3)$$

$$(1, 4) \rightarrow (1+4, 4-3) = (5, 1)$$


مثال 3

عمل خالد نموذجاً مصغرًا للجسر. أوجد مقياس الرسم للنموذج، إذا كان طول النموذج 2 m ، وطول الجسر 120 m

طول النموذج يساوي 2 m ، وطول الجسر يساوي 120 m ؛

إذن مقياس رسم النموذج إلى الجسر $\frac{1}{60}$ ؛ أي $\frac{2 \text{ m}}{120 \text{ m}}$

صنف كلاً من التحويلات الهندسية الآتية إلى انعكاس أو إزاحة أو دوران مستعملًا الشكل المجاور.



(1) B إلى A

(2) A إلى D

(3) C إلى A

(4) **هندسة احداثية**: إحداثيات رؤوس $\triangle PQR$ هي

$\triangle PQR . P(-4,2), Q(3,0), R(4, 3)$. إذا أزبح

4 وحدات إلى أسفل و 6 وحدات إلى اليمين للحصول على' $\triangle P'Q'R'$ ، فما إحداثيات رؤوس' $\triangle P'Q'R'$ ؟

استعمل صيغة المسافة بين نقطتين لإيجاد البعد بين كل نقطتين فيما يلي :

(5) $(-2,0) , (3,3) \quad (6) \quad (0,1) , (2,8)$

(7) $(-3, -1), (0, 5) \quad (8) \quad (6, 4), (2, 1)$

(9) **تصوير**: رسم أسعد صورةً مكبرةً لنملة؛ لاستعمالها في

درس العلوم، أوجد مقياس الرسم للصورة إذا كان طول

النملة الحقيقي $\frac{1}{2} \text{ in}$ ، وكان طول الصورة 1 ft

احسب طول كل ضلع من أضلاع الشكل الرباعي $EFGH$.



الانعكاس

Reflection

3-1



رابط المدرس الرقمي



www.ien.edu.sa



لماذا؟

تُظهر المسطحات المائية انعكاسات رائعة لما يحيط بها. ففي مسطحات الماء الراكدة، تلاحظ أن لكل نقطة فوق سطح الماء نقطة مناظرة لها تحته، هي صورتها الناتجة عن الانعكاس. وتكون المسافة بين النقطة الأصلية وسطح الماء متساوية للمسافة بين صورتها وسطح الماء.

فيما سبق:

درست الانعكاس بوصفه تحويلاً هندسياً.

(مهارة سابقة)

والآن:

■ أرسم الصورة الناتجة عن الانعكاس.

■ أرسم الصورة الناتجة عن الانعكاس في المستوى الإحداثي.

المفردات:

الانعكاس
reflection

محور الانعكاس
line of reflection

أضف إلى مطويتك

مفهوم أساسى

الانعكاس حول مستقيم

- الانعكاس حول مستقيم ينقل النقطة إلى صورتها كما يأتي:
- إذا كانت النقطة واقعة على محور الانعكاس، فإن صورتها هي النقطة نفسها.
 - إذا كانت النقطة غير واقعة على محور الانعكاس، يكون محور الانعكاس هو العمود المنصف لقطعة المستقيمة التي تصل بين النقطة وصورتها.
- الرموز "A", "A'", "A''" تمثل أسماء للنقاط الناتجة عن تحويل هندسي أو أكثر للنقطة A لا تقع على المستقيم K.

لرسم صورة مضلع بالانعكاس حول مستقيم، ارسم صورة كل رأس من رؤوسه، ثم صل بين صور الرؤوس لتكوين صورة المضلع بهذا الانعكاس.

رسم صورة مضلع بالانعكاس حول مستقيم

مثال 1

ارسم صورة الشكل بالانعكاس حول المستقيم المعطى.

الخطوة 1: ارسم مستقيماً يمثّل بكل رأس من رؤوس المثلث،

ويكون عمودياً على المستقيم K باستعمال مثلث الرسم.





الخطوة 2: قس المسافة بين النقطة A والمستقيم K باستعمال الفرجار، وعين

النقطة A'؛ بحيث يكون المستقيم K العمود المنصف لـ AA'.

الخطوة 3: كرر الخطوة 2 لتعيين B' و C'، ثم صل الرؤوس

A', B', C' لتشكل صورة المثلث الناتجة عن الانعكاس.


تحقق من فهمك ارسم صورة الشكل بالانعكاس حول المستقيم المعطى في كل شكل مما يأتي:



(1C)

(1B)

(1A)



إرشادات للدراسة

الشكل الأصلي والصورة:


سيكون الشكل الأصلي في هذا الكتاب باللون الأزرق دائمًا، وستكون الصورة باللون الأخضر.

إرشادات للدراسة

تحويل التطابق:

هو تحويل تكون فيه الصورة مطابقة للشكل الأصلي.


مثال 2 من واقع الحياة



تسوق: اصطحب أحمد صديقه علياً في سيارته إلى السوق، حيث يرغب أحمد في الاتجاه إلى المتجر B ؛ لشراء بعض الملابس، بينما يرغب علي في الاتجاه إلى المتجر G ؛ لشراء حذاء، ففي أي مكان من المواقف المحددة على المستقيم s يوقف أحمد سيارته، بحيث تكون المسافة التي سيقطعانها سيراً للوصول إلى المتجرين أقل ما يمكن؟

افهم: أوقف أحمد سيارته في الموقف P على المستقيم s .
اتجه أحمد إلى المتجر B لشراء بعض الملابس.
واتجه علي إلى المتجر G لشراء حذاء.


المطلوب: حدد الموقف P على المستقيم s ، بحيث يكون $BP + PG$ أقل ما يمكن.
تكون المسافة الكلية من B إلى P ثم من P إلى G أقل ما يمكن، عندما تكون هذه النقاط على استقامة واحدة.



خطط: ارسم $\overline{B'G}$. وعيّن P عند تقاطع المستقيم s مع $\overline{B'G}$.
علمًا بأن B' هي صورة النقطة B الناتجة عن انعكاس حول المستقيم s .

تحقق: اختر موقع آخر للنقطة P على المستقيم s ، وقارن مجموع $BP + PG$ في كل حالة؛ للتحقق من أن الموقع الذي تم تحديده للنقطة P هو الذي يجعل هذا المجموع أقل ما يمكن.

تحقق من فهتمك



(2) **مبيعات تذاكر:** يريد فهد أن يختار موقعًا مناسبًا لبيع تذاكر مباراة كرة قدم، عيّن النقطة P على الحائط، بحيث تكون المسافة التي يسيرها شخصٌ ما من النقطة A إلى P ثم إلى B أقل ما يمكن.


رسم الانعكاس في المستوى الإحداثي: يمكن أيضًا رسم الصورة الناتجة عن الانعكاس في المستوى الإحداثي حول مستقيم أفقي أو مستقيم رأسي.

رسم صورة بالانعكاس حول مستقيم أفقي أو مستقيم رأسي

مثال 3



مثل بيانياً $\triangle JKL$ الذي إحداثيات رؤوسه: $J(0, 3)$, $K(-2, -1)$, $L(-6, 1)$.
ثم ارسم صورته بالانعكاس حول المستقيم المعطى في كلٍ مما يأتي:
 $y = 2$ (a) $x = -4$ (b)

استعمل خطوط الشبكة الإحداثية لإيجاد النقطة المناظرة لكل رأس، بحيث يكون المستقيم $y = 2$ هو المنصف العمودي للقطعة المستقيمة التي تصل بين كل رأس وصوريته.



إرشادات للدراسة

خصائص الانعكاس:
يحافظ الانعكاس على الأبعاد وقياسات الزوايا والاستقامة وترتيب مواقع النقاط، ولكن يعكس الاتجاه.



تحقق من فهمك

مثل بيانياً شبه المنحرف $RSTV$, الذي إحداثيات رؤوسه هي: $R(-1, 1), S(4, 1), T(4, -1), V(-1, -3)$:
وارسم صورته بالانعكاس حول المستقيم المُعطى في كلٍ مما يأتي:

$$x = 2 \quad (3B)$$

$$y = -3 \quad (3A)$$

يمكنك استعمال القاعدة الآتية، عندما يكون محور الانعكاس هو المحور x أو المحور y .


مفهوم أساسٍ	
الانعكاس حول المحور x أو المحور y	الانعكاس حول المحور x
<p>التعبير اللغطي: لتعيين صورة نقطة بالانعكاس حول المحور y، اضرب إحداثي x لها في -1</p> $(x, y) \rightarrow (-x, y)$ <p>الرموز: مثال:</p>	<p>التعبير اللغطي: لتعيين صورة نقطة بالانعكاس حول المحور x، اضرب إحداثي y لها في -1</p> $(x, y) \rightarrow (x, -y)$ <p>الرموز: مثال:</p>

قراءة الرياضيات


التعبير عن الدالة
بالصيغة الإحداثية:
يمكن قراءة العبارة:
 $P(a, b) \rightarrow P'(a, -b)$
على النحو الآتي:
تحوّل النقطة P التي
إحداثياتها a و b إلى
النقطة P' شرطة التي
إحداثياتها a وساب b .

مثال 4 رسم صورة بالانعكاس حول المحور x أو المحور y

مثل كل شكل مما يأتي بيانياً، ثم ارسم صورته بالانعكاس المحدد.
الذي إحداثيات رؤوسه: $\triangle ABC$ (a) $A(-5, 3), B(2, 0), C(1, 2)$ بالانعكاس حول المحور x .



(b) متوازي الأضلاع $PQRS$ الذي إحداثيات رؤوسه: $P(-4, 1), Q(2, 3), R(2, -1), S(-4, -3)$:
بالانعكاس حول المحور y .



اضرب الإحداثي y لكل رأس في -1 .

$$\begin{aligned} (x, y) &\rightarrow (x, -y) \\ A(-5, 3) &\rightarrow A'(-5, -3) \\ B(2, 0) &\rightarrow B'(2, 0) \\ C(1, 2) &\rightarrow C'(1, -2) \end{aligned}$$

اضرب الإحداثي x لكل نقطة في -1 .

$$\begin{aligned} (x, y) &\rightarrow (-x, y) \\ P(-4, 1) &\rightarrow P'(4, 1) \\ Q(2, 3) &\rightarrow Q'(-2, 3) \\ R(2, -1) &\rightarrow R'(-2, -1) \\ S(-4, -3) &\rightarrow S'(4, -3) \end{aligned}$$

إرشادات للدراسة

النقطات الثابتة:
تسمى النقطة B في
المثال 4a نقطة ثابتة؛
لأنها اقترنت مع نفسها،
وأن إحداثياتها هما نفس
إحداثيات صورتها B'
بالانعكاس، فالنقطات
الواقعة على محور
الانعكاس هي فقط التي
تبقي ثابتة تحت تأثير
الانعكاس.

(4A) المستطيل الذي إحداثيات رؤوسه: $E(-4, -1), F(2, 2), G(3, 0), H(-3, -3)$:
بالانعكاس حول المحور x .

(4B) المثلث الذي إحداثيات رؤوسه: $J(3, 2), K(2, -2), L(4, -5)$:
بالانعكاس حول المحور y .

مراجعة المفردات

المستقيمات

المتعامدة:

يكون المستقيمان غير الرأسين متعامدين، إذا


و فقط إذا كان ناتج ضرب

مليهما يساوي 1

مثال: المستقيمات

الأفقيه والرأسية تكون

متعامدة دائمًا.




ويمكن أيضًا أن تعكس شكلًا حول المستقيم $y = x$ ، ففي المستوى الإحداثي المجاور، ارسم عموداً من النقطة C على المستقيم x ، $y = x$ ، بحيث إن ميل المستقيم $y = x$ يساوي 1 ، فإن ميل العمود الذي رسمته يساوي -1 ، لاحظ أنك تحركت من النقطة $C(-3, 2)$ بمقدار 2.5 وحدة إلى اليمين و 2.5 وحدة إلى أسفل فوصلت إلى نقطة تقاطع العمود الذي رسمته مع المستقيم x .

ومن هذه النقطة على $x = y$ ، تحرك 2.5 وحدة إلى اليمين و 2.5 وحدة إلى أسفل؛ لتعين النقطة $(-3, 2)$ التي هي صورة النقطة C بالانعكاس حول المستقيم $x = y$. وبطريقة مماثلة نجد أن صورة $(-1, -3)$ هي $(3, -1)$.

وبمقارنة إحداثيات هاتين النقطتين بإحداثيات صوريتهما، يمكن الوصول إلى القاعدة الآتية للانعكاس حول المستقيم $x = y$.

مفهوم أساسى

الانعكاس حول المستقيم $y = x$



مثال: التعبير اللغطي: لتعيين صورة نقطة بالانعكاس حول المستقيم $y = x$ ، بدل موضع الإحداثيين x و y .

الرموز: $(x, y) \rightarrow (y, x)$


رسم صورة شكل بالانعكاس حول المستقيم $y = x$

مثال 5

مثل بيانياً الشكل الرباعي $JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه هي: $J(2, 2)$ ، $K(4, 1)$ ، $L(3, -3)$ ، $M(0, -4)$. ثم ارسم صورته $J'K'L'M'$ بالانعكاس حول المستقيم $y = x$ بدل الإحداثيين x و y لكل الرؤوس.

(x, y)	\rightarrow	(y, x)
$J(2, 2)$	\rightarrow	$J'(2, 2)$
$K(4, 1)$	\rightarrow	$K'(1, 4)$
$L(3, -3)$	\rightarrow	$L'(-3, 3)$
$M(0, -4)$	\rightarrow	$M'(-4, 0)$

تحقق من فهمك



5) مثل بيانياً $\triangle BCD$ الذي إحداثيات رؤوسه هي: $B(-3, 3)$ ، $C(1, 4)$ ، $D(-2, -4)$. ثم ارسم صورته بالانعكاس حول المستقيم $y = x$.


ملخص المفهوم

الانعكاس في المستوى الإحداثي


أضف إلى

مطويتك


الانعكاس حول المستقيم $y = x$






الانعكاس حول المحور y




الانعكاس حول المحور x



المثال 1 ارسم صورة كل شكل مما يأتي بالانعكاس حول المستقيم المعطى:



المثال 2 (4) **مباريات:** يتضرر ماجد في المطعم صديقاً سيأتيه بذكرة لحضور مباراة في الصالة الرياضية. في أي موقع على الشارع، يجب أن يوقف صديقه سيارته، حتى تكون المسافة التي يسيراها ماجد من المطعم إلى السيارة ثم إلى مدخل الصالة الرياضية أقل ما يمكن؟ ارسم شكلًا يوضح إجابتك.



مثل بيانياً صورة $\triangle ABC$ المبين جانباً بالانعكاس حول المستقيم المعطى في كلٍّ من السؤالين 5، 6، 7.

$$x = 3 \quad (6)$$

$$y = -2 \quad (5)$$

مثل كل شكل مما يأتي بيانياً، ثم ارسم صورته بالانعكاس المحدد.
7) $\triangle XYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه هي: $(0, 4)$, $(-3, 4)$, $(-4, -1)$ بالانعكاس حول المحور y .

8) $\square QRST$ الذي إحداثيات رؤوسه: $(-1, 4)$, $(4, 4)$, $(3, 1)$, $(-2, 1)$ بالانعكاس حول المحور x .




9) الشكل الرباعي الذي إحداثيات رؤوسه: $(-3, 1)$, $(-1, 3)$, $(1, 3)$, $(-3, -1)$ بالانعكاس حول المستقيم $x = y$.


المثال 3

المثالان 4، 5

تدريب وحل المسائل


المثال 1 ارسم صورة كل شكل مما يأتي بالانعكاس حول المستقيم المعطى.






المثال 2 (13) **كرة قدم:** عندما ترتطم كرة بحائط فإنها ترتد عنه وتحرك في مسار نصف مستقيم يمثل انعكاس مسار حركتها لو أنها اخترقت الحائط كما هو موضح جانبًا.

استعمل هذه المعلومات في رسم شكل يبين الموقع الدقيق للنقطة P على الحائط التي يجب أن يصوب سليمان إليها الكرة إذا كان يشارك في مباراة كرة قدم في ملعب داخلي، ويريد أن يمرر الكرة إلى صديقه يوسف عند النقطة C ، متجنباً لاعباً من الفريق الخصم عند النقطة B ، ولذلك قرر أن يركل الكرة من النقطة A إلى نقطة على الحائط الجانبي، بحيث ترتد عنه نحو النقطة C .




مثل كل شكل مما يأتي بياناً بالانعكاس حول المستقيم المعطى .




$$WXYZ, y = -4 \quad (16)$$

$$WXYZ; x = -2 \quad (19)$$



$$JKLM, x = 1 \quad (15)$$

$$JKLM, y = 4 \quad (18)$$



$$\triangle ABC, y = 3 \quad (14)$$

$$\triangle ABC, x = -1 \quad (17)$$

مثل كل شكل مما يأتي بياناً، ثم ارسم صورته بالانعكاس المحدد .


(20) المستطيل $ABCD$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(-5, 2), B(1, 2), C(1, -1), D(-5, -1)$ بالانعكاس حول المستقيم $y = -2$. $y = -2$

(21) المربع $JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه: $J(-4, 6), K(0, 6), L(0, 2), M(-4, 2)$ بالانعكاس حول المحور y .

(22) $\triangle FGH$ الذي إحداثيات رؤوسه: $F(-3, 2), G(-4, -1), H(-6, -1)$ بالانعكاس حول المستقيم $x = y$.

(23) $\square WXYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه: $W(2, 3), X(7, 3), Y(6, -1), Z(1, -1)$ بالانعكاس حول المحور x .

يُبيّن كُلٌّ من الأشكال الآتية مضلعًا وصورته بالانعكاس حول مستقيم ما، ارسم محور الانعكاس في كُلٍ منها.



(24)



(25)



(26)

المثالان 4, 5



الربط مع الحياة

يلقط المصورون الصور لأغراض متعددة، مثل الصحافة أو لأغراض علمية، ويطلب العمل في بعض مجالات التصوير مثل التصوير الصحفي أو التصوير العلمي تدريجياً خاصاً.

(27) **تصوير:** ارسم صورة الجسر الموضح في الصورة المجاورة بالانعكاس في الماء.





جبر: مثل بيانياً المستقيم $3 - 2x = y$ وصورته بالانعكاس حول المستقيم المعطى في كلٌ مما يأتي، ثم اكتب معادلة المستقيم الناتج عن الانعكاس

(30) المستقيم $y = x$

(29) المحور y

(28) المحور x

(31) مثل بيانياً صورة $\triangle CDE$ المبين أدناه بالانعكاس حول المستقيم $y = 3x$.
مُحْدِبًاً، وتبقى أطوال أضلاعه كما هي دون تغيير.






جبر: مثل بيانياً صورة كلٌ من الدوال الآتية بالانعكاس حول المحور المحدد، ثم اكتب معادلة الصورة الناتجة عن الانعكاس.

(35) المحور x

(34) المحور y

(33) المحور x



(36) **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة ستنقصي الانعكاس حول نقطة الأصل.

(a) **هندسيّاً:** ارسم المثلث $\triangle ABC$ في المستوى الإحداثي، بحيث تكون إحداثيات رؤوسه أعداداً صحيحة موجبة.

(b) **بيانياً:** عَيّن النقاط A', B', C' الناتجة عن الانعكاس، بحيث تكون النقطة الأصلية وصورتها ونقطة الأصل على استقامةٍ واحدةٍ، وتكون النقطة الأصلية وصورتها على بعدٍ نفسه من نقطة الأصل.

(c) **جدولياً:** انقل الجدول الآتي وأكمله.

الإحداثيات	$\triangle ABC$		$\triangle A'B'C'$	
	A		A'	
	B		B'	
C		C'		

(d) **لُفظياً:** ضع تخميناً حول العلاقة بين إحداثيات الرؤوس المتناظرة لشكلٍ وصورته الناتجة عن انعكاسه حول نقطة الأصل.

مسائل مهارات التفكير العليا

(37) **اكتشف الخطأ:** يجد جميل وإبراهيم إحداثيات صورة النقطة $C(2, 3)$ الناتجة عن انعكاس حول المحور x ، أيٌّ منها إجابته صحيحة؟ وضح إجابتك.



إبراهيم

$C'(-2, 3)$

جميل

$C'(2, -3)$

(38) **مسألة مفتوحة:** ارسم مضلعاً في المستوى الإحداثي، بحيث تكون صورته الناتجة عن انعكاس حول المحور x منطبقةً عليه تماماً.

(39) **مسألة مفتوحة:** ارسم شكلًا في المستوى الإحداثي، يكون اتجاه صورته الناتجة عن الانعكاس حول المستقيم $y = 1$ مماثلاً لاتجاه الشكل نفسه. وضح الشروط التي يجب توافرها لتحقيق هذا الأمر.

(40) **تحدي:** إذا كانت صورة النقطة $A(4, 3)$ بعد الانعكاس حول مستقيم معين هي $A'(-1, 0)$ ، فأوجد معادلة محور الانعكاس. وضح إجابتك.

(41) **تبرير:** هل تقع صورة نقطة بالانعكاس حول مستقيم ما في الجهة الثانية من هذا المستقيم دائمًا أم أحياناً لا تقع فيها أبداً؟


(42) **اكتب:** تقع النقاط P, Q, R على استقامةٍ واحدةٍ حيث أن Q واقعة بين P و R . باستعمال الهندسة الإحداثية، أثبت أن انعكاس هذه النقاط حول مستقيم يحافظ على الاستقامة وترتيب موقع النقاط.

تدريب على اختبار

(44) إحداثيات النقطتين A, B في المستوى الإحداثي هي $AB = -2, 4), (3, 3)$ على الترتيب، احسب.


- (1, 7) **A**
- $\sqrt{26}$ **B**
- $(5, -1)$ **C**
- $\sqrt{50}$ **D**

(43) **إجابة قصيرة:** إذا كانت صورة الشكل الرباعي $WXYZ$ الناتجة عن انعكاسه حول المحور y هي $W'X'Y'Z'$ ، فما إحداثيات X' ؟



مراجعة تراكمية

(45) **هندسة إحداثية:** في $\triangle LMN$ ، \overline{PR} تقسم الضلعين MN ، LN إلى قطع مستقيمة متناظرة أطولها متناسبة، إذا كانت $\frac{LP}{PN} = \frac{2}{1}$ وكانت $RN = 3$ ، فأوجد MR . ([الدرس 3](#))



استعمل الشكل المجاور لتكتب متباعدةً تصف العلاقة بين قياسي الزاويتين أو طولي القطعتين المستقيمتين في كلٌ مما يأتي. ([مهارة سابقة](#))

$$m\angle BDC, m\angle FDB \quad (46)$$

$$m\angle FBA, m\angle DBF \quad (47)$$

استعد للدرس اللاحق

(48) إحداثيات طرفي \overline{AB} هما $A(5, 4)$ ، $B(3, -1)$ ، تحركت كلٌ من هاتين النقطتين 3 وحداتٍ إلى اليمين و5 وحداتٍ إلى أسفل، فكانت مواقعهما الجديدة A', B' على الترتيب.

a) اكتب قاعدة هذا التحويل الهندسي.

b) أوجد إحداثيات A', B' .

c) أوجد طول كلٌ من \overline{AB} ، $\overline{A'B'}$.



الإزاحة (الانسحاب)

Translation

3-2

لماذا؟

فيما سبق:

درست الانسحاب بوصفه تحويلاً هندسياً.

(مهارة سابقة)


والآن:

رسم الصور الناتجة عن الإزاحة.

رسم الصور الناتجة عن الإزاحة في المستوى الإحداثي.

المفردات:

الانسحاب
translation



تُفتح بعض الاحتفالات الوطنية بعروض عسكرية تزيد بها بهجة وبهاءً. ومعظم حركات أعضاء تلك الفرق العسكرية تمثل ما يُعرف في الهندسة بالإزاحة أو الانسحاب.

رسم الإزاحة (الانسحاب): تعلم سابقاً أن الانسحاب هو تحويل هندسي ينقل الشكل من موقع إلى آخر من دون تدويره. حيث يتم نقل جميع نقاط الشكل المسافة نفسها وفي الإتجاه نفسه. ويمكن التعبير عن الإزاحة (الانسحاب) لكل نقطة من الشكل بقطعة مستقيمة طولها يساوي $\overline{AA'}$ حيث إن A' هي صورة النقطة A الناتجة عن الإزاحة (الانسحاب).


اضف إلى مطويتك
مفهوم أساسى
الإزاحة (الانسحاب)

تنقل الإزاحة (الانسحاب) كل نقطة إلى صورتها مسافة محددة وفي اتجاه محدد (اتجاه الإزاحة). فالإزاحة التي تنقل النقطة A إلى صورتها A' , تنقل نقاط الشكل جميعها أيضاً بحيث إن:

- مقدار الإزاحة يساوي طول القطعة المستقيمة التي تصل أي نقطة بصورتها يساوي طول $\overline{AA'}$.
- النقطة A' هي صورة النقطة A بالإزاحة.
- القطعة المستقيمة التي تصل أي نقطتين بصورتها توازي $\overline{AA'}$.


مثال 1 رسم الإزاحة في المستوى

رسم صورة الشكل الناتجة عن الإزاحة التي تنقل النقطة A إلى النقطة A' .





الخطوة 1: باستعمال المسطرة ومثلث الرسم، ارسم من كل رأسٍ من رؤوس المثلث XYZ مستقيماً يوازي $\overline{AA'}$.

الخطوة 2: قسْ طول $\overline{AA'}$ ، ثم عِين على المستقيم المار بالرأس X النقطة X' ، التي تبعد عن X في الاتجاه من A إلى A' مسافة $\overline{AA'}$.



الخطوة 3: كرر الخطوة 2 لنعِين Z' ، Y' ، X' ، ثم صل الرؤوس $X' Y' Z'$ لتشكل المثلث الناتج عن الإزاحة.

تحقق من فهمك: ارسم صورة الشكل الناتجة عن الإزاحة التي تنقل النقطة A إلى A'



رسم الإزاحة في المستوى الإحداثي: يمكن رسم الإزاحات في المستوى الإحداثي، إذا علمنا مقدار الإزاحة واتجاهها أفقياً أو رأسياً، فإذا رمزنا للمسافة الأفقية من النقطة الأصلية إلى صورتها بالرمز a ، وللمسافة الرأسية من النقطة الأصلية إلى صورتها بالرمز b ، فإنه يمكن التعبير عن هذه الإزاحة بالقاعدة: $(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$ ، ويمكن استعمال هذه القاعدة لإجراء إزاحةٍ للشكل في المستوى الإحداثي.

مفهوم أساسى

الإزاحة في المستوى الإحداثي

التعبير اللغطي: إزاحة نقطة ما مسافة a وحدة أفقياً، و b وحدة رأسياً، أجمع a إلى الإحداثي x ، و b إلى الإحداثي y .

الرموز: $(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$

مثال: إذا كانت: $a = 7$, $b = 4$, فإن صورة النقطة $P(-2, 3)$ الناتجة عن هذه الإزاحة هي $P'(5, 7)$.


قراءة الرياضيات

الإزاحة الأفقية، **والإزاحة الرأسية**:
عندما يكون $b = 0$ تكون الإزاحة أفقية فقط.
وعندما يكون $a = 0$ تكون الإزاحة رأسية فقط.

مثال 2 الإزاحة في المستوى الإحداثي

مثل الشكل وصورته الناتجة عن الإزاحة المحددة في كلٌ مما يأتي بيانياً:

(a) $\triangle EFG$ الذي إحداثيات رؤوسه هي: $E(-7, -1)$, $F(-4, -4)$, $G(-3, -1)$ ، أُزِّيَّح وفق القاعدة




$$(x, y) \rightarrow (x + 2, y + 5)$$

تدل هذه القاعدة على إزاحة مقدارها وحدتان إلى اليمين و 5 وحدات إلى أعلى.

$$\begin{aligned} (x, y) &\rightarrow (x + 2, y + 5) \\ E(-7, -1) &\rightarrow E'(-5, 4) \\ F(-4, -4) &\rightarrow F'(-2, 1) \\ G(-3, -1) &\rightarrow G'(-1, 4) \end{aligned}$$

(b) المربع $JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه: $J(3, 4)$, $K(5, 2)$, $L(7, 4)$, $M(5, 6)$ ، أُزِّيَّح وفق القاعدة



$$(x, y) \rightarrow (x - 3, y - 4)$$

تدل هذه القاعدة على إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليسار و 4 وحدات إلى أسفل.

$$\begin{aligned} (x, y) &\rightarrow (x - 3, y - 4) \\ J(3, 4) &\rightarrow J'(0, 0) \\ K(5, 2) &\rightarrow K'(2, -2) \\ L(7, 4) &\rightarrow L'(4, 0) \\ M(5, 6) &\rightarrow M'(2, 2) \end{aligned}$$

تحقق من فهمك

(2A) $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(2, 6)$, $B(1, 1)$, $C(7, 5)$ ، أُزِّيَّح وفق القاعدة

$$(x, y) \rightarrow (x - 4, y - 1)$$

(2B) الشكل الرباعي $QRST$ الذي إحداثيات رؤوسه: $Q(-8, -2)$, $R(-9, -5)$, $S(-4, -7)$, $T(-4, -2)$ ، أُزِّيَّح وفق القاعدة

$$(x, y) \rightarrow (x + 7, y + 1)$$


إرشادات للدراسة

الإشارة السالبة:
إشارة a السالبة تعني أن الإزاحة إلى اليسار، وإشارة b السالبة تعني أن الإزاحة إلى أسفل.



مثال 3 من واقع الحياة وصف الإزاحة

استعراض: في استعراض لفرقة عسكرية، يسير الأفراد من الموقع 1 إلى الموقع 2 ثم إلى الموقع 3 وكل وحدة على الشبكة تمثل خطوةً واحدةً.



ارشادات للدراسة

تحويلات التطابق:
الإزاحة هي تحويل
تطابق أيضًا، فهي
تحافظ على الأبعاد
وقياسات الزوايا
وترتيب مواقع النقاط
والاستقامة.

a) اكتب قاعدة لحركة أفراد الفرقة العسكرية عند انتقالهم من الموقع 1 إلى الموقع 2 ثم صنفها لفظيًّا.

إحدى النقاط في الموقع 1 عند $(14, 8)$ ، وتحركت هذه النقطة إلى $(2, 8)$ في الموقع 2، استعمل قاعدة الإزاحة $(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$ لكتابة معادلتين وحلّهما لإيجاد قيمة كلٍ من a, b .

$$(14 + a, 8 + b) = (2, 8)$$

$$8 + b = 8 \quad 14 + a = 2$$

$$b = 0 \quad a = -12$$

إذن قاعدة هذه الإزاحة هي :

أي أن كلاً من أفراد الفرقة العسكرية تحرك 12 خطوةً إلى اليسار، ولم يتحرك أي خطوةٌ إلى الأمام أو إلى الخلف في أثناء انتقاله من الموقع 1 إلى الموقع 2

b) صِفْ حركة أفراد الفرقة العسكرية عند انتقالهم من الموقع 1 إلى الموقع 3 باستعمال قاعدة الإزاحة.


$$(14 + a, 8 + b) = (2, -1)$$

$$8 + b = -1 \quad 14 + a = 2$$

$$b = -9 \quad a = -12$$

إذن قاعدة هذه الإزاحة هي : $(x, y) \rightarrow (x - 12, y - 9)$

تحقق من فهمك






3) **نقود:** تم تصوير حركة قطعة نقود في موقع مختلفة على المستوى الإحداثي.

(A) صِفْ حركة القطعة عند انتقالها من الموقع A إلى الموقع B لفظيًّا.

(B) صِفْ حركة القطعة عند انتقالها من الموقع A إلى الموقع C باستعمال قاعدة الإزاحة.

المثال 1

رسم صورة الشكل الناتجة عن الإزاحة التي تنقل النقطة A إلى النقطة A' في كلٍ مما يأتي:



المثال 2

مثل الشكل وصوريه الناتجه عن الإزاحة المحددة في كلٍ مما يأتي بيانياً:

- (4) شبه المنحرف $JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه: $J(2, 4), K(1, 1), L(5, 1), M(4, 4)$ ، أزيح وفق القاعدة


$$(x, y) \rightarrow (x + 7, y + 1)$$

- (5) $\triangle DFG$ الذي إحداثيات رؤوسه: $D(-8, 8), F(-10, 4), G(-7, 6)$ ، أزيح وفق القاعدة

$$(x, y) \rightarrow (x + 5, y - 2)$$

- (6) متوازي الأضلاع $WXYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه: $W(-6, -5), X(-2, -5), Y(-1, -8), Z(-5, -8)$

$$\text{أزيح وفق القاعدة } (x, y) \rightarrow (x - 1, y + 4)$$






المثال 3

(7) **ألعاب فيديو:** إن هدف اللعبة المجاورة هو تحريك القطع الملونة إلى اليمين أو اليسار، عندما تنزل من أعلى الشاشة لملء كل صفح دون ترك فراغاتٍ فيه. إذا كان الموقع الابتدائي للقطعة في أعلى الشاشة (x, y) ، فاكتب قاعدةً لوصف الانسحاب الذي يملاً الصفح المشار إليه بالسهم.

تدريب وحل المسائل

رسم صورة الشكل الناتجة عن الإزاحة التي تنقل النقطة A إلى النقطة A' في كلٍ مما يأتي:



مثل الشكل وصوريه الناتجه عن الإزاحة المحددة في كلٍ مما يأتي بيانياً:

- (11) $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(1, 6), B(3, 2), C(4, 7)$ ، أزيح وفق القاعدة


$$(x, y) \rightarrow (x + 4, y - 1)$$

- (12) المستطيل $QRST$ الذي إحداثيات رؤوسه: $Q(-8, 4), R(-8, 2), S(-3, 2), T(-3, 4)$

$$\text{أزيح وفق القاعدة } (x, y) \rightarrow (x + 2, y + 3)$$

- (13) الشكل الرباعي $FGHJ$ الذي إحداثيات رؤوسه: $F(-4, -2), G(-1, -1), H(0, -4), J(-3, -6)$

$$\text{أزيح وفق القاعدة } (x, y) \rightarrow (x - 3, y - 6)$$



المثال 1

المثال 2


المثال 3

(14) **موقع:** تبين الشبكة المجاورة بعض المواقع في الحي الذي يقطنه سعيد.


a) إذا غادر سعيد منزله، وانتقل 4 وحدات إلى الشمال و 3 وحدات إلى الشرق، فأين يصل؟

b) صِف لفظياً إزاحتين تنقلان سعيد من المدرسة إلى منزله.

اكتب قاعدة الإزاحة التي تنقل الشكل الأزرق إلى الشكل الأخضر في كلٌ من السؤالين الآتيين.





(16)




(15)


جبر: مثل بيانياً صورة كلٌ من الدالتين الآتتين الناتجة عن الإزاحة المعطاة، ثم اكتب معادلة هذه الصورة.
 $(x, y) \rightarrow (x - 2, y)$ (18) $(x, y) \rightarrow (x + 4, y + 1)$ (17)



تضاريس: طول منحدر تلة من قمتها حتى أسفلها 125 m، وقياس الزاوية التي يصعها مع المستقيم الرأسى 53° ، إذا كان موقع منصور عند قمة التلة (y, x) ، فاكتب قاعدة الإزاحة التي تمثل انتقاله إلى أسفل التلة.



(20) **تمثيلات متعددة:** سُتستقصي في هذه المسألة نتيجة انعكاسين حول مستقيمين رأسين.



a) **هندسياً:** ارسم على ورق شفاف $\triangle ABC$ ، والمستقيمين الرأسين m, l ، وارسم صورة $\triangle ABC$ الناتجة عن الانعكاس حول المستقيم l ، بطيء الورقة على امتداد المستقيم l وسم هذه الصورة $\triangle A'B'C'$ ، ثم ارسم صورة $\triangle A'B'C'$ الناتجة عن الانعكاس حول المستقيم m ، بطيء الورقة على امتداد المستقيم m ، وسم هذه الصورة $\triangle A''B''C''$.

b) **هندسياً:** كرر العملية التي نفذتها في الفرع a لرسم صورة $\triangle DEF$ الناتجة عن انعكاسين متعاقبين حول المستقيمين الرأسين p, q ، وصورة $\triangle MNP$ n, r ، صورة $\triangle MNP$ الناتجة عن انعكاسين متعاقبين حول المستقيمين الرأسين r, t .

c) **جدولياً:** انسخ الجدول الآتي وأكمله.

المسافة بين النقاط المتناظرة(cm)	المسافة بين المستقيمين الرأسين(cm)
C', B', A' و C, B, A	l, m
F', E', D' و F, E, D	n, p
P', N', M' و P, N, M	q, r

d) **لفظياً:** صِف نتائج الانعكاسين حول المستقيمين الرأسين باستعمال الإزاحة.

مسائل مهارات التفكير العليا

(21) **تبرير:** أجريت إزاحةً لشكل ما، وفقاً للقاعدة: $(x, y) \rightarrow (x - 3, y + 8)$ ، ثم إزاحةً أخرى للصورة الناتجة وفقاً للقاعدة: $(x, y) \rightarrow (x + 3, y - 8)$. من دون استعمال الرسم، حدد مكان الشكل النهائي وبرر إجابتك.



إرشادات للدراسة

انسحاب الدالة المتصلة:

عند إجراء تحويل هندسي على دالة متصلة تمثل بخطٍ منحني من دون انقطاع كما في السؤالين 17، 18، تبقى الدالة محافظة على شكلها كما هو الحال في تحويلات التطابق.

قراءة الرياضيات

الشرطتان:

تستعمل الشرطتان للدلالة على أن هذا الرأس صورة ناتجة عن تحويل هندسي ثان.

(22) تحدِّ: أُزيح المستقيم $y = mx + b$ وفق القاعدة $(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$. اكتب معادلة صورته الناتجة عن هذه الإزاحة. ما مقطع المحور للمستقيم الجديد؟

(23) اكتب: تذكر من الدرس السابق أن النقطة الثابتة هي النقطة التي تنطبق صورتها عليها. هل توجد نقاط ثابتة في الإزاحة؟ وضح أسباب وجودها أو أسباب عدم وجودها.


تدريب على اختبار

(25) يحتوي كيس على 5 كرات حمراء وكرتين زرقاء و 4 كرات بيضاء وكرة واحدة صفراء. إذا سُحب من الكيس كرتان على التوالي من دون إرجاع، فما احتمال سحب كرتين بيضاوين؟

- $\frac{5}{33}$ D $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{66}$ A

(26) إجابة قصيرة: ما قاعدة الإزاحة التي تنقل النقطة $A(-2, -8)$ إلى النقطة $A'(3, -5)$ ؟

(24) أوجد صورة النقطة P الناتجة عن الإزاحة: $(x, y) \rightarrow (x + 3, y + 1)$.



- (2, -4) C (0, 6) A
(2, 4) D (0, 3) B


مراجعة تراكمية

مثل كل شكل مما يأتي بيانياً، ثم ارسم صورته بالانعكاس المحدد. (الدرس 1-3)


(27) $\overline{D}\overline{J}$ التي إحداثيات طرفيها $D(4, 4)$, $J(-3, 2)$ ، بالانعكاس حول المحور y .

(28) $\triangle XYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه: $X(0, 0)$, $Y(3, 0)$, $Z(0, 3)$ ، بالانعكاس حول المحور x .

(29) $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(-3, -1)$, $B(0, 2)$, $C(3, -2)$ ، بالانعكاس حول المستقيم $y = x$.



(30) الملاحة الجوية: كان ارتفاع طائرة 3 km فوق سطح البحر عندما بدأت بالارتفاع بزاوية 3.5° ، إذا بقيت هذه الزاوية ثابتة، فكم كيلومتراً يكون ارتفاعها فوق سطح البحر بعد طيرانها مسافة 50 km؟ (مهارة سابقة)



أوجد كلاً من القياسات الآتية مستعملاً $\square JKLM$ المجاور. (الدرس 1-2)

$$m\angle JML \quad (32) \qquad m\angle MJK \quad (31)$$

$$m\angle KJL \quad (34) \qquad m\angle JKL \quad (33)$$

استعد للدرس اللاحق

صنف كلاً من الزوايا الآتية إلى قائمةٍ أو حادةٍ أو منفرجةٍ، ثم استعمل المنقلة لقياس الزاوية إلى أقرب درجةٍ.

$\angle FMD$ (36)	$\angle AMC$ (35)
$\angle CMB$ (38)	$\angle BMD$ (37)



الدوران


Rotations




درست سابقاً التماثل الدوراني حول نقطة، والذي يحرك الشكل حول نقطة ثابتة تسمى مركز الدوران بزاوية معينة وفي اتجاه محدد، وستستعمل الورق الشفاف في هذا النشاط لاستكشاف خصائص الدوران.

نشاط

استكشاف الدوران باستعمال الورق الشفاف



الخطوة 1



الخطوات 2, 3

الخطوة 1: ارسم في قطعة من الورق الشفاف الشكل الرباعي $ABCD$ والنقطة P .


الخطوة 2: انسخ الشكل الرباعي $ABCD$ والنقطة P في قطعة أخرى من الورق الشفاف، وسمّ الشكل الجديد $A'B'C'D'$.

الخطوة 3: ضع الورقتين بحيث تنطبق النقطة P من الأولى على النقطة P من الثانية، ودور الورقتين بحيث لا يكون هناك تداخل بين $ABCD$ و $A'B'C'D'$ ، وألصق الورقتين معاً.

الخطوة 4: قسّي المسافة بين النقطة P وكل رأس من رؤوس الشكلين $ABCD$ و $A'B'C'D'$ ، ثم انقل الجدول الآتي وأكمله.

الشكل الرباعي	الطول			
	AP	BP	CP	DP
ABCD				
$A'B'C'D'$	$A'P$	$B'P$	$C'P$	$D'P$

تمارين:



1) انسخ $\triangle JKL$ الموضح في الشكل المجاور الذي إحداثيات رؤوسه هي: $J(1, 3), K(2, 1), L(3, 4)$ في قطعة من الورق الشفاف ثم أجب عما يأتي:

a) استعمل الورق الشفاف والمنقلة لتدوير كل رأس بزاوية 90° في اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل. ما إحداثيات رؤوس المثلث الناتجة عن الدوران؟

b) استعمل الورق الشفاف والمنقلة لتدوير $\triangle JKL$ بزاوية 180° حول نقطة الأصل. ما إحداثيات رؤوس صورة المثلث الناتجة عن الدوران؟

c) استعمل صيغة المسافة بين نقطتين؛ لإيجاد المسافة بين نقطة الأصل وكل من النقاط J, K, L ، ثم أوجد المسافة بين نقطة الأصل وكل من رؤوس المثلثين " $J'K'L'$, " $J''K''L''$ ".

2) **أكتب:** إذا تم تدوير النقطة $(2, 4)$ في اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل بزاوية 90° ، وبزاوية 180° ، فما التغيير الذي يطرأ على الإحداثي x وعلى الإحداثي y لهذا النقطة في كل حالة؟



3) **تخمين:** ما إحداثياً صورة النقطة (x, y) الناتجة عن دوران بزاوية 270° في اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل؟

4) **تخمين:** اكتب تخميناً حول المسافة بين مركز الدوران P ، والرؤوس المتناظرة للشكليين $ABCD$, $A'B'C'D'$ في النشاط أعلاه.

3-3

الدوران Rotations

لماذا؟


استعملت الطاقة المولدة من المراوح الهوائية في الماضي؛ لضخ الماء أو لطحن الحبوب، أما في الوقت الحاضر، فيمكن أن تكون مراوح الهواء الحديثة بديلاً مهماً عن الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم). إذ تتحول هذه المراوح طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية.



رسم الأشكال الناتجة عن الدوران: تعلم أن الدوران يحرك كل نقطة في الشكل الأصلي بزاوية محددة وفي اتجاه محدد حول نقطة ثابتة.

أضف إلى

مطويتك



هي صورة A' الناتجة عن دوران A' بزاوية 120° عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حول النقطة C .

الدوران

مفهوم أساسى

الدوران حول نقطة ثابتة (تسمى **مركز الدوران**) بزاوية معينة قياسها x° واتجاه معين، يحول النقطة إلى صورتها بحيث:

- إذا كانت النقطة هي مركز الدوران، فإن صورتها هي النقطة نفسها.
- إذا كانت النقطة غير مركز الدوران، فإن النقطة الأصلية وصورتها تبعدان المسافة نفسها عن مركز الدوران، والزاوية المتشكّلة من النقطة ومركز الدوران والصورة تسمى **زاوية الدوران** وقياسها يساوي x° .




عكس اتجاه حركة عقارب الساعة




اتجاه حركة عقارب الساعة


يمكن أن يكون اتجاه الدوران في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. ومن الآن فصاعداً سيكون كل دوران عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلا إذا ورد خلاف ذلك.



رسم زاوية 140° قياسها 140° تكون أحد ضلعيها KA .




كرر الخطوات 3-4 للرأسين B و C . ثم ارسم $\triangle A'B'C'$.




مثال 1 رسم الشكل الناتج عن الدوران

استعمل منقلة ومسطرة لرسم صورة $\triangle ABC$ الناتجة عن دوران $\triangle ABC$ بزاوية 140° حول النقطة K .

الخطوة 1: ارسم قطعة مستقيمة من الرأس A إلى النقطة K .



الخطوة 3: استعمل مسطرة لتعيين A' على الضلع الثاني، بحيث يكون $KA' = KA$.



الخطوة 4: ارسم $\triangle A'B'C'$.


إرشادات للدراسة

تحويلات التطابق:


الدوران هو تحويل تطابق أيضاً، فهو يحافظ على الأبعاد وقياسات الزوايا وترتيب موقع النقاط والاستقامة، حيث تكون فيه الصورة مطابقة للشكل الأصلي.

تحقق من فهـمك

استعمل منقلةً ومسطراً لرسم صورة الشكل الناتجة عن الدوران حول النقطة K بالزاوية المحددة في كل من السؤالين الآتيين:



170° (1B)



65° (1A)

رسم الصورة الناتجة عن الدوران في المستوى الإحداثي: يمكنك استعمال القواعد الآتية لتحديد صورة نقطة ما، عندما يتم تدويرها بزاوية 90° أو 180° أو 270° عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل.

أضف إلى
مطويتك


الدوران في المستوى الإحداثي

مفهوم أساسـي

الدوران بزاوية 90°

عند تدوير نقطة بزاوية 90° عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل، اضرب الإحداثي y في -1 ، ثم بدل موقع الإحداثيين x, y .


الرموز: $(x, y) \rightarrow (-y, x)$



الدوران بزاوية 180°

عند تدوير نقطة بزاوية 180° عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل، اضرب كلاً من الإحداثيين y, x في -1 .


الرموز: $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$



الدوران بزاوية 270°

عند تدوير نقطة بزاوية 270° عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل، اضرب الإحداثي x في -1 ثم بدل موقع الإحداثيين x, y .

الرموز: $(x, y) \rightarrow (y, -x)$



الدوران في المستوى الإحداثي

مثال 2

إحداثيات رؤوس المثلث PQR هي: $P(1, 1), Q(4, 5), R(5, 1)$ ، مثل بيانياً $\triangle PQR$ وصوريته الناتجة عن دوران بزاوية 90° حول نقطة الأصل.

اضرب الإحداثي y في -1 ثم بدل الإحداثيين.

$(x, y) \rightarrow (-y, x)$



$P(1, 1) \rightarrow P'(-1, 1)$

$Q(4, 5) \rightarrow Q'(-5, 4)$

$R(5, 1) \rightarrow R'(-1, 5)$

ثم ملئ $\triangle P'Q'R'$ وصوريته $\triangle PQR$ في المستوى الإحداثي.

تحقق من فهـمك



$F(2, 1)$

$G(7, 1)$

$H(6, -3)$

$J(1, -3)$

إحداثيات رؤوس متوازي الأضلاع $FGHJ$ هي:

مثل بيانياً $FGHJ$ وصوريته الناتجة عن دوران بزاوية 180° حول نقطة الأصل.


إرشادات للدراسة

الدوران في اتجاه حركة عقارب الساعة:
يشير قياس زاوية الدوران السالب إلى أن الدوران في اتجاه حركة عقارب الساعة. فالدوران بزاوية -90° – حول نقطة الأصل هو دوران بزاوية 90° في اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل.

إرشادات للدراسة

الدوران بزاوية 360° :
الدوران بزاوية 360° حول نقطة ما يعيد الشكل إلى وضعه الأصلي؛ أي أن الصورة الناتجة عن دوران بزاوية 360° هي الشكل الأصلي نفسه.

مثال 3 من اختبار



ما صورة النقطة J الناتجة عن دوران $\triangle JKL$ بزاوية 270° حول نقطة الأصل؟

- (-3, -7) **A**
- (-7, 3) **B**
- (-7, -3) **C**
- (7, -3) **D**

اقرأ سؤال الاختبار

لقد أعطيت $\triangle JKL$ الذي إحداثيات رؤوسه: $J(3, -7)$, $K(1, -1)$, $L(5, -3)$ ، وطلب إليك أن تحدد إحداثياتي صورة النقطة J الناتجة عن دوران بزاوية 270° عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل.


حل سؤال الاختبار

لإيجاد إحداثياتي صورة النقطة J الناتجة عن الدوران بزاوية 270° عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل، أضرب الإحداثي x في -1 ، ثم بدل الإحداثيين x, y ،

$$(3, -7) \rightarrow (-7, -3) \quad (x, y) \rightarrow (y, -x)$$

فالإجابة الصحيحة هي **C**.

تحقق من فهمك




3) تم تدوير متوازي الأضلاع $WXYZ$ في الشكل المجاور بزاوية 180° عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل، أي الأشكال الآتية يمثل صورة متوازي الأضلاع الناتجة عن الدوران؟


إرشادات للدراسة

الدوران 270° :


يمكن إجراء دوران بزاوية 270° بعمل دورانين متعاكبين؛ أحدهما بزاوية 90° والأخر بزاوية 180° ، كما يمكن إجراء هذا الدوران أيضاً بعمل دوران بزاوية 90° في اتجاه عقارب الساعة.




C



A



D



B


إرشادات للاختبار

حل مسألة أبسط:


يمكنك أن تتحقق من صورة رأس واحد فقط مثل النقطة X هنا، بدلاً من التتحقق من صور رؤوس متوازي الأضلاع $WXYZ$ الأربع كلها، فإذا كانت صحيحة فأكمل للرؤوس الباقيه، وإلا فانتقل إلى شكل آخر.

المثال 1 استعمل منقلةً ومسطراً؛ لرسم صورة الشكل الناتجة عن الدوران حول النقطة K بالزاوية المحددة في كلٍ من السؤالين الآتيين:


240° (2)



45° (1)



(3) إحداثيات رؤوس المثلث DFG هي: $D(-2, 6)$, $F(2, 8)$, $G(2, 3)$ وصوريته الناتجة عن دوران بزاوية 270° حول نقطة الأصل.



المثال 3 اختيار من متعدد: الشكل المجاور يبيّن الشكل الرباعي $ABCD$ وصوريته $A'B'C'D'$ الناتجة عن دوران حول نقطة الأصل.

ما قياس زاوية الدوران؟

270° C

90° A


360° D

180° B


تدريب وحل المسائل

المثال 1 استعمل منقلةً ومسطراً؛ لرسم صورة الشكل الناتجة عن الدوران حول النقطة K بالزاوية المحددة في كلٍ مما يأتي:


260° (7)



145° (6)



90° (5)



مثل بيانياً الشكل وصوريته الناتجة عن الدوران حول نقطة الأصل بالزاوية المحددة في كلٍ مما يأتي:

(8) المعين $WXYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه: 90° , $W(-3, 4)$, $X(0, 7)$, $Y(3, 4)$, $Z(0, 1)$

(9) $\triangle FGH$ الذي إحداثيات رؤوسه: 180° , $F(2, 4)$, $G(5, 6)$, $H(7, 2)$

(10) متوازي الأضلاع $MPQV$ الذي إحداثيات رؤوسه: 270° , $M(-6, 3)$, $P(-2, 3)$, $Q(-3, -2)$, $V(-7, -2)$

المثالان 2، 3


جبر: أوجد معادلة صورة المستقيم $y = -x - 2$ الناتجة عن دوران حول نقطة الأصل بالزاوية المحددة في كلٍ من الأسئلة الآتية، ثم صرف العلاقة بين المستقيم الأصلي وصوريته.

180° (12)

90° (11)

360° (14)

270° (13)




جبر: أوجد معادلة صورة المستقيم الناتجة عن دورانه بالزاوية المحددة حول نقطة تقاطعه مع المحور x وحول نقطة تقاطعه مع المحور y في كلٍّ مما يأتي:

$$270^\circ, y = 3x - 2 \quad (17)$$

$$180^\circ, y = 2x + 4 \quad (16)$$

$$90^\circ, y = x - 5 \quad (15)$$



(18) سباق الدراجات: يشارك سليمان وعبد الله في سباق دراجات على مسار دائري الشكل نصف قطره 200 ft


(a) إذا بدأ السباق من النقطة (0, 0) وأتم الإثنان دورة واحدة في 30 ثانية، فما إحداثيات موقعهما بعد 5 ثوانٍ؟

(b) افترض أن السباق يتكون من 50 دورةً، وأن سليمان استمر بالسرعة نفسها. إذا أنهى عبد الله مسافة السباق في 26.2 دقيقة، فمن الفائز؟



الربط مع الحياة

تتحمل إطارات الدراجات ما يصل إلى 400 مرة من وزنها، ولا تتحطم إلا تحت حمل يعادل 700 مرة من وزنها.



(a) هندسياً: في المستوى الإحداثي المجاور، رسم $\triangle ABC$ والمستقيمان المتتقاطعان l, m .

ارسم صورة $\triangle ABC$ الناتجة عن الانعكاس حول المستقيم l . وسمّها $\triangle A'B'C'$ ، ثم ارسم صورة $\triangle A'B'C'$ الناتجة عن الانعكاس حول المستقيم m . وسمّها $\triangle A''B''C''$.

(b) هندسياً: كرر العملية السابقة مرتين في رباعين مختلفين، سُمّ

المثلث الثاني DEF ، وارسم صورته الناتجة عن الانعكاس حول المستقيمين p, n . وسمّ المثلث الثالث MNP ، وارسم صورته الناتجة عن الانعكاس حول المستقيمين q, r .

(c) جدولياً: قس زاوية الدوران لكل مثلث حول نقطة تقاطع المستقيمين، وانسخ الجدول الآتي وأكمله.

قياس زاوية الدوران بين الشكلين	قياس زاوية بين المستقيمين المتتقاطعين
$\triangle ABC, \triangle A''B''C''$	l, m
$\triangle DEF, \triangle D''E''F''$	n, p
$\triangle MNP, \triangle M''N''P''$	q, r

(d) لفظياً: اكتب تخميناً حول قياس زاوية الدوران الذي تحصل عليه عند إجراء انعكاسين متتابعين للشكل حول مستقيمين متتقاطعين.

إرشادات للدراسة



علاقة الدوران

بالانعكاس: إن إجراء انعكاسين متتابعين حول مستقيمين متتقاطعين يمثل دوراناً حول نقطة تقاطع المستقيمين.

مسائل مهارات التفكير العليا

(20) تحدّ: إحداثياً النقطة C هما $C(5, 5)$ ، وإحداثياً صورتها الناتجة عن دوران بزاوية 100° حول نقطة معينة هما $C'(-5, 7.5)$ ، أوجد إحداثياً مركز الدوران. وضح إجابتك.

يظهر في كلٍّ من السؤالين الآتيين الشكل الأصلي وصورته الناتجة عن دوران حول النقطة P ، انسخ في دفترك كلاً من الشكلين وحدد موقع النقطة P ، ثم أوجد قياس زاوية الدوران.




- (23) **مسألة مفتوحة:** ارسم شكلًا في المستوى الإحداثي، وصف دورانًا زاويته لا تساوي الصفر، وتنطبق فيه الصورة والشكل الأصلي أحدهما على الآخر.
- (24) **تبرير:** هل يكافئ انعكاس شكل حول المحور x دورانًا حول نقطة الأصل للشكل نفسه بزاوية 180° ؟ وضح إجابتك.
- (25) **اكتب:** هل تبقى نقاط ثابتة في الدوران دائمًا أو أحياناً أو لا تبقى أي نقاط ثابتة أبداً؟

تدريب على اختبار

(27) يرتكز سلم طوله 18 ft على حائط رأسي وأرض أفقية، إذا كان أسفل السلم يبعد 8 ft عن الحائط، فما ارتفاع رأس السلم عن الأرض مقارنًا إلى أقرب عشر قدم؟

- 19.7 ft C 10.0 ft A
26.0 ft D 16.1 ft B



(26) ما الدوران الذي يُجرى على شبه المنحرف $QRST$ لينقل الرأس R إلى $(4, 3)$ ؟

- A 270° عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حول النقطة T .
B 185° عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حول النقطة T .
C 180° في اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل.
D 90° في اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل.

مراجعة تراكمية




(28) **براكيين:** تحركت سحب من الغبار والغازات المنبعثة من بركان مسافة 64 km غربًا و 48 km شمالاً.


ارسم شكلًا يوضح الإزاحة التي وقعت على حبيبات الغبار، ثم أوجد طول أقصر مسار ينقل الغبار إلى الموقع نفسه. (مهارة سابقة)

ارسم صورة المضلع الناتجة عن الانعكاس حول المستقيم m في كلٍّ مما يأتي: (مهارة سابقة)


(31)



(30)






(29)




استعد للدرس اللاحق

صنّف التحويل المبين في كلٍّ من الأشكال الآتية إلى انعكاس أو إزاحة أو دوران.




اختبار منتصف الفصل

ارسم صورة الشكل الناتجة عن الإزاحة التي تنقل النقطة P إلى P' في كلٍ من السؤالين الآتيين. (الدرس 3-2)




(9)




(8)

ارسم صورة كلٌ من الشكليين الآتيين بالانعكاس حول المستقيم المعطى. (الدرس 3-1)



(2)




(1)

مثل كلاً من الشكليين الآتيين بيانياً، ثم ارسم صورة كلٍ منها بالانعكاس المحدد: (الدرس 3-1)

(3) المربع $\triangle FGH$ الذي إحداثيات رؤوسه: $F(-4, 3)$, $G(-2, 0)$, $H(-1, 4)$ بالانعكاس حول المحور y .

(4) المعيّن $QRST$ الذي إحداثيات رؤوسه: $Q(2, 1)$, $R(4, 3)$, $S(6, 1)$, $T(4, -1)$ بالانعكاس حول المحور x .

(5) احتفالات: وضع المشرفون على احتفال المدرسة طاولة قرب الحائط المقابل للمدخلين A , B لقاعة الاحتفال؛ لتقديم بعض الحلوي للحضور بعد نهاية الاحتفال. حدد موقع النقطة P التي تمثل موقع الطاولة، بحيث يسير الأشخاص الذين يعبرون من المدخل A أو المدخل B المسافة نفسها حتى يصلوا إلى الطاولة مستخدماً الانعكاس. (الدرس 3-1)




الحائط المقابل

مثل بيانياً الشكل وصوريه الناتجة عن الإزاحة المحددة في كلٍ من السؤالين الآتيين: (الدرس 3-2)



(6) المثلث $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(0, 0)$, $B(2, 1)$, $C(1, -3)$ ، إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليمين ووحدة واحدة إلى أسفل.

(7) المستطيل $JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه: $J(-4, 2)$, $K(-4, -2)$, $L(-1, -2)$, $M(-1, 2)$ ، إزاحة مقدارها 5 وحدات إلى اليمين و3 وحدات إلى أسفل.



(10) **قصص مصورة:** يكتب سامي قصة مصورة وهو يستعمل ورق الرسم البياني؛ ليتأكد من أن قياسات الأشكال التي يرسمها دقيقة. إذا رسم مستوى إحداثياً ونحلتين كما في الشكل المجاور، فيما الإزاحة التي تنقل النحلة 1 إلى موقع النحلة 2؟ (الدرس 3-2)

استعمل منقلةً ومسطرةً؛ لرسم صورة الشكل الناتجة عن الدوران حول النقطة R بزاوية المحددة في كلٍ من السؤالين الآتيين: (الدرس 3-3)

(11) 60° (12) 45° 

(13) **اختيار من متعدد:** ما صورة النقطة M الناتجة عن الدوران بزاوية 90° حول نقطة الأصل؟ (الدرس 3-3)

C $(-1, -3)$ **A** $(-3, 1)$
D $(3, 1)$ **B** $(-3, -1)$

مثل بيانياً الشكل وصوريته الناتجة عن الدوران حول نقطة الأصل بالزاوية المحددة في كلٍ من السؤالين الآتيين: (الدرس 3-3)

(14) المثلث $\triangle RST$ الذي إحداثيات رؤوسه: $R(-3, 0)$, $S(-1, -4)$, $T(0, -1)$ وزاوية دورانه 90° (15) المربع $JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه: $J(-1, 2)$, $K(-1, -2)$, $L(3, -2)$, $M(3, 2)$ وزاوية دورانه 180°

3-4 تركيب التحويلات الهندسية

Composition of Transformations




ستستعمل الحاسبة البيانية TI-nspire في هذا المعلم؛ لاستكشاف أثر إجراء عدة تحويلاتٍ هندسيةٍ على شكلٍ هندسيٌّ.

نشاط انعكاس شكل حول محورين رأسين

نشاط


الخطوة 1: ارسم مثلثاً وسمّه.

- افتح الآلة بالضغط على ، ثم ارسم مثلثاً بالضغط على مفتاح: ، ثم اختار 5: الأشكال الهندسية ومنها 2: مثلث ، ثم الضغط على ثلث مواقع لاختيار نقاط المثلث، قم بتحديد ثلث نقاط يظهر المثلث، ثم اضغط سمّ المثلث ABC ، وذلك بوضع المؤشر عند كل نقطة رأس، ثم الضغط على ثم الحرف؛ لجعل ثم اختيار 2: التسمية ، وكتابة اسم القطة بالضغط على ثم الحرف؛ لجعل الحروف كبيرة، والضغط على بعد كل تسمية.




الخطوة 2: ارسم مستقيماً عن يمين $\triangle ABC$ وسمّه.

- ارسم مستقيماً بالضغط على المفتاح . ثم اختيار 4: النقاط والمستقيمات ومنها 4: مستقيم ثم ارسم المستقيم بتحديد نقطة عن يمين $\triangle ABC$ ، ثم الضغط على ثم
- سمّ المستقيم m بالضغط على المستقيم، ثم على المفاتيح ، ثم اختيار . وسمّه m واضغط



الخطوة 3: ارسم انعكاساً لـ $\triangle ABC$ حول المستقيم m .

- ارسم انعكاس $\triangle ABC$ حول المستقيم m بالضغط على مفتاح ، ثم اختيار 8: التحويل الهندسي ومنها 2: الانعكاس ، ثم الضغط على المستقيم والمثلث ليظهر الانعكاس.



الخطوة 4: ارسم مستقيماً موازياً لـ m .

- ارسم مستقيماً عن يمين المثلث الناتج بحيث يكون موازياً لـ m وسمّه r بالضغط على مفتاح . ثم اختيار 7: الانشاء الهندسي ومنها 2: مستقيم موازي .
- اضغط على المستقيم m والنقطة المطلوب رسم r عن يمين المثلث الناتج من الخطوة 3

الخطوة 5: كرر العملية التي نفذتها في الخطوة 3؛ لرسم صورة الشكل الجديد بالانعكاس حول المستقيم r .

تحليل النتائج:

- ما العلاقة بين الشكل الأصلي والشكل النهائي؟
- ما التحويل الهندسي الذي يمكن استعماله للحصول على الشكل النهائي؟
- ماذا يحدث إذا حررت المستقيم m ؟ وماذا يحدث إذا حررت المستقيم r ؟
- خمن:** إذا أجري انعكاس لهذا الشكل حول مستقيم ثالث، فما التحويل الهندسي الواحد الذي يمكن أن يستعمل للحصول على الشكل النهائي؟ وضح إجابتك.
- كرر هذا النشاط مع مستقيمين متعددين. ما التحويل الهندسي الذي يمكن أن يستعمل للحصول على الشكل النهائي؟
- خمن:** إذا أجريت انعكاساً للشكل الناتج في السؤال 5 حول مستقيم ثالث يعادل المستقيم الثاني، فما التحويل الهندسي الواحد الذي يمكن أن يستعمل لإنتاج الشكل النهائي؟ وضح إجابتك.



تركيب التحويلات الهندسية

Composition of Transformations

لماذا؟



يوضح نمط آثار الأقدام على رمال الشاطئ في الصورة المجاورة إجراء تحويلين هندسيين مختلفين هما الإزاحة والانعكاس.

عند إجراء تحويل هندسي على شكل ما، ثم إجراء تحويل هندسي آخر على صورته، فإن التحويل الهندسي الذي ينقل الشكل الأصلي إلى الصورة النهائية هو تركيب لتحويلين هندسيين، ويُسمى **تحوياً هندسياً مركباً**. وأحد أنواع التحويلات الهندسية المركبة هو التحويل الهندسي الناتج عن تركيب إزاحة وانعكاس.

فيما سبق:

درستُ رسم صورة شكل هندسي ناتجة عن الانعكاس والانسحاب والدوران.

(الدروس 3-1, 3-2, 3-3)

والآن:

- أرسم صورة شكل هندسي ناتجة عن تركيب تحويلين هندسيين أحدهما هو الانعكاس.

- أرسم صورة شكل هندسي ناتجة عن تركيب انعكاسين حول مستقيمين متوازيين وحول مستقيمين متقطعين.

المفردات:

التحول الهندسي المركب
composite transformation

الخطوة 1: تمثيل تركيب الإزاحة والانعكاس بيانياً

إحداثيات رؤوس المثلث JKL هي: $J(6, -1)$, $K(10, -2)$, $L(5, -3)$ ، مثل بيانياً $\triangle JKL$ وصورته الناتجة عن إزاحة مقدارها 4 وحدات إلى أعلى ثم انعكاس حول المحور y .


الخطوة 2: الانعكاس حول المحور y

(x, y)	\rightarrow	$(-x, y)$
$J(6, 3)$	\rightarrow	$J''(-6, 3)$
$K'(10, 2)$	\rightarrow	$K''(-10, 2)$
$L'(5, 1)$	\rightarrow	$L''(-5, 1)$

الخطوة 1: الإزاحة 4 وحدات إلى أعلى

(x, y)	\rightarrow	$(x, y + 4)$
$J(6, -1)$	\rightarrow	$J'(6, 3)$
$K'(10, -2)$	\rightarrow	$K''(10, 2)$
$L'(5, -3)$	\rightarrow	$L''(5, 1)$

الخطوة 3: مثل بيانياً $\triangle JKL$ وصورته $\triangle J''K''L''$.



إرشادات للدراسة

تمييز التحويلات الهندسية:

يستخدم السهم للدلالة على الانسحاب، بينما يستخدم السهم للدلالة على الانعكاس.

أما صورة الصورة فستكون باللون البنّي.

تحقق من فهمك

إحداثيات رؤوس المثلث PQR هي: $P(1, 1)$, $Q(2, 5)$, $R(4, 2)$ ، مثل بيانياً $\triangle PQR \cong \triangle JKL$ وصوريته الناتجة عن التحويل الهندسي المركب المحدد في كلٍ من السؤالين الآتيين:

- 1A**) إزاحة مقدارها وحدتين إلى اليسار، ثم انعكاس حول المحور x .
و3 وحدات إلى اليسار، ثم انعكاس حول المستقيم $y = x$.

في المثال 1 تلاحظ أن: $\triangle J'KL' \cong \triangle J''K''L''$ ، وكذلك: $\triangle JKL \cong \triangle J''K''L''$. وبحسب خاصية التعدي للتطابق فإن: $\triangle JKL \cong \triangle J''K''L''$. وهذا يقود إلى النظرية الآتية:

أضف إلى
مطويتك

تركيب تحويلات التطابق

تركيب تحويلي تطابق (أو أكثر) هو تحويل تطابق أيضاً.


ستبرهن النظرية 3.1 في السؤال 20

لذا فإن الصورة الناتجة عن تركيب أي تحويلين هندسيين من تحويلات التطابق كالإزاحة أو الانعكاس أو الدوران تكون مطابقةً للشكل الأصلي.

نظرية 3.1

إرشادات للدراسة

تحويلات التطابق:
إن الانعكاس والإزاحة والدوران والتحويلات المركبة منها، هي تحويلات تطابق أيضاً.



مثال 2 تمثيل تركيب تحويلي تطابق بيانياً

إحداثيات طرفي \overline{CD} هما $C(-7, 1)$, $D(-3, 2)$ ، مثل بيانياً $\overline{CD} \cong \overline{C'D''}$ وصوريتها الناتجة عن انعكاس حول المحور x ثم دوران بزاوية 90° حول نقطة الأصل.

الخطوة 1: الانعكاس حول المحور x

$$\begin{array}{ll} (x, y) & \rightarrow (x, -y) \\ C(-7, 1) & \rightarrow C'(-7, -1) \\ D(-3, 2) & \rightarrow D'(-3, -2) \end{array}$$

الخطوة 2: الدوران حول نقطة الأصل بزاوية 90°

$$\begin{array}{ll} (x, y) & \rightarrow (-y, x) \\ C'(-7, -1) & \rightarrow C''(1, -7) \\ D'(-3, -2) & \rightarrow D''(2, -3) \end{array}$$

الخطوة 3: مثل بيانياً $\overline{CD} \cong \overline{C'D''}$ وصوريتها

تحقق من فهمك

إحداثيات رؤوس المثلث ABC هي: $A(-6, -2)$, $B(-5, -5)$, $C(-2, -1)$ ، مثل بيانياً $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ وصوريته الناتجة عن تركيب التحويلين الهندسيين بالترتيب المحدد في كلٍ من السؤالين الآتيين:

- 2B**) دوران بزاوية 180° حول نقطة الأصل، ثم إزاحة مقدارها وحدتين إلى اليمين، ووحدة واحدة إلى أسفل، ثم انعكاس حول المحور y .

و 4 وحدات إلى أعلى.

قراءة الرياضيات


الشرطتان:
تستعمل الشرطتان للدلالة على أن هذا الرأس صورة ناتجة من تحويل هندسي ثان.

تركيب انعكاسين: إن تركيب انعكاسين حول مستقيمين متوازيين يكافئ إزاحة.

نظريّة 3.2

أضف إلى
مطويتك

تركيب انعكاسين حول مستقيمين متوازيين



يمكن وصف تركيب انعكاسين حول مستقيمين متوازيين بأنّه إزاحة، ويكون:

- اتجاهها عمودياً على كل من المستقيمين.

- مقدارها يساوي ضعف المسافة بين المستقيمين المتوازيين.


ستبرهن النظريّة 3.2 في السؤال 26

إن تركيب انعكاسين حول مستقيمين متقطعين يكافئ دوراناً.

أضف إلى
مطويتك

تركيب انعكاسين حول مستقيمين متقطعين

نظريّة 3.3



يمكن وصف تركيب انعكاسين حول مستقيمين متقطعين بأنه دوران، ويكون:

- مركزه هو نقطة تقاطع المستقيمين.

- قياس زاويته يساوي ضعف قياس الزاوية التي يشكلها تقاطع هذين المستقيمين.

تنبيه!

ترتيب التركيب:
احرص على ترتيب التحويلين الهندسيين بالترتيب المحدد في المسألة.


ستبرهن النظريّة 3.3 في السؤال 27

رسم الصورة الناتجة عن انعكاسين حول مستقيمين


مثال 3

ارسم صورة الشكل A الناتجة عن انعكاس حول المستقيم m ثم حول المستقيم p ، ثم صرفه هندسياً واحداً ينقل A إلى A'' في كلٍ مما يأتي:


(b)



الخطوة 1 :



الخطوة 2 :



تاريخ الرياضيات

فيликس كلين
(1849-1925)

هو عالم رياضيات ألماني عرف الهندسة بأنها دراسة خصائص الفضاء التي تبقى دون تغيير تحت تأثير مجموعة من التحويلات الهندسية.

بناءً على النظريّة 3.3، فإن تركيب هذين الانعكاسين


حول المستقيمين المتقطعين m, p يكافئ دوراناً

بزاوية تساوي $2 \times 60^\circ = 120^\circ$ أي 120° اتجاه حركة


عقاب الساعة حول نقطة تقاطع المستقيمين m, p

Ministry of Education


الخطوة 1 : ارسم صورة الشكل A الناتجة عن انعكاس حول المستقيم m .



الخطوة 2 : ارسم صورة الشكل A' الناتجة عن انعكاس حول المستقيم p .



الخطوة 3 : ارسم صورة الشكل A'' الناتجة عن انعكاس حول المستقيم p .




بناءً على النظريّة 3.2، فإن تركيب هذين الانعكاسين

حول المستقيمين المتوازيين m, p يكافئ إزاحة

أفقيةً إلى اليمين مقدارها $2 \times 1.75 = 3.5$ cm

تحقق من فهّمك

ارسم صورة الشكل B الناتجة عن انعكاس حول المستقيم n ثم حول المستقيم q ، ثم صُفْ تحويلاً هندسياً واحداً ينقل B إلى B'' .



يتم إنشاء كثيّر من الأنماط في الحياة الواقعية باستعمال تركيب التحويلات الهندسية.


وصف التحويلات الهندسية

مثال 4 من واقع الحياة


أنماط: صُفْ تحويلاً هندسياً مركباً، يمكن استعماله لتكوين النمط في كلٍّ ممّا يأتي:



يمكن تكوين هذا النمط بتركيب انعكاس وإزاحة الشكلين المتقابلين (وحدة النمط)، بتركيب انعكاس حول المستقيم m ، ثم إزاحة إلى اليمين موازية للمستقيم m كما في الشكل أدناه. لاحظ أن المستقيم m يمرُّ في منتصف الشكل الأصلي (وحدة النمط).




تمَّ تكوين هذا النمط بتركيب إزاحة وانعكاس؛ أي أنه يمكن تكوينه بتركيب إزاحة إلى اليمين موازية للمستقيم n تنقل A إلى B متبوعةً بانعكاسٍ حول المستقيم n كما في الشكل الآتي.



تحقق من فهّمك

4) سجاد: صُفْ تحويلاً هندسياً مركباً يمكن استعماله لتكوين النمط في كلٍّ ممّا يأتي:



الربط مع الحياة

تستعمل تحويلات هندسية مركبة عند تصميم السجاد، لاحظ تكرار الجزء نفسه في إطار السجادة أعلاه.

ملخص المفهوم

تركيب التحويلات الهندسية

أضف إلى

مطويتك

الدوران	الإزاحة
تركيب انعكاسين حول مستقيمي متقاطعين.	تركيب انعكاسين حول مستقيمي متوازيين.

تأكد



إحداثيات رؤوس المثلث CDE هي: $C(-5, -1)$, $D(-2, -5)$, $E(-1, -1)$, مثل بيانياً $\triangle CDE$ وصوريته الناتجة عن التحويل الهندسي المركب المحدد في كل من المسؤولين الآتيين :

- (1) إزاحة مقدارها 4 وحدات إلى اليمين،
ثم انعكاس حول المحور y

- (3) إحداثيات طرفي \overline{JK} هما $J(2, 5)$, $K(6, 5)$ وصوريتها الناتجة عن انعكاس حول المحور x ,
ثم دوران بزاوية 90° حول نقطة الأصل.


المثال 1

رسم صورة الشكل S الناتجة عن انعكاسٍ حول المستقيم m ثم صُفْ تحويلًا هندسياً واحداً ينقل S إلى S'' .



المثال 2

المثال 3



المثال 4

6) **أنماط البلاط:** صنع راشد نمطاً من بلاط على شكل مثلث متطابق الضلعين، صُفِّ التحويل الهندسي المركب الذي يمكن استعماله لتكوين هذا النمط.

تدريب وحل المسائل

المثال 1

مثل بيانياً الشكل وصوريته الناتجة عن التحويل المركب المحدد في كل مما يأتي:

- (8) $\triangle DFG$ الذي إحداثيات رؤوسه:

$$D(2, 8), F(1, 2), G(4, 6)$$

إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليمين 3 وحدات
إلى أعلى، ثم انعكاس حول المستقيم $x = y$

- (7) $\triangle RST$ الذي إحداثيات رؤوسه:

$$R(1, -4), S(6, -4), T(5, -1)$$

إزاحة مقدارها وحدتان إلى اليمين
ثم انعكاس حول المحور x

المثال 2

مثل بيانياً الشكل وصوريته الناتجة عن التحويل المركب المحدد في كل مما يأتي:

- (10) \overline{RS} , حيث $R(2, -1)$, $S(6, -5)$, $W(-4, 6)$, $X(-4, 1)$, \overline{WX}

إزاحة مقدارها وحدتان إلى اليمين
إلى أسفل، ثم انعكاس حول المحور x



- ، حيث $W(-4, 6)$, $X(-4, 1)$, \overline{WX}

انعكاس حول المحور x


ثم دوران بزاوية 90° حول نقطة الأصل.

المثال 3


ارسم صورة الشكل D الناتجة عن انعكاسٍ حول المستقيم m ثم حول المستقيم p . ثم صِفْ تحويلًا هندسياً واحداً ينقل D إلى D'' .




صِفْ تحويلًا هندسياً مركباً يمكن استعماله لتكوين نمط الأقمشة في كلٌّ مما يأتي:



(15)




(14)



المثال 4


(16) **زلّاجات:** رسم صالح على زلاجته نمطاً، ما التحويل الهندسي المركب الذي استعمله صالح لرسم هذا النمط؟



جبر: مثل بيانيًّا صورة كُلٌّ من الشكلين الآتيين الناتجة عن التحويل الهندسي المركب المحدد:


(18) انعكاس حول المحور x

ثم انعكاس حول المحور y




(17) دوران بزاوية 90° حول نقطة الأصل

ثم انعكاس حول المحور x



(19) أوجد إحداثيات رؤوس $\triangle A''B''C''$ الناتج عن انعكاس حول المحور x ثم دوران بزاوية 180° حول نقطة الأصل لل مثلث $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه هي: $A(-3, 1), B(-2, 3), C(-1, 0)$.

(20) **برهان:** اكتب برهانًا حُرًّا للحالة الآتية من نظرية 3.1 (تركيب تحويلات التطابق).




المعطيات: تنقل الإزاحة بمقدار a وحدة إلى اليمين و b وحدة إلى أعلى.

النقطة X إلى X' والنقطة Y إلى Y' .

وينقل الانعكاس حول المستقيم z النقطة X'


إلى X'' والنقطة Y' إلى Y'' .

المطلوب: $\overline{XY} \cong \overline{X''Y''}$




(21) **حياة:** تحريك خولة منديلاً باستعمال النمط الظاهر في الشكل المجاور، صنف تركيب التحويلات الهندسية الذي تستعمله خولة لإنشاء هذا النمط.

أثار الأقدام: استعن بمعلومات الربط مع الحياة، وصنف التحويل المركب من إزاحة وانعكاس الذي يمكن استعماله للتنبؤ بموقع أثر القدم اللاحق في كلٍّ من السؤالين الآتيين:





(22) طائر الحبشي



(23) البطة

الربط مع الحياة

طول خطوة الحيوان يساوي المسافة بين أثري قدم متتاليين. فمتوسط طول خطوة طائر الحبشي in 11 تقريرياً، ومتوسط طول خطوة البطة in 5 تقريرياً.



(26) **برهان:** اكتب برهاناً حرّاً للنظرية 3.2

المعطيات: ينقل الانعكاس حول المستقيم p القطعة \overline{BC} إلى $\overline{B'C'}$ وينقل الانعكاس حول المستقيم q القطعة $\overline{B'C'}$ إلى $\overline{B''C''}$.

$$p \parallel q, AD = x$$

$$\begin{aligned} \text{المطلوب: } & \overline{BB''} \perp p, \overline{BB''} \perp q \\ & \overline{BB''} = 2x \end{aligned}$$

(27) **برهان:** اكتب برهاناً حرّاً للنظرية 3.3

المعطيات: يتقاطع المستقيمان ℓ , m في النقطة P .



نقطة لا تقع على أيٍ من المستقيمين ℓ أو m .

المطلوب: (a) إذا أجري انعكاس للنقطة A حول المستقيم m ثم أجري انعكاس لصورتها حول المستقيم ℓ ، فإن "A" تكون صورة A بدورانٍ حول النقطة P .

$$m\angle APA'' = 2(m\angle SPR) \quad (\text{b})$$


إرشادات للدراسة

مراجعة: عدد إلى
الدرس 1-7 لمراجعة
خصائص تطابق القطع
المستقيمة.




مسائل مهارات التفكير العليا

(28) **تحدّ:** إذا أُزيح الشكل PQRS بمقدار 3 وحدات إلى اليمين ووحدتين إلى أسفل، ثم عُكست الصورة حول المستقيم $-y = 1$ ، وبعد ذلك تم تدوير الصورة الجديدة بزاوية 90° حول نقطة الأصل، فما إحداثيات رؤوس الشكل الناتج $?P'''Q'''R'''S'''$ ؟



(29) **تبرير:** إذاً أجري انعكasan متعاقبان بشكل ما؛ أحدهما حول المستقيم $x = y$ ، والآخر حول المحور x ، فهل يؤثر ترتيب الانعكاسين في الصورة الناتجة؟ اشرح إجابتك.



(30) **مسألة مفتوحة:** صِفْ تحويلًا هندسيًّا مركبًا يمكن استعماله لتحويل $\triangle ABC$ إلى $\triangle DEF$ في الشكل المجاور.

(31) **تبرير:** إذاً أخضع شكلًّا ما للدورانين، فهل لترتيب الدورانين تأثير في موقع الصورة الناتجة دائمًا، أو أحياناً، أو ليس له تأثير أبداً؟

(32) **اكتب:** هل تبقى أي نقاط ثابتة في التحويلات الهندسية المركبة؟ وضح إجابتك.

تدريب على اختبار




(34) **إجابة قصيرة:** إحداثيات طرفي CD هما (4, 2) و (4, 8)، إذاًزيحت هذه القطعة المستقيمة بمقدار 6 وحدات إلى اليسار ووحدتين إلى أعلى، ثم عكست الصورة حول المحور y ، فما إحداثيات "D"؟

(33) ما صورة النقطة A(4, 1) الناتجة عن انعكاس حول المستقيم $y = x$ ؟

- | | | | |
|----------|----------|---------|----------|
| (-1, 4) | C | (1, -4) | A |
| (-1, -4) | D | (1, 4) | B |

مراجعة تراكمية

استعمل منقلةً ومسطرةً؛ لرسم صورة الشكل الناتجة عن الدوران حول النقطة X بالزاوية المبينة في كلٌ مما يأتي: (الدرس 3-3)



مُثُلَّ بِيَانِيَّ الشَّكْلِ وصُورَتِهِ النَّاتِجَةِ عَنِ الإِزَاحَةِ المُحدَّدَةِ فِي كُلٍّ مَمَّا يَأْتِي: (الدرس 3-2)

(38) $\triangle FGH$ الذي إحداثيات رؤوسه هي: F(1, -4), G(3, -1), H(7, -1)؛ إزاحة مقدارها وحدتان إلى اليمين و6 وحدات إلى أعلى.

(39) الشكل الرباعي ABCD الذي إحداثيات رؤوسه: A(-2, 7), B(-1, 4), C(2, 3), D(2, 7)؛ إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليسار و5 وحدات إلى أسفل.

استعد للدرس اللاحق


بيّن كل من الأشكال الآتية الأصل والصورة الناتجة عن انعكاسٍ حول مستقيمي ما، ارسم محور الانعكاس.



(42)




(41)



(40)

التبليط 3-4 Tessellation



التبليط نمطٌ يكون من شكل أو أكثر، يغطي سطحًا من دون تقاطعات أو فراغات، ويكون مجموع قياسات الزوايا حول كل رأس في التبليط 360° .

التبليط المنتظم هو التبليط الذي يستعمل فيه نوع واحد فقط من المضلعات المنتظمة، ويمكن تبليط سطح بمضلع منتظم، إذا كان قياس زاويته الداخلية أحد عوامل العدد 360، ويمكن عمل تبليط باستعمال أكثر من نوع واحد من المضلعات المنتظمة، ويسمى التبليط الذي يتكون من مضلعين منتظمين أو أكثر **تبليطاً شبه منتظم**.

التبليط المنتظم

نشاط 1

حدد ما إذا كان استعمال كل من المضلعين المنتظمين الآتيين لتكون تبليط في المستوى ممكناً أم لا، فسر إجابتك.

(a) مضلع سداسي

افتراض أن قياس الزاوية الداخلية للسداسي المنتظم يساوي x°

$$\begin{aligned} \text{صيغة الزاوية الداخلية للمضلع المنتظم} \\ x &= \frac{(n-2) \cdot 180^{\circ}}{n} \\ n &= 6 \\ &= \frac{(n-2) \cdot 180^{\circ}}{6} \\ &= 120^{\circ} \end{aligned}$$

بالتبسيط

وبما أن 120 أحد عوامل 360 ، فإنه يمكن استعمال المضلع السداسي المنتظم لتبليط المستوى.

(b) مضلع عشاري

افتراض أن قياس الزاوية الداخلية للعشاري المنتظم يساوي x .


$$\begin{aligned} \text{صيغة الزاوية الداخلية للمضلع المنتظم} \\ x &= \frac{(n-2) \cdot 180^{\circ}}{n} \\ n &= 10 \\ &= \frac{(n-2) \cdot 180^{\circ}}{10} \\ &= 144 \end{aligned}$$

بالتبسيط


وبما أن 144 ليس من عوامل 360 ، إذن لا يمكن استعمال العشاري المنتظم لتبليط المستوى.

يقال: إن التبليط **متسلق** إذا احتوى الترتيب نفسه من الأشكال والزوايا عند كل رأس.

متسلق



غير متسلق




نَشَاطٌ 2 تَصْنِيف التَّبْلِيط

حدّد ما إذا كان كُلُّ من الأنماط الآتية تبليطاً أم لا، وإذا كان كذلك فصنفه إلى منتظمٍ أو شبه منتظمٍ أو غير منتظمٍ وإلى متسقٍ أو غير متسقٍ.


بما أنه لا توجد فراغات في الشكل، وليس هنالك تقاطعات، فإن هذا النمط يشَكِّل تبليطاً وهذا التبليط يتكون من أشكال سداسية منتظمة ومربعات ومثلثات متطابقة الأضلاع، إذن هو تبليط شبه منتظم.

بما أنه عند بعض الرؤوس يوجد 5 زوايا، وعند بعضها 4 زوايا، إذن هذا التبليط غير متسق.




(a)

تَوَجُّد فَرَاغَاتٍ فِي الشَّكْلِ فَهُوَ نَمَطٌ لَّيْسَ تَبْلِيطًا.



(b)

لَا تَوَجُّد فَرَاغَاتٍ وَلَا تَقَاطِعَاتٍ فِي هَذَا النَّمَطِ فَهُوَ تَبْلِيطٌ .
يَتَكَوَّنُ هَذَا التَّبْلِيطُ مِنْ شَبَهٍ مُنْحَرِفٍ، وَهُوَ مُضْلَعٌ غَيْرٌ مُنْتَظِمٌ؛ لَذَا فَهُذَا التَّبْلِيطُ غَيْرٌ مُنْتَظِمٌ، لَكِنَّهُ مُتَسَقٌ، لَأَنَّهُ يَحْتَوِي عَلَى تَرْتِيبَاتٍ لِأَشْكَالٍ نَفْسُهَا وَالْزَوَّاِيَا نَفْسُهَا عَنْدَ كُلِّ رَأْسٍ.




(c)

يمكن استعمال خصائص التبليط؛ لتصميم وإنشاء أشكال تبليط مختلفة.


نَشَاطٌ 3 رَسَم التَّبْلِيط

ارسم مثلثاً واستعمله لإنشاء تبليط.

الخطوة 1: ارسم مثلثاً وعيّن نقطةً متصفَّةً أحد أضلاعه.




الخطوة 2: دور المثلث بزاوية 180° في اتجاه عقارب الساعة حول تلك النقطة.



الخطوة 4: اعمل إزاحة للصف لتكون تبليطاً.




الخطوة 3: اعمل إزاحة للمثلثين لتكون صفاً.



نشاط 4

إنشاء تبليط باستخدام الآلة الحاسبة البيانية TI-nspire

الخطوة 1: ارسم قطعةً مستقيمةً.




- افتح تطبيق الهندسة بالضغط على المفاتيح

ارسم قطعةً مستقيمةً بالضغط على مفتاح ، ثم اختار 4: النقاط والمستقيمات ، ثم 5: قطعة مستقيمة ، واضغط في موقعين لظهور القطعة المستقيمة.

- سمّ القطعة المستقيمة التي رسمتها، بوضع المؤشر عند أحد طرفيها، ثم اضغط واختار 2: التسمية ثم اضغط (ليكون الحرف كبيراً) واكتب A ، وبالمثل سمّ الطرف الآخر B .

الخطوة 2: ارسم مستقيماً موازياً لـ \overline{AB} .




ارسم نقطةً أسفل \overline{AB} ، وذلك بالضغط على ، ثم اختيار 4: النقاط والمستقيمات ، ثم 1: نقطة في المستوى ، ثم الضغط على الموقع المراد للنقطة C .

- سمّ النقطة المرسومة، بوضع المؤشر عند النقطة والضغط على ثم اختار 2: التسمية ثم الضغط على وكتابة C .

- ارسم مستقيماً موازياً لـ \overline{AB} ويمر بالنقطة C ، بالضغط على ثم اختار 7: الإنشاء الهندسي ، ومنها 2: مستقيم موازي ثم الضغط على القطعة \overline{AB} والنقطة C .

الخطوة 3: ارسم مستقيماً موازياً لـ \overline{BC} .




ارسم القطعة المستقيمة \overline{BC} بالضغط على ، ثم اختيار 4: النقاط والمستقيمات ، ثم 5: قطعة مستقيمة ، ثم الضغط على نقطتين B, C .

- ارسم مستقيماً موازياً لـ \overline{BC} ويمر في A (بطريقة مماثلة لما ورد في الخطوة 2)، وسمّه \overleftrightarrow{AD} ، حيث D نقطة تقاطع المستقيم الموازي

- لـ \overline{AB} والمستقيم الموازي لـ \overline{BC}) ، وذلك بالضغط على مفتاح ، ثم اختار 4: النقاط والمستقيمات ، ثم 3: نقطة (نقاط) التقاطع ثم على كلٍ من المستقيمين الموازيين لـ \overline{AB} و \overline{BC} ، لظهور نقطة تقاطعهما وسمّها D .



الخطوة 4: قم بإخفاء القطعة المستقيمة \overline{BC} .




- قم بإخفاء القطعة المستقيمة \overline{BC} بالضغط عليها ثم على **ctrl** واختار **إخفاء** 4، وبالمثل قم بإخفاء المستقيم \overrightarrow{AD} .

- رسم نقطةً عن يمين \overline{BC} وسمّها E

- صل بين B و E ، وبذلك بالضغط على **ctrl** ثم اختار 4: النقاط والمستقيمات ثم على النقطتين B, E 5: قطعة مستقيمة ثم على النقطتين B, E .


وبالمثل صل بين النقطتين C و E .



الخطوة 5: ارسم مستقيماً موازياً لـ \overline{BE} و \overline{CE} .

- رسم مستقيماً موازياً لـ \overline{BE} ويمر في A ، ومستقيماً موازياً لـ \overline{CE} ويمر في D .

- حدّد نقطة تقاطع المستقيمين الموازيين لـ \overline{BE} و \overline{CE} وسمّها F ، وذلك بطريقةٍ مماثلةٍ لما ورد في الخطوة 3 .




الخطوة 6: كون مضلعًا.

- قم بإخفاء المستقيمات $\overleftrightarrow{AF}, \overleftrightarrow{DF}, \overleftrightarrow{DC}$


- كون مضلعًا سداسيًا بالضغط على 5: الأشكال الهندسية ثم 4: المضلع ثم بالضغط على جميع رؤوسه بالتالي، بدءًا بأحد其ا وانتهاءً به ثم الضغط على **esc** .



الخطوة 7: اسحب المضلع.



- اعمل انسحاباً للمضلع، بالضغط على ، ثم اختار 8: التحويل الهندسي ومنها 3: الانسحاب ثم الضغط على أحد الرؤوس ثم على المضلع؛ لعمل نسخة منه.
- اسحب النسخة للمكان المناسب، ثم اضغط على مفتاح الإدخال لإفلاتها.
- كرر ذلك للحصول على التبليط.



الخطوة 8: لوّن التبليط.

- لوّن التبليط الذي أنشأته، وذلك بتحديد كل مضلع ثم الضغط على ثم اختيار 2: لوّن التبعة ، واختار لوّنا.

تمارين:

حدّد ما إذا كان استعمال أيٌّ من المضلعات المنتظمة الآتية لتكوين تبليط في المستوى ممكناً أم لا. اكتب “نعم” أو “لا”.

(3) مضلع له 16 ضلعاً

(2) مضلع خماسي

(1) مثلث

حدّد ما إذا كان كُلُّ من الأنماط الآتية تبليطاً أم لا. اكتب “نعم” أو “لا”， وإن كان كذلك فصنفه إلى منتظم أو شبه منتظم أو غير منتظم، وإلى متتسق أو غير متتسق.



(6)



(5)



(4)

ارسم نمط تبليط باستعمال الشكل (أو الأشكال) الآتي:



(9) شبه منحرف ومتوازي أضلاع

(8) مثلث قائم الزاوية


(7) مضلع ثماناني منتظم ومربع

التماثل

Symmetry

3-5

لماذا؟



صورة السلحفاة المجاورة توضح تماثلاً لجزأي جسمها الأيمن والأيسر، حيث يُعد التماثل خاصيةً يمكن أن تنص بها العديد من الأشياء، مثل الأشكال الهندسية والمعادلات الرياضية وغيرها. فالمخلوقات التي تبدو صور أجسامها متتماثلة حول مستقيم تظهر أنماط عيش أكثر تعقيداً من المخلوقات ذات الأجسام المتتماثلة دورانياً مثل قنديل البحر.

التماثل في الأشكال الثنائية الأبعاد: يكون الشكل **متتماثلاً**، إذاً وجد انعكاس أو إزاحة أو دوران أو تركيب إزاحة وانعكاس ينتج عنه صورة منتظمة على الشكل نفسه. أحد أنواع التماثل هو التماثل حول محور.

اضف إلى مطويتك

مفهوم أساسٍ

التماثل حول محور

يكون الشكل الثنائي الأبعاد **متتماثلاً حول محور**، إذا كانت صورته الناتجة عن انعكاس حول مستقيم ما هي الشكل نفسه، ويسمى هذا المستقيم **محور تماثل**.

مثال 1 من الواقع الحياتي

تعيين محاور التماثل

مخلوقات بحرية: بَيْنَ مَا إِذَا كان يبدو لصورة المخلوق البحري محور تماثل أم لا. وإذا كان كذلك، فارسم محاور التماثل جميعها، وحدّد عددها في كُلّ مَا يأتي:





لا؛ لا يوجد لصورة هذا المخلوق محور تماثل.



نعم؛ لصورة هذا المخلوق 5 محاور تماثل.



نعم، لصورة هذا المخلوق محور تماثل واحد.



تحقق من فهمك

بَيْنَ مَا إِذَا كان للشكل محور تماثل أم لا، وإذا كان كذلك فارسم محاور التماثل جميعها، وحدّد عددها في كُلّ مَا ي يأتي:



(1C)



(1B)



(1A)

فيما سبق:

درست رسم صورة ناتجة عن الانعكاس والدوران.

(الدرس 3-1, 3-3)

والآن:

- أحد محاور التماثل والتماثل الدوراني للأشكال الثنائية الأبعاد.

- أحد مستويات التماثل والتماثل الدوراني للأشكال الثلاثية الأبعاد.

المفردات:

التماثل

symmetry

التماثل حول محور

line symmetry

محور التماثل

line of symmetry

التماثل الدوراني

rotational symmetry

مركز التماثل

center of symmetry

رتبة التماثل

order of symmetry

مقدار التماثل

magnitude of symmetry

التماثل حول مستوى

plane symmetry


وهنالك نوع آخر من التماشل هو التماشل الدوراني .

مفهوم أساسى

التماشل الدوراني

يكون للشكل الثنائي الأبعاد **تماشل دوري** (أو تماشل نصف قطرى) إذا كانت صورته الناتجة عن دوران بين 0° و 360° حول مركزه هي الشكل نفسه، ويسمى مركز الدوران في هذه الحالة **مركز التماشل** (أو نقطة التماشل).

أمثلة : المربع الآتى له تماشل دوري؛ لأن الدوران بكلٌّ من الزوايا $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$ ينتج عنه الشكل نفسه.



يطلق على عدد المرات التي تتطابق فيها صورة الشكل على الشكل نفسه في أثناء دورانه من 0° إلى 360° اسم **رتبة التماشل**، أما **مقدار التماشل** (أو زاوية الدوران) فهو قياس أصغر زاوية يدورها الشكل حتى يتطابق على نفسه، ويرتبط مقدار التماشل ورتبته بالعلاقة:

مقدار التماشل يساوى ناتج قسمة 360° على رتبة التماشل.

ففي الشكل أعلاه، رتبة التماشل الدوراني 4، ومقدار التماشل 90°

تعيين التماشل الدوراني

مثال 2


بيان ما إذا كان للشكل تماشل دوري أم لا، وإذا كان كذلك، فعيّن مركز التماشل، وحدد رتبته ومقداره في كلٌّ مما يأتي:



نعم؛ لهذا الشكل تماشل دوري.

مركز التماشل هو نقطة تقاطع قطراته.

$$\begin{aligned} \text{رتبة التماشل} &= 2 \\ \text{مقدار التماشل} &= \\ 360^\circ &\div 2 = 180^\circ \end{aligned}$$




لا؛ لا يوجد دوران بزاوية بين 0° و 360° تتطابق فيه صورة المثلث القائم الزاوية على نفسه.



نعم؛ للسداسي المنتظم تماشل دوري.

مركز التماشل هو نقطة تقاطع أقطاره.

$$\begin{aligned} \text{رتبة التماشل} &= 6 \\ \text{مقدار التماشل} &= \\ 360^\circ &\div 6 = 60^\circ \end{aligned}$$



تحقيق من فهمك

أذهار: بيان ما إذا كان يبدو لصورة الزهرة تماشل دوري أم لا، وإذا كان كذلك، فعيّن مركز التماشل، وحدد رتبته ومقداره في كلٌّ مما يأتي:



(2B)




(2A)

إرشادات للدراسة

التماشل حول نقطة :
يكون الشكل متماثلاً حول نقطة، إذا كانت صورته الناتجة عن الدوران حول تلك النقطة بزاوية 180° هي الشكل نفسه.

يتحقق الشكل أدناه خاصية التماشل حول نقطة.




التماثل في الأشكال الثلاثية الأبعاد: يمكن أن تكون الأشكال الثلاثية الأبعاد أيضًا متماثلة.

أضف إلى
مطويتك

التماثل في الأشكال الثلاثية الأبعاد


مظاهيم أساسية



التماثل حول مستوى

يكون الشكل الثلاثي الأبعاد **متماثلاً حول مستوى**,

إذا أمكن تقسيمه بهذا المستوى إلى شكلين متطابقين،
وفي هذه الحالة يسمى هذا المستوى (مستوى التماشل).



التماثل حول محور

يكون الشكل الثلاثي الأبعاد **متماثلاً حول محور**,

إذا أمكن تدويره حول هذا المحور بزاوية بين 0° و 360° ،
ليصبح كما كان في وضعه الأصلي.

إرشادات للدراسة

مستوى التماشل:

هو المستوى الذي يقسم
الشكل إلى نصفين
متطابقين تماماً، بحيث
يكون كلُّ منها صورة
للآخر .


التماثل في الأشكال الثلاثية الأبعاد

مثال 3

بيان ما إذا كان الشكل متماثلاً حول مستوى أو متماثلاً حول محور أو كلاهما أو غير ذلك في كلٍّ مما يأتي:




b) منشور
خماسي
منتظم




a) مجسم
على شكل
حرف L

متماثل حول مستوى، ومتماثل حول محور



متماثل حول مستوى



تحقق من فهمك

بيان ما إذا كان الشكل متماثلاً حول مستوى، أو متماثلاً حول محور، أو كلاهما، أو غير ذلك في كلٍّ مما يأتي:



(3C)



(3B)



(3A)



(3D)

مراجعة المفردات

المنشور: مجسم متعدد السطوح له قاعدتان متطابقتان وأوجهه على شكل متوازي أضلاع.


المثال 1

ما يُبيّن:

بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ لِلشَّكْلِ مَحْوَرٌ تَمَاثِيلٌ أَمْ لَا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَأَرْسِمْ مَحَاوِرَ التَّمَاثِيلِ جَمِيعَهَا، وَحَدَّدْ عَدْدَهَا فِي كُلٍّ



(3)



(2)



(1)

المثال 2

ما يُبيّن:


بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ لِلشَّكْلِ تَمَاثِيلٌ دُورَانِيٌّ أَمْ لَا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَعِينْ مَرْكَزَ التَّمَاثِيلِ، وَحَدَّدْ رَتْبَتَهُ وَمَقْدَارَهُ فِي كُلٍّ



(6)



(5)



(4)



(7) بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الشَّكْلَ الْمُجَارِيَ مُتَمَاثِلًا حَوْلَ مَسْطَوٍ أَوْ حَوْلَ مَحْوَرٍ أَوْ كَلاهُمَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.


المثال 3

بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ لِلشَّكْلِ مَحْوَرٌ تَمَاثِيلٌ أَمْ لَا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَأَرْسِمْ مَحَاوِرَ التَّمَاثِيلِ جَمِيعَهَا، وَحَدَّدْ عَدْدَهَا فِي كُلٍّ


ما يُبيّن:



(10)



(9)



(8)

أَعْلَامٌ: بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ لِلعلمِ مَحْوَرٌ تَمَاثِيلٌ أَمْ لَا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَأَرْسِمْ مَحَاوِرَ التَّمَاثِيلِ جَمِيعَهَا، وَحَدَّدْ عَدْدَهَا

فِي كُلِّ مَا يُبيّن:



(13)



(12)



(11)

المثال 2

ما يُبيّن:

بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ لِلشَّكْلِ تَمَاثِيلٌ دُورَانِيٌّ أَمْ لَا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَعِينْ مَرْكَزَ التَّمَاثِيلِ، وَحَدَّدْ رَتْبَتَهُ وَمَقْدَارَهُ فِي كُلٍّ


ما يُبيّن:



(16)




(15)



(14)

إطارات: بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ لِصُورَةِ غُطَاءِ إِطَارِ السِّيَارَةِ تَمَاثِيلٌ دُورَانِيٌّ أَمْ لَا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَحَدَّدْ رَتْبَتَهُ وَمَقْدَارَهُ.



(19)



(18)



(17)

المثال 3

بيّن ما إذا كان الشكل متماثلاً حول مستوى أو متماثلاً حول محور أو كلاهما أو غير ذلك في كلٌّ مما يأتي:



(22)



(21)



(20)

عبوات: حدد عدد مستويات التماثل الأفقية، ومستويات التماثل الرأسية لكلٌّ من العلب الآتية:



(25)



(24)



(23)

هندسة إحداثية: حدد ما إذا كان للشكل المعطاة إحداثيات رؤوسه في كلٌّ من الأسئلة الآتية تماثل حول محور و/أو تماثل دوراني أم لا.

$$A(-4, 0), B(0, 4), C(4, 0), D(0, -4) \quad (26)$$

$$R(-3, 3), S(-3, -3), T(3, 3) \quad (27)$$

$$F(0, -4), G(-3, -2), H(-3, 2), J(0, 4), K(3, 2), L(3, -2) \quad (28)$$

جبر: مثل بيانياً كلاً من الدوال الآتية، وحدد ما إذا كان لتمثيلها البياني تماثل حول محور و/أو تماثل دوراني أم لا. وإذا كان كذلك، فحدد رتبة التماثل ومقداره، واكتب معادلة كل محور تماثل.


$$y = x \quad (29)$$

$$y = x^2 + 1 \quad (30)$$


$$y = -x^3 \quad (31)$$

حدّد ما إذا كانت البلورة متماثلةً حول مستوى أو متماثلةً حول محور في كلٌّ مما يأتي:


(34) منشور قائم قاعدته معين



(33) مجسم ذو سطة أوجه كل منها معين



(32) مكعب



الربط مع الحياة

(35) **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة ستسقصي التماثل الدوراني في المضلعات المنتظمة .

a) هندسياً: ارسم مثلاً متطابق الأضلاع، وحدّد رتبة تماثله.

b) هندسياً: كرر العملية في الفرع a على مربع ومضلع خماسيٍ منتظمٍ ومضلع سداسيٍ منتظمٍ.

c) جدولياً: نظم جدولًا يبين رتبة التماثل لكلٌّ من هذه المضلعات.

d) لفظياً: ضع تخميناً حول رتبة التماثل لمضلع منتظم.

تعتمد الخصائص الفيزيائية للمادة الصلبة على ترتيب بلوراتها، فبلورات الألماس تأخذ شكل المكعب، وروابطها قوية جدًا يصعب قطعها، وهذا ما يجعل الألماس مادة قاسية جدًا.



مسائل مهارات التفكير العليا



(36) اكتشف الخطأ: يقول جمال: إن للشكل A تماثلاً حول محور فقط، في حين يقول ناصر: إن للشكل A تماثلاً دورانياً فقط. فهل أيٌّ منهما على صواب؟ برب إجابتكم.

(37) تحد: يوجد لشكل رباعي في المستوى الإحداثي محوراً تماثلاً فقط هما: $y = x - 1$, $y = -x + 2$ مثل محوري التماثل بيانيًا ثم أوجد مجموعة من الإحداثيات الممكنة لرؤوس هذا الشكل ومثله بيانيًا.

(38) مسألة مفتوحة: ارسم شكلًا له محور تماثل، ولكن ليس له تماثل دوراني. اشرح إجابتكم.

(39) اكتب: بيّن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين التماثل حول محور والتماثل الدوراني.

تدريب على اختبار

(40) إجابة قصيرة: ما عدد محاور

التماثل التي يمكن رسمها في صورة علم مملكة البحرين؟



التماثل للشكل الآتي؟




إحداثيات رؤوس المثلث JKL هي: $J(1, 5)$, $K(3, 1)$, $L(5, 7)$ مثل بيانيًا وصورته الناتجة عن التحويل الهندسي المركب المحدد في كلٍ من السؤالين الآتيين: (الدرس 4-3)


(42) إزاحة مقدارها 7 وحدات إلى اليسار ووحدة واحدة إلى أعلى، ثم انعكاس حول المحور y .

(43) إزاحة مقدارها 7 وحدات إلى اليمين ووحدة واحدة إلى أسفل

عن دوران الشكل بزاوية 180° حول نقطة الأصل؟ (الدرس 3-3)



(44) بيّن الشكل المجاور للشكل رباعي $QRST$ في المستوى الإحداثي، ما صورة النقطة R الناتجة عن دوران الشكل بزاوية 180° حول نقطة الأصل؟ (الدرس 3-3)



استعد للدرس اللاحق

إذا كان $ABCD \sim WXYZ$ ، فأوجد كلاً مما يلي:

(45) معامل تشابه $ABCD$ إلى $WXYZ$

WZ (48)

YZ (47)

XY (46)

التمدد

Dilations

3-6

المادة

فيما سبق:

درست رسم صورة
ناتجة عن تكبير شكل أو
تصغيره.

(مهارة سابقة)

والآن:

رسم الصورة الناتجة
عن التمدد باستعمال
المسطرة.

رسم الصورة الناتجة
عن التمدد في المستوى
الإحداثي.

المفردات:

التمدد

dilation

تحويل التشابه

similarity transformation

معامل مقياس التمدد

scale factor of dilation



يبينما يستعمل كثيرون آلات التصوير الرقمية، إلا أنه لا زال بعض المصورين يفضلون استعمال الفيلم وآلات التصوير التقليدية لإنتاج مسودات الصور، ومن هذه المسودات يكون المصورون صوراً بقياساتٍ مختلفة.

رسم التمدد: التمدد هو تحويل هندسي يكتب الشكل أو يصغره بنسبة محددة هي نسبة أحد أطوال الصورة إلى الطول المناظر لها في الشكل الأصلي. وتسمى هذه النسبة **معامل مقياس التمدد**. ولأن الصورة الناتجة عن التمدد تشبه الشكل الأصلي، فإن التمدد نوع من أنواع **تحوييلات الشابه**. ويتم تحديد التمدد بمعرفة مركز التمدد ومعامله.

مفهوم أساسى

مطوبتك

التمدد

التمدد الذي مركزه C ومعامله هو العدد الموجب k ، حيث $k \neq 1$ ، ينقل النقطة P في شكل ما إلى صورتها P' ، بحيث:

- إذا انطبقت النقطة P على مركز التمدد C ، فإن صورتها هي النقطة P' نفسها.
- إذا لم تنطبق النقطة P على مركز التمدد C ، فإن صورتها P' تقع على \overleftrightarrow{CP} ، ويكون $CP' = k(CP)$.

صورة $\triangle LMP'$ هو **النتاج** عن التمدد الذي مركزه C ومعامله 2.5

مثال 1

استعمل مسطرة لرسم صورة $\triangle ABC$ الناتجة عن التمدد الذي مركزه النقطة D ، ومعامله $\frac{1}{2}$

الخطوة 1: ارسم من D أنصاف المستقيمات $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}$.

الخطوة 2: عين A' على \overrightarrow{DA} ، بحيث يكون $DA' = \frac{1}{2} DA$ ، بحيث يكون A' على \overrightarrow{DB} و C' على \overrightarrow{DC} .

الخطوة 3: عين B' على \overrightarrow{DB} و C' على \overrightarrow{DC} بالطريقة نفسها ثم ارسم $\triangle A'B'C'$.

تحقق من فهمك

استعمل مسطرة لرسم صورة الشكل الناتجة عن التمدد الذي مركزه النقطة J ، ومعامله العدد k المحدد في كل مما يأتي:

M J L $k = 0.75$ (1B)

X J V Z Y $k = \frac{3}{2}$ (1A)

وزارة التعليم

Ministry of Education

2022 - 1444


الفصل 3 التحويلات الهندسية والتماثل 160

من تعريف معامل مقياس التمدد، تجد أنه إذا كان معامل مقياس التمدد k أكبر من 1 ، فإن أبعاد الصورة أكبر من الأبعاد المناظرة لها في الشكل الأصلي وعندها يكون التمدد تكبيرًا. وإذا كان $0 < k < 1$ ، فإن أبعاد الصورة تكون أصغر من الأبعاد المناظرة لها في الشكل الأصلي، وعندها يكون التمدد تصغيرًا. وبما أن $\frac{1}{2}$ يقع بين 0 و 1 ، فإن التمدد في المثال 1 تصغير.

ويسمى التمدد الذي معامله 1 تمددًا مطابقًا؛ إذ يكون الشكل الأصلي وصورته متطابقين.

إيجاد معامل مقياس التمدد

مثال 2 من واقع الحياة



تصوير: لإنتاج صور كبيرة، يمكن أن تُعدّل المسافة بين مسودة الصورة والصورة المكبرة باستعمال جهاز تكبير الصور.

افتراض أن المسافة CP بين مصدر الضوء PP' والصورة C متساوية 45 mm ، ما المسافة $X'Y'$ التي يلزم أن يُعدّل إليها جهاز تكبير الصور للحصول على صورة عرضها $XY = 35 \text{ mm}$ ؟

فهم: المعطيات: مركز التمدد C ، $XY = 35 \text{ mm}$ ، $X'Y' = 22.75 \text{ cm} = 227.5 \text{ mm}$

$$CP = 45 \text{ mm}$$

المطلوب: إيجاد PP'

خطٌ: أوجد معامل مقياس التمدد من الشكل الأصلي XY إلى

الصورة $X'Y'$ واستعمله لإيجاد CP' ، ثم استعمل CP و CP' لإيجاد PP' .

حلٌ: معامل مقياس التمدد هو نسبة أحد أطوال الصورة إلى الطول المناظر له في الشكل الأصلي .

معامل مقياس تمدد الصورة

$$k = \frac{\text{طول الصورة}}{\text{طول الأصل}}$$

طول الصورة يساوي $X'Y'$ ، وطول الأصل يساوي XY

$$= \frac{X'Y'}{XY}$$

بالتعمير والقسمة

$$= \frac{227.5}{35} = 6.5$$

استعمل معامل مقياس التمدد لإيجاد CP' .

تعريف التمدد

$$CP' = k(CP)$$

$$k = 6.5 , CP = 45$$

$$= 6.5(45)$$

بالضرب

$$= 292.5$$

استعمل $CP + PP'$ لإيجاد PP'

مسلمة جمع القطع المستقيمة

$$CP + PP' = CP'$$

$$CP = 45 , CP' = 292.5$$

$$45 + PP' = 292.5$$

طرح 45 من الطرفين

$$PP' = 247.5$$

يجب أن يُعدل جهاز تكبير الصور، بحيث تكون المسافة PP' بين المسودة والصورة المكبرة 247.5 mm أو 24.75 cm



تحقق:

بما أن هذا التمدد تكبير، إذن يجب أن يكون معامله أكبر من 1، وبما أن $6.5 > 1$ فإن معامل مقياس التمدد معقول . ✓

إرشادات لحل المسألة

استعمال التقدير:

لتتجنب الأخطاء غير

المقصودة في حساباتك،

قدر إجابة السؤال

قبل الشروع في الحل.

يمكنك أن تقدر معامل

قياس التمدد في

المثال 2 بحوالي $\frac{240}{40} = 6$

أو 6 وبذلك يكون PP'

(50) أي 300 تقريرياً.

ويكون $PP' = 250 \text{ mm}$

أو 25 cm


والإجابة 24.7 cm

قريبة من الإجابة

المقدرة: لهذا فإن

الإجابة معقولة.

تحقق من فهمك



- 2) حدد ما إذا كان التمدد من الشكل Q إلى Q' تكبيراً أم تصغيراً، ثم أوجد معامل مقياس التمدد، وقيمة x .

إرشادات للدراسة


معامل التمدد السالب:
يمكن أن يكون معامل التمدد سالباً، وستستقصي هذا النوع من التمدد في السؤال .26

أضف إلى مطويتك

التمدد في المستوى الإحداثي

مفهوم أساسى

مثال :



التعبير اللفظي: لإيجاد إحداثيات الصورة الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل، اضرب الإحداثيين x, y لكل نقطة في الشكل الأصلي في معامل مقياس التمدد k .


الرموز: $(x, y) \rightarrow (kx, ky)$

الرموز: $(x, y) \rightarrow (kx, ky)$

مثال 3

التمدد في المستوى الإحداثي

إحداثيات رؤوس الشكل الرباعي $JKLM$ هي: $J(-2, 4), K(-2, -2), L(-4, -2), M(-4, 2)$. مثل بيانياً $JKLM$ وصورته الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل، ومعامله 2.5 اضرب الإحداثيين x و y لكل رأس في معامل التمدد 2.5



(x, y)	\rightarrow	$(2.5x, 2.5y)$
$J(-2, 4)$	\rightarrow	$J'(-5, 10)$
$K(-2, -2)$	\rightarrow	$K'(-5, -5)$
$L(-4, -2)$	\rightarrow	$L'(-10, -5)$
$M(-4, 2)$	\rightarrow	$M'(-10, 5)$

مثل بيانياً $J'K'L'M'$ وصورته

تحقق من فهمك

مثل المضلع المعطاة إحداثيات رؤوسه بيانياً، ثم مثل صورته الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل، ومعامله العدد k المحدد في كل من السؤالين الآتيين:



$$k=2; A(2, 1), B(0, 3), C(-1, 2), D(0, 1) \quad (3B)$$

$$k=\frac{1}{3}; Q(0, 6), R(-6, -3), S(6, -3) \quad (3A)$$

استعمل مسطرةً لرسم صورة الشكل الناتجة عن تمددٍ مرکزه النقطة M ومعامله العدد k المحدد في كُلٌّ من السؤالين الآتيين:

$$k = 2 \quad (2)$$





$$k = \frac{1}{4} \quad (1)$$



المثال 1

(3) حدد ما إذا كان التمدد من الشكل B إلى الشكل B' تكبيرًا أم تصغيرًا، ثم أوجد معامله وقيمة x .

المثال 2



(4) **أحياء:** طول مخلوق حيٌّ دقيق وحيد الخلية

50 ميكرون، ويظهر طوله تحت المجهر 200 mm

إذا كان 1000 ميكرون = 1 mm، فما قوة التكبير (معامل مقياس التمدد) المستعملة؟ وضح إجابتك.

مثل المضلع المعطاة إحداثيات رؤوسه بيانياً، ثم مثل صورته الناتجة عن تمددٍ مرکزه نقطة الأصل ومعامله العدد k المحدد في كُلٌّ من الأسئلة الآتية:

المثال 3

$$k = 1.5 ; W(0, 0), X(6, 6), Y(6, 0) \quad (5)$$

$$k = \frac{1}{2} ; Q(-4, 4), R(-4, -4), S(4, -4), T(4, 4) \quad (6)$$


$$k = 2 ; A(-1, 4), B(2, 4), C(3, 2), D(-2, 2) \quad (7)$$

$$k = \frac{3}{4} ; J(-2, 0), K(2, 4), L(8, 0), M(2, -4) \quad (8)$$

تدريب وحل المسائل

استعمل مسطرةً لرسم صورة الشكل الناتجة عن تمددٍ مرکزه النقطة S ومعامله العدد k المحدد في كُلٌّ من الأسئلة الآتية:


$$k = 2.25 \quad (11)$$



$$k = \frac{1}{3} \quad (10)$$




$$k = \frac{5}{2} \quad (9)$$




حدّد ما إذا كان التمدد من الشكل W إلى الشكل W' تكبيرًا أم تصغيرًا، ثم أوجد معامله وقيمة x .

المثال 1

(13)



(12)



المثال 2

حشرات: طول كلّ من الحشرتين الآتيتين كما تُرى تحت المجهر مكتوب على الصورة. إذا علمت طول الحشرة الحقيقي، فأوجد قوة التكبير المستعملة، ووضح إجابتك.



(15)



(14)

مثل بيانياً المضلعل وصورته الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل ومعامله العدد k المحدد في كلّ من الأسئلة الآتية:


$$k = 0.5 ; J(-8, 0), K(-4, 4), L(-2, 0) \quad (16)$$

$$k = 0.75 ; D(4, 4), F(0, 0), G(8, 0) \quad (17)$$

$$k = 3 ; W(2, 2), X(2, 0), Y(0, 1), Z(1, 2) \quad (18)$$

المثال 3

(19) هندسة إحداثية: استعمل التمثيل البياني للمضلعل $FGHJ$ للإجابة عمّا يلي:




a) مثل بيانياً صورة $FGHJ$ الناتجة عن تمدد معامله $\frac{1}{2}$ ومركزه نقطة الأصل، ثم انعكاس حول المحور y .

b) نفذ التحويل المركب في الفرع a بعكس الترتيب.

c) هل يؤثر ترتيب التحويلين الهندسيين هنا في الصورة النهائية؟

d) هل يؤثر ترتيب تركيب التمدد والانعكاس في الصورة النهائية دائماً أو أحياناً أو أنه لا يؤثر عليها أبداً؟




(20) رسم: يرسم سليمان صورةً باستعمال طريقة المربعات، فيوضع شبكة إحداثية شفافة طول وحدتها $\frac{1}{4} \text{ cm}$ فوق صورة أبعادها $4 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ ، ويوضع شبكةً آخر طول وحدتها $\frac{1}{2} \text{ cm}$ على ورقة رسم أبعادها $8 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$ ثم يرسم ما يحيوه كل مربع من الصورة في المربع المناظر له على ورقة الرسم.

a) ما معامل مقياس هذا التمدد؟

b) ما طول وحدة الشبكة التي يتعين عليه استعمالها لرسم صورة قياسها 10 أمثال قياس الصورة الأصلية؟

c) كم تكون مساحة الرسم الناتج عن صورة أبعادها $5 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$ عند استعمال شبكة وحدتها 2 cm على لوحة الرسم؟



(21) تغيير الأبعاد: يمكن إجراء تمدد على الأشكال الثلاثية الأبعاد أيضاً.

a) أوجد مساحة سطح المنشور المجاور وحجمه.

b) أوجد مساحة سطح المنشور الناتج عن تمدد معامله 2، وأوجد حجمه.


c) أوجد مساحة سطح المنشور الناتج عن تمدد معامله $\frac{1}{2}$ ، وأوجد حجمه.

d) أوجد نسبة مساحة سطح المنشور الناتج عن كل تمدد إلى مساحة سطح المنشور الأصلي، ثم أوجد نسبة حجم المنشور الناتج عن كل تمدد إلى حجم المنشور الأصلي.



e) ضع تخميناً حول أثر التمدد ذي المعامل الموجب في مساحة سطح المنشور وفي حجمه.


(22) **هندسة إحداثية:** استعمل التمثيل البياني المجاور للإجابة عمّا يأتي:



a) مثل بيانياً صورة $\triangle DEF$ الناتجة عن تمدد مركزه النقطة D ومعامله 3

b) عَبَرْ عن هذا التمدد بتركيب تحويلين هندسيين، أحدهما تمدد مركزه نقطة الأصل ومعامله 3

(23) **صحة:** استعمل فقرة الربط مع الحياة المجاورة للإجابة عن السؤالين الآتيين:



a) ينفع الطبيب بالون القسطرة في الشريان التاجي للمرأة مكثراً باللون كما يتضح في الشكل المجاور.
أوجد معامل هذا التمدد.

b) أوجد مساحة المقطع العرضي للبالون قبل الفخ وبعده.


أعطي في كلٍ من السؤالين الآتيين الشكل الأصلي وصورته الناتجة عن تمدد مركزه النقطة P ، عِين موقع النقطة P ، وأجد معامل مقياس التمدد.



(25)



(24)



الربط مع الحياة

عندما يضيق الشريان التاجي الذي ينقل الدم إلى القلب بسبب تراكم الكوليسترول، يمكن توسيعه باستخدام أنبوب أجوف مرن في نهايته بالون صغير، وتسمى هذه العملية قسطرة البالون.

(26) **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة ستنقصي التمدد الذي مركزه نقطة الأصل ومعامله سالب.

a) هندسياً: مثل بيانياً $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه $A(2, 0)$, $B(2, -4)$, $C(4, 2)$. ثم ارسم صورته الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل ومعامله -2 .

b) هندسياً: ارسم صورة المثلث الناتجة عن تمدد معامله $-\frac{1}{2}$ ، وآخر معامله -3

c) جدولياً: اكتب إحداثيات صورة المثلث الناتجة عن كل تمدد في جدول.



d) لفظياً: ضع تخميناً حول قاعدة التمدد الذي مركزه نقطة الأصل ومعامله سالب.

e) تحليلياً: اكتب قاعدة التمدد الذي مركزه نقطة الأصل ومعامله k .

f) لفظياً: عَبَرْ عن التمدد الذي مركزه نقطة الأصل ومعامله سالب بتحويل هندسي مركب.

مسائل مهارات التفكير العليا

(27) **اكتشف الخطأ:** يحاول كل من متعب وسعود أن يصف تأثير القيمة السالبة لمعامل مقياس التمدد في صورة الشكل الرباعي $WXYZ$ ، فأيهما تفسيره صحيح؟ اشرح تبريرك.



(28) **تحد:** أوجد معادلة صورة المستقيم $y = 4x - 2$ الناتجة عن تمدد مركزه نقطة الأصل ومعامله 1.5

(29) **اكتب:** هل تحفظ التحويلات الهندسية جميعها التوازي والاستقامة؟ اشرح إجابتك.

(30) مسألة مفتوحة: ارسم مثلثًا في المستوى الإحداثي، ثم كُبّره بحيث تصبح مساحة صورته الناتجة عن التمدد أربعة أمثال مساحته الأصلية، وحدد معامل مقاييس التمدد ومركزه.


(31) اكتب: حدد التحويلات الهندسية التي تكون نتيجتها مطابقة للشكل الأصلي، وتلك التي تكون نتيجتها مشابهة للشكل الأصلي، وتلك التي تكون نتيجتها الشكل الأصلي نفسه. اشرح إجابتك.

تدريب على اختبار

(33) يرسم توفيق نسخةً من لوحة فنية معروضة في متحف فني. إذا كان عرض اللوحة 3 ft ، وطولها 6 ft ، وقرر أن يستعمل معامل مقاييس تمدد قدره 0.25 ، فما أبعاد ورقة الرسم بالبوصات المناسبة لإنجاز رسمه؟


- 6 in \times 12 in **C** 4 in \times 8 in **A**
10 in \times 20 in **D** 8 in \times 16 in **B**

(32) ما معامل مقاييس التمدد من الشكل $PQRS$ إلى الشكل $WXYZ$ ؟



مراجعة تراكمية

بين ما إذا كان للشكل محور تماثل أم لا، وإذا كان كذلك فارسم محاور التماثل جميعها، وحدد عددها في كلٍ مما يأتي: (الدرس 3-5)



(36)




(35)




(34)

صف التحويل الهندسي المركب الذي ينقل الشكل إلى صورته النهائية في كلٍ من السؤالين الآتيين : (الدرس 3-4)



(38)



(37)

استعد للدرس اللاحق

أوجد قيمة x في كلٍ من الأسئلة الآتية:



$$\frac{336.4}{x} = \pi \quad (42)$$

$$228.4 = \pi x \quad (41)$$

$$\frac{108.6}{\pi} = x \quad (40)$$

$$58.9 = 2x \quad (39)$$

دليل الدراسة والمراجعة

ملخص الفصل

المفاهيم الأساسية

الانعكاس (الدرس 3-1)

- الانعكاس هو تحويل هندسي يقلب الشكل حول مستقيم يُسمى محور الانعكاس.

الإزاحة (الانسحاب) (الدرس 3-2)

- الإزاحة (الانسحاب) هي تحويل هندسي ينقل نقاط الشكل جميعها المسافة نفسها وفي الاتجاه نفسه.

الدوران (الدرس 3-3)

- يحرّك الدوران كل نقطة في الشكل الأصلي بزاوية محددة وفي اتجاه محدد حول نقطة ثابتة.

تركيب التحويلات الهندسية (الدرس 3-4)

- يمكن تمثيل الإزاحة بتركيب انعكاسين متتابعين حول مستقيمين متوازيين، ويمكن تمثيل الدوران بتركيب انعكاسين متتابعين حول مستقيمين متقاطعين.

التماثل (الدرس 3-5)

- التمايز: يكون الشكل مماثلاً إذاً وجد انعكاس أو إزاحة أو دوران أو تركيب إزاحة وانعكاس ينتج عنه صورة منتظمة على الشكل نفسه.

- رتبة التمايز هي عدد المرات التي ينطبق فيها الشكل على نفسه في أثناء تدويره من 0° إلى 360° اسم (مقدار التمايز ، رتبة التمايز).

- مقدار التمايز هو قياس أصغر زاوية يدور بها الشكل حتى ينطبق على نفسه.

التمدد (الدرس 3-6)

- يكبير التمدد الشكل أو يصغره بنسبة محددة.

المطويات منظم أفكار

تأكد من أن المفاهيم الأساسية مدونة في مطويتك.

- يكون للشكل (محور تماثل ، تماثل دوراني) إذا كانت صورته الناتجة عن دوران حول مركزه بزاوية بين 0° و 360° هي الشكل نفسه.

Ministry of Education

2022 - 1444

الفصل 3 دليل الدراسة والمراجعة

167

مراجعة الدراسات والمراجعة


3-1 الانعكاس (ص 125-118)

مثال 1

مثل بيانيًا $\triangle JKL$ الذي إحداثيات رؤوسه: $J(1, 4), K(2, 1), L(6, 2)$ ، ومثل صورته بالانعكاس حول المحور x .

اضرب الإحداثي y لكل رأس في -1

$$\begin{array}{ll} (x, y) & \rightarrow (x, -y) \\ J(1, 4) & \rightarrow J'(1, -4) \\ K(2, 1) & \rightarrow K'(2, -1) \\ L(6, 2) & \rightarrow L'(6, -2) \end{array}$$



ثم مثل بيانيًا $\triangle JKL'$ وصورته.

مثل بيانيًا كل شكل مما يأتي وصورته بالانعكاس المحدد.

(11) المستطيل $ABCD$ الذي إحداثيات رؤوسه:

$A(2, -4), B(4, -6), C(7, -3), D(5, -1)$

الانعكاس حول المحور x .


(12) المثلث XYZ الذي إحداثيات رؤوسه: $X(-1, 1), Y(-1, -2), Z(3, -3)$ ؛ الانعكاس حول المحور y .

(13) الشكل الرباعي $QRST$ الذي إحداثيات رؤوسه:

$Q(-4, -1), R(-1, 2), S(2, 2), T(0, -4)$

بالانعكاس حول المستقيم $y = x$.

(14) فن: يصنع عامر منحوتين ليضعهما على جانبي ممرين في حديقة منزله، بحيث تكون إحداهما انعكاًسًا للأخرى حول المستقيم الذي يقسم هذا الممر طولياً إلى نصفين. انسخ الشكل في دفترك، وارسم محور الانعكاس.




مثال 2

مثل بيانيًا $\triangle XYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه: $X(2, 2), Y(5, 5), Z(5, 3)$ ، وارسم صورته الناتجة عن إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليسار و 5 وحدات إلى أسفل.

يمكن تمثيل هذه الإزاحة بالقاعدة $(x, y) \rightarrow (x-3, y-5)$.
أو جد صورة كل رأس.

$$\begin{array}{ll} (x, y) & \rightarrow (x-3, y-5) \\ X(2, 2) & \rightarrow X'(-1, -3) \\ Y(5, 5) & \rightarrow Y'(2, 0) \\ Z(5, 3) & \rightarrow Z'(2, -2) \end{array}$$

ثم مثل بيانيًا $\triangle X'YZ'$ وصورته.




3-2 الانسحاب (ص 131-126)

(15) مثل بيانيًا $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه:

$A(0, -1), B(2, 0), C(3, -3)$ ، وارسم صورته الناتجة

عن إزاحة مقدارها 5 وحدات إلى اليسار و 4 وحدات إلى أعلى.

(16) انقل إلى دفترك الشكل المجاور ثم ارسم صورة الشكل $QRST$ الناتجة عن الإزاحة التي تنقل A إلى B .



(17) يمثل الشكل المجاور موقع 5 لاعبين في ملعب، تحرك كل من اللاعبين B, F, C وحدتين إلى أسفل، في حين تحرك اللاعب A خمس وحدات إلى اليمين ووحدة واحدة إلى أسفل. ارسم الموقع النهائي لللاعبين.

3-3

الدوران (ص 133-138)

مثال 3

مثل بيانياً $\triangle ABC$ وصورته الناتجة عن دوران بزاوية 270° حول نقطة الأصل، حيث: $A(-4, 0), B(-3, 4), C(-1, 1)$. إحدى طرائق حل هذه المسألة هي إجراء دوران بزاوية 180° ، ثم دوران آخر بزاوية 90° ؛ لذا أضرب الإحداثيين y, x في -1 .


$$(x, y) \rightarrow (-x, -y)$$

$$A(-4, 0) \rightarrow A'(4, 0)$$

$$B(-3, 4) \rightarrow B'(3, -4)$$

$$C(-1, 1) \rightarrow C'(1, -1)$$

ثم أضرب الإحداثي y لكأس في -1 ، وبذل موقعي الإحداثيين x, y .



$$(x, y) \rightarrow (-y, x)$$

$$A'(4, 0) \rightarrow A''(0, 4)$$


$$B'(3, -4) \rightarrow B''(4, 3)$$

$$C'(1, -1) \rightarrow C''(1, 1)$$

مثل بيانياً $\triangle ABC$

وصورته $\triangle A''B''C''$.

(18) استعمل منقلةً ومسطراً لرسم صورة $CDEF$ الناتجة عن دوران بزاوية 50° حول النقطة P .



مثل بيانياً الشكل وصورته الناتجة عن الدوران بالزاوية المحددة حول نقطة الأصل في كل مما يأتي:

(19) $\triangle MNO$ الذي إحداثيات رؤوسه: $180^\circ; M(-2, 2), N(0, -2), O(1, 0)$

(20) الذي إحداثيات رؤوسه: $90^\circ; D(1, 2), G(2, 3), F(1, 3)$

3-4

تركيب التحويلات الهندسية (ص 141-148)

مثال 4

إحداثيات طرفي \overline{RS} هما $(1, 1), R(4, 3)$ ، $S(1, 1)$ مثل بيانياً \overline{RS} وصورتها الناتجة عن إزاحة مقدارها 5 وحدات إلى اليسار ووحدة واحدة إلى أسفل، ثم دوران حول نقطة الأصل بزاوية 180° .

الخطوة 1: يمكن التعبير عن الإزاحة بالقاعدة $(x, y) \rightarrow (x-5, y-1)$

$$(x, y) \rightarrow (x-5, y-1)$$

$$R(4, 3) \rightarrow R'(-1, 2)$$


$$S(1, 1) \rightarrow S'(-4, 0)$$

الخطوة 2: الدوران حول نقطة الأصل بزاوية 180°

$$(x, y) \rightarrow (-x, -y)$$

$$R'(-1, 2) \rightarrow R''(1, -2)$$

$$S'(-4, 0) \rightarrow S''(4, 0)$$




الخطوة 3: مثل بيانياً \overline{RS} وصورتها $\overline{R''S''}$.

مثل بيانياً الشكل وصورته الناتجة عن التحويل الهندسي المركب المحدد في كل مما يأتي:

(21) \overline{CD} ، حيث $C(3, 2), D(1, 4)$ ، انعكاس حول المستقيم $y=x$ ، ثم دوران 270° حول نقطة الأصل.

(22) \overline{GH} ، حيث $G(-2, -3), H(1, 1)$ ، إزاحة مقدارها 4 وحدات إلى اليمين ووحدتان إلى أعلى، ثم انعكاس حول المحور x .

(23) **أنماط:** كون عبد السلام النمط الآتي لإطار لوحة، صرف تركيب التحويلات الهندسية الذي استعمله لتكون هذا النمط.



التماثل (ص 154-159)

مثال 5

بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الشَّكْلُ الْأَتَى مُتَمَاثِلًا حَوْلَ مَسْتَوٍ أَوْ حَوْلَ محور أو كلاهما أو غير ذلك.



المصباح متماثل حول مستوى، وكذلك حول محور.




بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ لِلشَّكْلِ مَحَورٌ تَمَاثِلٌ أَمْ لَا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَأَرْسِمْ مَحَورَ التَّمَاثِلِ جَمِيعَهَا، وَحَدِّدْ عَدْدَهَا.

(25)



(24)




بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ لِلشَّكْلِ تَمَاثِلٌ دُوْرَانِيٌّ أَمْ لَا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَعِينْ مَرْكُزَ التَّمَاثِلِ، وَحَدِّدْ رَتْبَهُ وَمَقْدَارَهُ فِي كُلِّ مَمَّا يَأْتِي:

(27)



(26)



التمدد (ص 160-166)

مثال 6

مثلاً بِيَانِيَ الشَّكْل $ABCD$ وصُورَتِه النَّاتِجَةُ عَنْ تَمَدُّدِ مَرْكَزِه نَقْطَةِ الْأَصْلِ . $A(0, 0)$, $B(0, 8)$, $C(8, 8)$, $D(8, 0)$ ، إِذَا كَانَتْ: 0.5 ، معامله 0.5 ، إِذَا كَانَتْ: 0.5

اضرب الإحداثيين y , x لكل رأس في معامل مقياس التمدد 0.5

$$(x, y) \rightarrow (0.5x, 0.5y)$$


$$A(0, 0) \rightarrow A'(0, 0)$$

$$B(0, 8) \rightarrow B'(0, 4)$$

$$C(8, 8) \rightarrow C'(4, 4)$$

$$D(8, 0) \rightarrow D'(4, 0)$$


مثلاً $ABCD$ وصُورَتِه $A'B'C'D'$ بِيَانِيَ.



(28) استعمل مسطرة لرسم صورة الشكل الناتجة عن تمدد مركزه S ومعامله $k = 1.25$.



(29) حدد ما إذا كان التمدد من الشكل W إلى W' تكبيرًا أم تصغيرًا، ثم أوجد معامل مقياس التمدد وقيمة x .



(30) **نوادٍ علمية:** استعمل أعضاء نادي الرياضيات جهاز العرض لرسم لوحة على الجدار، إذا كان عرض اللوحة الأصلي 6 in ، وعرض صورتها على الجدار 4 ft ، فما معامل التكبير؟

الفصل 3

اختبار الفصل


مثل بانيّ الشكل وصورته الناتجة عن التحويل الهندسي المحدد في كلٌ مما يأتي:

(9) $\square FGHJ$ ، حيث: $F(-1, 4), G(4, 4), H(3, 1), J(-2, 1)$ انعكاس حول المحور x .


(10) $\triangle ABC$ ، حيث: $A(0, -1), B(2, 0), C(3, -3)$ ؛ إزاحة مقدارها 5 وحدات إلى اليسار و4 وحدات إلى أعلى.

(11) الشكل الرباعي $WXYZ$ ، حيث: $W(2, 3), X(1, 1), Y(3, 0), Z(5, 2)$ ؛ دوران بزاوية 180° حول نقطة الأصل.

رسم صورة الشكل الناتجة عن الإزاحة التي تنقل P إلى P' في كلٌ من السؤالين الآتيين:



(14) **أثاث:** يبيّن الشكل الآتي مخطط موقع أثري، فما رتبة تماثل الحلقـة الخارجية؟ وما مقداره؟




(15) **اختبار من متعدد:** ما التحويل الهندسي أو تركيب التحويلات الهندسية الذي يمثّل الشكل الآتي؟




- A** تمدد
- B** إزاحة ثم انعكاس
- C** دوران
- D** إزاحة

رسم صورة كلٌ من الشكـلين الآتـين بالانعـكـاس حول المستـقيم المعـطـي:



(3) **حدائق:** يريد فؤاد أن يكـبر الصـورة الآتـية للحدـيقـة؛ لـتصـبـح أبعـادـها 6 in في 4 in ، مستـعمـلاً آلـة نـسـخـ تـكـبـرـ الصـورـةـ حـتـى 150% فقط وـيـنـسـبـ عـلـىـ شـكـلـ كـلـيـةـ، أـوـجـدـ نـسـبـيـنـ عـلـىـ شـكـلـ عـدـدـيـنـ كـلـيـيـنـ يـمـكـنـ استـعـمـالـهـاـ لـتكـبـيرـ الصـورـةـ، بـحـيثـ تـصـبـحـ أـبعـادـهاـ أـقـرـبـ مـاـ يـمـكـنـ إـلـىـ 6 in في 4 in ، وـلـاـ تـزـيدـ عـنـ ذـلـكـ.




استـعـمـلـ مـسـطـرـةـ لـرسـمـ صـورـةـ الشـكـلـ النـاتـجـ عـنـ تمـددـ مرـكـزـهـ M وـمـعـاملـهـ k المـحدـدـ فيـ كـلـ مـنـ السـؤـالـيـنـ الآـتـيـيـنـ:

$$k = \frac{1}{3} \quad (5)$$




$$k = 1.5 \quad (4)$$



(6) **مدينة الألعاب:** يركب أحمد في إحدى الألعاب التي تدور عـكـسـ اـتـجـاهـ حـرـكـةـ عـقـارـبـ السـاعـةـ حـولـ مـرـكـزـهـ 60° كـلـ ثـانـيـيـنـ، فـبـعـدـ كـمـ ثـانـيـةـ يـعـودـ أـحـمـدـ إـلـىـ النـقـطـةـ التـيـ اـنـطـلـقـ مـنـهـ؟

بـيـنـ مـاـ إـذـاـ كـانـ كـلـ مـنـ الشـكـلـيـنـ الآـتـيـيـنـ مـتـمـاثـلـاـ حـولـ مـسـتـوـيـ أوـ حـولـ محـورـ أوـ كـلـاهـمـاـ أوـ غـيرـ ذـلـكـ.



الحل عكسياً



في معظم المسائل تُعطى مجموعة من الشروط أو الحقائق، ويُطلب إليك إيجاد النتيجة النهائية. ومع ذلك قد تُعطى في بعض المسائل النتيجة النهائية، ويطلب إليك إيجاد أمر ما وقع مبكراً في موقف المسألة. ولحل مثل هذه المسائل، يتبعن عليك أن تستعمل استراتيجية الحل عكسياً.

استراتيجيات الحل عكسياً

الخطوة 1

ابحث عن كلمات مفتاحية تشير إلى أنه يلزم أن تحل المسألة عكسياً.

بعض الكلمات المفتاحية الممكنة:

- ماذا كان المقدار الأصلي ...؟
- ماذا كانت القيمة قبل ...؟
- ماذا كان المقدار في البداية ...؟

الخطوة 2

تراجع عن الخطوات المعطاة في نص المسألة.

- اكتب قائمة بالخطوات المتتابعة من البداية، وصولاً إلى النتيجة النهائية.
- ابدأ من النتيجة النهائية، وتتبع الخطوات بترتيب عكسيٍّ.
- ”تراجع“ عن كل خطوة باستعمال العمليات العكسية حتى تصل إلى القيمة الأصلية.

الخطوة 3

تحقق من الحل إذا سمح الوقت.

• تأكد من أن إجابتك منطقية.

- ابدأ من إجابتك وتابع الخطوات بالترتيب المُعطى في المسألة؛ لتأكد من الوصول إلى النتيجة النهائية نفسها.

مثال

سلم تقدير	
الدرجة	المعيار
2	صحيح كاملاً: الإجابة صحيحة، ومعها تفسير تام يوضح كل خطوة من خطوات الحل.
1	صحيح جزئياً: <ul style="list-style-type: none"> • الإجابة صحيحة، ولكن التفسير غير تام. • الإجابة غير صحيحة، ولكن التفسير صحيح.
0	غير صحيح مطلقاً: لا توجد إجابة، أو أنها غير منطقية.

حل المسألة الآتية، وبيّن خطوات الحل، وستصحح الإجابة، وتحدد الدرجة المستحقة باستعمال سلم تقدير الإجابات القصيرة المجاور.

تستعمل سعاد برمجية حاسوبية؛ لتتدرّب على التحويلات الهندسية في المستوى الإحدائي. بدأت من نقطة وأزاحتها 4 وحدات إلى أعلى و8 وحدات إلى اليسار. ثم أجرت انعكاساً للصورة الناتجة حول المحور x . وأخيراً أجرت تمدداً للصورة الناتجة معامله 0.5، ومركزه نقطة الأصل، فكانت إحداثيات الصورة النهائية (-4, -1). ماذا كانت الإحداثيات الأصلية لهذه النقطة؟

اقرأ المسألة بعناية. لقد أعطيت مجموعة تحويلات هندسية متعددة لنقطة في المستوى الإحداثي، وتعلم إحداثيات الصورة النهائية لهذه النقطة، وطلب إليك أن تجد الإحداثيات الأصلية. حُلّ المسألة بالعمل عكسياً؛ تراجع عن كل تحويل هندسي بترتيب عكسي؛ كي تجد الإحداثيات الأصلية.

مثال للإجابة التي تستحق درجتين:

النقطة الأصلية \rightarrow إزاحة \rightarrow انعكاس \rightarrow تمدد \rightarrow النتيجة النهائية.
ابداً بإحداثيات النتيجة النهائية وحُلّ عكسيًا.

للترابع عن التمدد الذي معامله 0.5 ، نفذ تمددًا معامله 2 : $(-1, -4) \rightarrow (-1 \times 2, -4 \times 2) = (-2, -8)$


للترابع عن الانعكاس الأول، أوجد صورة النقطة بالانعكاس حول المحور x : $(-2, -8) \rightarrow (-2, 8)$

للترابع عن الإزاحة الأولى، نفذ إزاحة مقدارها 4 وحدات إلى أسفل و8 وحدات إلى اليمين: $(-2 + 8, 8 - 4) = (6, 4)$





إذن الإحداثيات الأصلية لهذه النقطة هي $(6, 4)$.

لقد كانت الخطوات والحسابات والتبريرات كلها واضحة في هذه الإجابة، وتوصل الطالب إلى الإجابة الصحيحة، ولذلك تستحق هذه الإجابة درجتين.

تمارين ومسائل



- 4) الشكل "S" يمثل الصورة النهائية الناتجة للشكل S ، بعد إجراء التحويلات الهندسية التالية عليه: انعكاس حول المحور y ، ثم انسحاب 3 وحدات إلى أسفل ووحدتين إلى اليمين.



حل كلًا من المسائل الآتية، وبين خطوات الحل، وستصحح الإجابات وتحدد الدرجة المستحقة باستعمال سلم تقدير الإجابة القصيرة الوارد في الصفحة السابقة.

- 1) حطت حشرة طائرة على شبكة إحداثية ثم قفزت عبر المحور x ، ثم قفزت عبر المحور y على هيئة انعكاسين متsequيين، ثم سارت 9 وحدات إلى اليمين و 4 وحدات إلى أسفل، فكان موقعها النهائي عند النقطة $(-1, 4)$ ، فما إحداثيات النقطة التي حطت عليها الحشرة في البداية؟

- 2) في الشبكة الإحداثية الآتية تظهر الصورة النهائية لنقطة تم تدويرها بزاوية 90° في اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة الأصل، ثم نفذ عليها تمدد معامله 2 ، ثم أزيحت 7 وحدات إلى اليمين. ماذا كانت إحداثيات الموضع الأصلي لهذه النقطة؟

- 3) إذا كانت $(A''B'') = (-5, -4), A''(2, -2)$ إحداثيات طرفي $\overline{A''B''}$ تمثل الصورة النهائية لـ \overline{AB} ، بعد إجراء انعكاس لها حول المحور x ، ثم إزاحة وفقاً للقاعدة: $(x, y) \rightarrow (x - 1, y + 2)$ فأي مما يأتي يمثل إحداثي نقطة متصرف \overline{AB} .


$(-\frac{1}{2}, -5)$ C $(\frac{-3}{2}, -3)$ A

$(-1, 0)$ D $(-\frac{1}{2}, 5)$ B



أسئلة الاختيار من متعدد

4) المعطيات: $a \parallel b$




أي العبارات الآتية تبرر استنتاج أن $\angle 2 \cong \angle 1$ ؟

A إذا كان $a \parallel b$ وقطعهما المستقيم t ، فإن الزاويتين المتبادلتين خارجيًا متطابقتان .


B إذا كان $a \parallel b$ وقطعهما المستقيم t ، فإن الزاويتين المتبادلتين داخليًا متطابقتان .

C إذا كان $a \parallel b$ وقطعهما المستقيم t ، فإن الزاويتين المتنااظرتين متطابقتان .

D إذا كان $a \parallel b$ وقطعهما المستقيم t ، فإن الزاويتين المتقابلتين بالرأس متطابقتان .



6) أي مما يأتي هو طول ضلع في المثلث المتطابق الضلعين DEF ؟



- | | |
|---------|--------|
| 9 cm C | 2 cm A |
| 11 cm D | 8 cm B |

7) أي المضلعات الآتية فيه زوجان فقط من الأضلاع الممتلبة المتطابقة؟




اقرأ كل سؤالٍ مما يأتي، ثم اكتب رمز الإجابة الصحيحة:


1) إحداثيات النقطة N هي (3, -4)، ما إحداثيات صورتها الناتجة عن الانعكاس حول المحور y ؟

- | | |
|----------------|---------------|
| $N'(4, 3)$ C | $N'(-3, 4)$ A |
| $N'(-4, -3)$ D | $N'(-4, 3)$ B |

2) أي الأشكال الآتية يبيّن نتيجة انعكاس الشكل p حول المستقيم m ثم إزاحة إلى أعلى؟



3) ما الزاوية التي تم تدوير الشكل الآتي بها حول مركز تماثله حتى تنتقل النقطة T إلى النقطة T' ؟



- | | |
|--------|--------|
| 135° C | 90° A |
| 225° D | 120° B |


إرشادات للاختبار

السؤال 3: كم رأساً لهذه التجمة؟ اقسم 360° على عدد الرؤوس؛ لإيجاد زاوية الدوران من نقطة إلى النقطة التالية.


أسئلة ذات إجابات قصيرة

اكتب إجابتك في ورقة الإجابة.

- (8) يبيّن ما إذا كان للشكل الآتي تماثل دوراني أم لا، وإذا كان كذلك، فعيّن مركز التماثل وحدد رتبته ومقداره.




- (9) مثل بيانياً الصورة الناتجة عن عمل تمدد للشكل الآتي مركزه نقطة الأصل ومعامله 1.5



- (10) أكمل العبارة الآتية:

”بحسب نظرية منصف الزاوية، إذا وقعت نقطة على منصف زاوية، فإنها“

- (11) ما صورة النقطة $A(-4, 3)$ الناتجة عن الإزاحة التي تنقل $B'(4, -3)$ إلى $B(-1, -2)$ ؟



- (12) ما قياس الزاوية الداخلية للمضلع الخماسي المنتظم؟

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟

إذا لم تستطع الإجابة عن السؤال..

14	15	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
3-3	مهارة سابقة	1-1	3-2	مهارة سابقة	3-6	3-5	1-6	مهارة سابقة	2-4	مهارة سابقة	3-3	3-4	3-1	فعد إلى الدرس..

الدائرة

Circle

فيما سبق:

درست أنواعاً من القطع المستقيمة الخاصة، وعلاقات الزوايا في المثلث.

والآن:

- أترى العلاقة بين الزوايا المركزية، والأقواس، والزوايا المحيطية في الدائرة.
- أعرّف القاطع والمماس وأستعملهما.
- أعرّف الدائرة أو أصفها؛ مستعملاً معادلتها.

لماذا؟

 علوم: الشكل الحقيقي لقوس المطر هو دائرة كاملة، ويُسمى الجزء الذي يمكن رؤيته منها فوق الأفق قوساً.



المطويات

منظم أفكار

الدائرة؛ اعمل هذه المطوية لمساعدتك على تنظيم ملاحظاتك حول الفصل 4، مبتدئاً بتسعة أوراق A4.

- ثبّت الأوراق من الجهة اليمنى  اكتب أرقام الدروس في أعلى الصفحة في بقية الأوراق.
- كما في الشكل، واتّب عنوان  الدائرة على الورقة الأولى.

- ارسم دائرة قطرها 18 cm  في كل ورقة باستعمال  الفرجار.





التهيئة للفصل 4

تشخيص الاستعداد:

أجب عن الاختبار الآتي. انظر المراجعة السريعة قبل الإجابة عن الاختبار.

مراجعة سريعة

اختبار سريع

مثال 1

أوجد قيمة 15% من 35

$$\text{تحويل النسبة المئوية} \quad 15\% = (0.15)(35)$$


إلى كسر عشري

$$\text{بالضرب} \quad = 5.25$$

إذن 15% من 35 تساوي 5.25

مثال 2

أوجد قيمة x مقبلاً لإجابتكم إلى أقرب عشرٍ.



نظرية فيثاغورس $a^2 + b^2 = c^2$

$$\text{ بالتعويض } x^2 + 8^2 = 15^2$$

$$\text{ بالتبسيط } x^2 + 64 = 225$$

خاصية الطرح للمساواة $x^2 = 161$

$$x = \sqrt{161} \approx 12.7$$

مثال 3

حل المعادلة: $x^2 + 3x - 40 = 0$ ، باستعمال القانون العام
مقدماً إجابتكم إلى أقرب عشرٍ.

$$\text{القانون العام } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\text{ بالتعويض } = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4(1)(-40)}}{2(1)}$$

$$\text{ بالتبسيط } = \frac{-3 \pm \sqrt{169}}{2}$$

$$\text{ بالتبسيط } = 5 \text{ أو } -8$$

أوجد النسبة المئوية من العدد المعطى في كلّ مما يأتي:


$$623 \text{ من } 500 \quad (2) \quad 50\% \quad (1)$$

$$180 \text{ من } 82 \quad (4) \quad 10\% \quad (3)$$


$$360 \text{ من } 90 \quad (6) \quad 65\% \quad (5)$$

(7) **مطعم:** يُضيف مطعم رسم توصيل قدره 5% على كل طلب. ما رسم خدمة توصيل وجبة غداء سعرها 65 ريالاً؟

(8) أوجد قيمة x ، مقدماً إجابتكم إلى أقرب عشر.



(9) **نجارة:** أراد أحمد أن يضع دعامة على لوح من الخشب، كما في الشكل أدناه. ما طول هذه الدعامة؟



حل كلّ من المعادلات الآتية باستعمال القانون العام مقدماً
إجابتكم إلى أقرب عشر إذا لزم ذلك.

$$5x^2 + 4x - 20 = 0 \quad (10)$$

$$x^2 = x + 12 \quad (11)$$

(12) **ألعاب نارية:** أطلقت ألعاب نارية في الهواء احتفاءً
باليوم الوطني، ولم تنفجر إحدى هذه الألعاب، فارتدى
إلى الأرض، إذا كان ارتفاعها عن سطح الأرض بعد t
ثانية يعطى بالمعادلة $d = 80t - 16t^2$ ، وبعد كم ثانية
وصلت سطح الأرض؟




الدائرة ومحيطها

Circle and Circumference

رابط الدرس الرئيسي



www.ien.edu.sa



إذا ركبت العجلة الدوّارة، فإن بُعدك عن مركز دورانها يكون ثابتاً، فإذا كانت المسافة بين موقعك ومركزها 44 ft ، فيمكنك أن تجد المسافة التي تقطعها في دورة واحدة.

القطع المستقيمة في الدائرة هي المحل الهندسي لجميع النقاط في المستوى، والتي تبعد ثابتاً عن نقطة معلومة تسمى **مركز** الدائرة. وعادة ما تسمى الدائرة بمركزها، والشكل المجاور يبين الدائرة C التي يمكن أن يرمز لها بالرمز $\odot C$.

وللقطع المستقيمة التي تقطع الدائرة أسماء خاصة.

فيما سبق:

درست عناصر الأشكال
الرباعية واستعملتها.

(مهارة سابقة)

والآن:

- أتعرف عناصر الدائرة
وأستعملها.
- أحل مسائل تتضمن
محيط الدائرة.

المفردات:

الدائرة

circle

المركز

center

نصف القطر

radius

الوتر

chord

القطر

diameter

الدوائر المتطابقة

congruent circles

الدوائر المتحدة في

المركز

concentric circles

محيط الدائرة

circumference

بأي (π)

pi

المضلع المحاط بدائرة

inscribed with a circle

الدائرة الخارجية

circumscribed


أضف إلى
مطويتك

قطع مستقيمة خاصة في الدائرة

مفهوم أساسى

نصف القطر هو قطعة مستقيمة يقع أحد طرفيها على المركز والطرف الآخر على الدائرة.

أمثلة : \overline{CD} , \overline{CE} , \overline{CF} أنصاف قطر في $\odot C$.



الوتر هو قطعة مستقيمة يقع طرفاها على الدائرة.

أمثلة : \overline{AB} , \overline{DE} وتران في $\odot C$.


القطر هو وتر يمر بمركز الدائرة، ويكون من نصف قطرين يقعان على استقامة واحدة.

مثال : \overline{DE} قطر في $\odot C$ ، ويكون القطر \overline{DE} من نصف قطرين \overline{CD} , \overline{CE} الواقعين على استقامة واحدة.


تعين القطع المستقيمة في الدائرة

مثال 1

b) عَيْن وَتِرًا وَقَطْرًا فِي الدَّائِرَةِ.




a) سَمِّ الدَّائِرَةَ، وَعَيْن نَصْفَ قَطْرٍ فِيهَا.



مركز الدائرة هو P ؛ إذن يمكن تسميتها
الدائرة P ، أو $\odot P$. تظهر في الشكل ثلاثة
أنصاف قطرات هي : \overline{PL} , \overline{PN} , \overline{PM} .

تحقق من فهمك

1) سَمِّ الدَّائِرَةَ، وَنَصْفَ قَطْرٍ، وَوَتِرًا، وَقَطْرًا فِيهَا.



قراءة الرياضيات

القطر ونصف القطر:

تستعمل الكلمتان
(القطر، ونصف القطر)
للتعبير عن الطول وعن
القطع المستقيمة.
وبما أن للدائرة عدة
أنصاف أقطار وعدد
أقطار أيضاً، فإن قولنا
نصف قطر أو قطر يعني
القياس، وليس القطعة
المستقيمة.

تنبيه !

القطر أو نصف القطر:
في المسائل التي
تتضمن الدوائر، انتبه
جيداً إلى ما إذا كانت
المعطيات تتعلق بنصف
قطر الدائرة أم
بقطرها.

ومن تعريف الدائرة، فإن المسافة بين مركز الدائرة وأي نقطة عليها ثابتة دائمًا؛ إذن أنصاف أقطار الدائرة جميعها متطابقة . وبما أن قطر الدائرة يتكون من نصف قطرين؛ فإن أقطار الدائرة جميعها متطابقة.

أضف إلى

مطويتك

العلاقة بين القطر ونصف القطر

مفهوم أساسى

إذا كان نصف قطر دائرة r وقطرها d فإن:

$$d = 2r \quad \text{صيغة القطر:}$$

$$r = \frac{d}{2} \quad \text{أو } d = 2r \quad \text{صيغة نصف القطر:}$$

إيجاد نصف القطر والقطر

مثال 2

في الشكل المجاور إذا كان $QV = 8\text{ cm}$ ، فأوجد قطر $\odot Q$ ؟

$$\text{صيغة القطر: } d = 2r$$


$$\text{بالتعويض والتبسيط: } = 2(8) = 16$$

القطر في $\odot Q$ يساوي 16 cm .

تحقق من فهمك : في الشكل المجاور

2A) إذا كان $ft = 14$ ، فأوجد نصف قطر $\odot Q$ ؟

2B) إذا كان $m = 11$ ، فأوجد QU .



كما هو الحال في الأشكال الأخرى، يمكن أن تكون أزواج الدوائر متطابقة، أو أن تربطهما بعض العلاقات الخاصة.

أضف إلى

مطويتك



مفهوم أساسى

أزواج الدوائر

تكون **الدائرتان المتشابهتان في المركز** إذا وفقط إذا كان
نصاف قطريهما متطابقين.

الدائرتان المتشابهتان في المركز

هما الدائرتان اللتان تقعان في المستوى نفسه،
ولهمما المركز نفسه.



مثال: $\odot G \cong \odot J$ ؛ إذن $\overline{GH} \cong \overline{JK}$


مثال: $\odot A$ التي نصف قطرها \overline{AB}
و $\odot A$ التي نصف قطرها \overline{AC}
دائرتان متشابهتان في المركز.

إذا تقاطعت دائرتان، فإنه يمكن أن تتقاطعا بطرقتين مختلفتين، والجدول التالي يوضح الأوضاع المختلفة بين دائرتين.


لا يوجد تقاطع



تقاطع في نقطة واحدة




تقاطع في نقطتين



القطعة المستقيمة التي تصل بين مركزَي دائرتين متقاطعتين يمكن أن تحوي نصفَي قطرَي الدائريتين.

مثال 3 إيجاد قياسات في دائريتين متقاطعتين



في الشكل المجاور قطر S يساوي 30 وحدةً، وقطر R يساوي 20 وحدةً، و DS يساوي 9 وحداتٍ، أوجد CD .

بما أن قطر S يساوي 30، فإن $CS = 15$. و \overline{CD} هو جزء من نصف القطر \overline{CS} .

$$\text{مسلسلة جمع القطع المستقيمة} \quad CD + DS = CS$$

$$\text{بالتعميض} \quad CD + 9 = 15$$

$$\text{بطريق 9 من كلا الطرفين} \quad CD = 6$$

تحقق من فهمك



3) استعمل الشكل أعلاه لإيجاد RC .

محيط الدائرة: محيط الدائرة هو طول المنحنى المغلق الذي يمثل الدائرة، ويرمز له بالرمز C ، وتُعرف النسبة $\frac{C}{d}$ بأنها عدد غير نسيي يُسمى باي (π)، ويساوي 3.14 أو $\frac{22}{7}$ تقريباً، ويمكن استنتاج صيغتين لحساب محيط الدائرة باستعمال هذا التعريف.

$$\text{تعريف } \pi \text{ باي} \quad \frac{C}{d} = \pi$$

$$\text{بضرب كلا الطرفين في } d \quad C = \pi d$$

$$\begin{aligned} \text{بالتعميض } d &= 2r \\ \text{بالتبسيط} &C = 2\pi r \end{aligned}$$

أضف إلى
مطويتك

محيط الدائرة

مفهوم أساسى

التعبير اللفظي: إذا كان قطر الدائرة يساوي d ، أو نصف قطرها يساوي r ، فإن محيطها C يساوي حاصل ضرب القطر في π ، أو مثلي نصف القطر في π .

$$C = 2\pi r \text{ أو } C = \pi d \quad \text{الرموز:}$$



إيجاد محيط الدائرة

مثال 4 من واقع الحياة

تونس: أوجد محيط المهبط الدائري الموصوف في فقرة الرابط مع الحياة المجاورة.

$$\text{صيغة محيط الدائرة} \quad C = \pi d$$

$$\text{بالتعميض} \quad = \pi(79)$$

$$\text{بالتبسيط} \quad = 79\pi$$

$$\text{باستعمال الحاسبة} \quad \approx 248.19$$

محيط المهبط الدائري يساوي $79\pi \text{ ft}$ ، أو 248.19 ft تقريباً.

الربط مع الحياة

أُقيمت في عام 2005 م مبارزة دولية في التنس على مهبط للطائرات العمودية فوق قمة فندق برج العرب في الإمارات العربية المتحدة، ويرتفع هذا المهبط الدائري 700 ft تقريباً عن سطح الأرض، وقطره 79 ft



أوجد محيط كلِّ من الدائريتين الآتتين مقرّباً إجابتك إلى أقرب جزءٍ من مائةٍ.
4A) القطر يساوي 16 ft
4B) نصف القطر يساوي 2.5 cm

مستويات الدقة :

بما أن π عدد غير نسبي،
إذن لا يمكن كتابته على
صورة كسر عشري منته.
ولكن لأغراض الحصول
على تقدير سريع في
الحسابات، يمكن اعتبار
قيمه 3، وإذا استعملت
القيمة 3.14 أو $\frac{22}{7}$
فستحصل على تقرير
أكثر دقة، وللحصول
على القيمة الدقيقة،
استعمل مفتاح π في
الحاسبة.

مثال 5 إيجاد القطر ونصف القطر

أوجد القطر ونصف القطر مقربين إلى أقرب جزءٍ من مئة لدائرة التي محاطها 106.4 mm

$$\text{صيغة نصف القطر} \quad r = \frac{1}{2} d$$

$$d \approx 33.87 \quad \approx \frac{1}{2} (33.87)$$

باستعمال الحاسبة $\approx 16.94 \text{ mm}$

صيغة محاط الدائرة

$$C = \pi d$$

بالتعمييض

$$106.4 = \pi d$$

بقسمة كلا الطرفين على π


$$\frac{106.4}{\pi} = d$$

باستعمال الحاسبة

$$33.87 \text{ mm} \approx d$$

تحقق من فهمك ✓

5) إذا كان محاط دائرة يساوي 77.8 cm، فأوجد قطر الدائرة ونصف قطرها مقربين إلى أقرب جزءٍ من مئة.



يكون المضلع **محاطاً بدائرة** إذ وقعت رؤوسه جميعها على الدائرة.
وتسمى هذه الدائرة **الدائرة الخارجية**.


- الشكل الرباعي $LMNP$ محاط بـ $\odot K$.
- $\odot K$ دائرة خارجية للمضلعل $LMNP$.

مثال 6 من اختبار

اجابة قصيرة: إذا كانت الدائرة J تحيط بمربع طول ضلعه 9 in، وقطره يمثل قطرها،
فما القيمة الدقيقة لمحيط J .

اقرأ سؤال الاختبار

احسب قطر الدائرة، واستعمله لحساب محاطها.



حل سؤال الاختبار

ارسم شكلاً توضيحيًا فيه: قطر المربع يمثل قطرًا للدائرة أيضًا،
ويكون وتراً لمثلث قائم الزاوية.

نظرية فيثاغورس $a^2 + b^2 = c^2$ بالتعمييض $9^2 + 9^2 = c^2$ بالتبسيط $162 = c^2$

$$9\sqrt{2} = c$$

بأخذ الجذر التربيعي الموجب لكلا الطرفين

قطر الدائرة يساوي $9\sqrt{2}$ in

أوجد المحيط بدلالة π ، بتعمييض $9\sqrt{2}$ لقيمة d في الصيغة $C = \pi d$ في الصيغة $9\pi\sqrt{2}$ in

تحقق من فهمك ✓

أوجد القيمة الدقيقة لمحيط الدائرة في كلٍ مما يأتي:


6A) إذا كانت تحيط بمثلث قائم الزاوية طولاً ساقيه 7 m, 3 m


6B) إذا كانت محاطة بمربع طول ضلعه 10 ft

الدائرة الخارجية

والدائرة الداخلية:

تسمى الدائرة التي تمر
بجميع رؤوس المضلع
الدائرة الخارجية، أما
الدائرة التي تمسّ جميع
أضلاع المضلع، فتسمى
الدائرة الداخلية، حيث
تكون محاطة بالمضلع،
كالدائرة في الشكل
أدناه.





استعمل الدائرة في الشكل المجاور؛ للإجابة عن الأسئلة الآتية:

المثالان 2 ، 1


(1) سُمّ هذه الدائرة.

(2) عَيْن كَلَّا مِمَّا يَأْتِي:

(a) وَتَرًا (b) قَطْرًا

(3) إِذَا كَانَ $CN = 8 \text{ cm}$ ، فَأُوجِدَ DN .

(4) إِذَا كَانَ $EN = 13 \text{ ft}$ ، فَمَا قَطْرُ الدَّائِرَةِ؟



قَطْرٌ كَلَّا مِن $\odot C$ يُسَاوِي 8 cm ، 18 cm ، 11 cm عَلَى التَّرْتِيبِ.

المثال 3

أَوْجَدَ كَلَّا مِنَ الْقِيَاسِيْنِ الْآتِيْنِ:

FG (5)

FB (6)

(7) **عِجلَةٌ دَوَارَةٌ:** عُدَّ إِلَى فَقْرَةٍ ”لِمَاذَا؟“ بِدَائِيْهِ الدَّرْسِ. مَا قَطْرُ هَذِهِ الْعِجْلَةِ الدَّوَارَةِ؟ وَمَا مَحِيطُهَا؟ قَرَبْ

إِجَابَتِكَ إِلَى أَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ مِئَةٍ إِذَا لَرَمَ ذَلِكَ.

المثال 4

(8) **بَرْكَةٌ سَبَاحَةٌ:** مَحِيطُ بَرْكَةِ السَّبَاحَةِ الدَّائِرِيَّةِ فِي الشَّكْلِ الْمَجَاوِرِ يُسَاوِي 56.5 ft تَقْرِيْبًا، مَا قَطْرُ هَذِهِ الْبَرْكَةِ؟ وَمَا نَصْفُ قَطْرِهَا؟

قَرَبْ إِجَابَتِكَ إِلَى أَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ مِئَةٍ.



المثال 5



(9) **إِجَابَةٌ قَصِيرَةٌ:** الْمُثَلَّثُ الْقَائمُ الزَّاوِيَّةِ فِي الشَّكْلِ الْمَجَاوِرِ مُحَاطٌ بِالدَّائِرَةِ D ،

أَوْجَدَ القيمة الدقيقة لمحيط $\odot D$.

المثال 6



عُدَّ إِلَى $\odot R$ فِي الشَّكْلِ الْمَجَاوِرِ؛ لِلإِجَابَةِ عَنِ الْأَسْئَلَةِ الْآتِيَّةِ.


المثالان 2 ، 1

(10) مَا مَرْكُزُ الدَّائِرَةِ؟

(11) عَيْنَ وَتَرًا يَكُونُ قَطْرًا.

(12) هَلْ \overline{VU} نَصْفُ قَطْرٍ؟ بَرُّرْ إِجَابَتِكَ.

(13) إِذَا كَانَ $SU = 16.2 \text{ cm}$ ، فَأُوجِدَ RT ؟



إِذَا كَانَ نَصْفُ قَطْرِ $\odot J$ يُسَاوِي 10 وَحدَاتٍ، وَنَصْفُ قَطْرِ $\odot K$ يُسَاوِي 8 وَحدَاتٍ وَ BC يُسَاوِي 5.4 وَحدَاتٍ، فَأُوجِدَ كُلُّ قِيَاسٍ مِمَّا يَأْتِي:

AB (15)

CK (14)

AD (17)

JK (16)

المثال 3

المثال 4


(18) **بيتزا:** أوجد نصف قطر قرص البيتزا ومحيطها في الشكل المجاور، مقرّباً الإجابة إلى أقرب جزء من مئة، إذا لزم ذلك.

(19) **دراجات:** قطر إطار دراجة يساوي 26 in، أوجد نصف قطر الإطار ومحطيه، مقرّباً إجابتك إلى أقرب جزء من مئة، إذا لزم ذلك.


أوجد قطر الدائرة ونصف قطرها إذا عُلِمَ محيطها في كُلِّ ممّا يأتي، مقرّباً إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.

$$C = 2608.25 \text{ m} \quad (23) \quad C = 375.3 \text{ cm} \quad (22) \quad C = 124 \text{ ft} \quad (21) \quad C = 18 \text{ in} \quad (20)$$


أوجد القيمة الدقيقة لمحيط كُلِّ من الدوائر الآتية باستعمال المضلع الذي تحيط به أو الذي يحيط بها.




(26)



(25)



(24)



(27) **فناء:** أراد مصطفى أن يرصف فناءً دائريًّا، كما في الشكل المجاور.

(a) ما المحيط التقريري لهذا الفناء؟

(b) إذا غير مصطفى خطة إنشاء هذا الفناء، بحيث يصبح محيط الدائرة الداخلية 25 ft تقريبًا، فكم يكون نصف قطر الدائرة مقرّباً إلى أقرب قدم؟

في كُلِّ من الأسئلة 31–32، عُلِمَ نصف قطر أو قطر أو محيط دائرة. أوجد القياسين المجهولين مقرّباً إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.

$$r = 11\frac{2}{5} \text{ ft}, d = \underline{\hspace{2cm}}, C = \underline{\hspace{2cm}} \quad (29)$$

$$d = 8\frac{1}{2} \text{ in}, r = \underline{\hspace{2cm}}, C = \underline{\hspace{2cm}} \quad (28)$$

$$r = \frac{x}{8}, d = \underline{\hspace{2cm}}, C = \underline{\hspace{2cm}} \quad (31)$$

$$C = 35x \text{ cm}, d = \underline{\hspace{2cm}}, r = \underline{\hspace{2cm}} \quad (30)$$

(32) **حدائق:** يُراد إنشاء رصيف عرضه 4 m حول بركة دائرية الشكل محيطها 68 m، فما محيط الرصيف؟
قرب إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.

(33) **تمثيلات متعددة:** في هذا السؤال سنتكتشف أثر تغيير الأبعاد في الدائرة.

(a) **هندسياً:** مستعملاً الفرجار ارسم ثلاثة دوائر متحدة المركز، بحيث تكون نسبة طول نصف قطر كل دائرة إلى طول نصف قطر الدائرة الأكبر منها تساوي $\frac{1}{2}$.

(b) **جدولياً:** احسب محيط كُلِّ من الدوائر السابقة مقرّباً إلى أقرب جزء من مئة، وسجل في جدول نصف القطر والمحيط لكُلِّ منها.

(c) **لفظياً:** فسر لماذا تكون الدوائر الثلاث متشابهة هندسياً.

(d) **لفظياً:** ضع تخميناً حول النسبة بين محيطي الدائرين، عندما تكون النسبة بين نصفي قطريهما تساوي 2.



(e) **تحليلياً:** معامل التشابه من $\odot A$ إلى $\odot B$ يساوي $\frac{b}{a}$. اكتب معادلة تربط محيط $\odot A$ (C_A) بمحيط $\odot B$ (C_B).

(f) **عددياً:** إذا كان معامل التشابه من $\odot A$ إلى $\odot B$ يساوي $\frac{1}{3}$ ، ومحيط $\odot A$ يساوي 12 in، فما محيط $\odot B$ ؟

قراءة الرياضيات

الرمزان C_B و C_A :
يقرأ الرمز C_A محيط
الدائرة A ، ويقرأ الرمز
 C_B محيط الدائرة B .

(34) رياضة: يظهر في الصورة أدناه مضمار جري.





الربط مع الحياة

يمكن أن يحرق الشخص الذي يزن 68 kg حوالي 240 سعراً حرارياً، إذا ركض بسرعة 9 km/h في 20 min، وذلك أكثر من مثلي عدد السعرات التي يحرقها إذا سار بسرعة 7.2 km/h المدة الزمنية نفسها.


مسائل مهارات التفكير العليا

(35) مسألة مفتوحة: ارسم دائرة يكون محيطها بين 8 cm و 12 cm، ما نصف قطر هذه الدائرة؟

(36) اكتشف الخطأ: رسم كل من حمود وسلمان شكلاً يمثل مجموعة النقاط التي تبعد 4 cm عن النقطة J، فهل إجابة أيٌّ منهما صحيحة؟ برر إجابتك.




(37) تحد: مجموع محيطات الدوائر H, J, K التي تظهر في الشكل المجاور يساوي 56π . أوجد KJ .



(38) تبرير: هل المسافة بين مركز الدائرة وأي نقطة داخلها أقل من نصف قطرها دائمًا أو أحياناً أو لا تكون كذلك أبداً؟ فسر إجابتك.

(39) تحد: P مُحاطة بالمثلث المتطابق الأضلاع LMN، كما في الشكل أدناه، ما محيط $\odot P$ ، مقرباً إجابتك إلى أقرب جزء من عشرة؟



(40) اكتب: بين أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الدوائر المتطابقة والدوائر المتشبة في المركز.

تدريب على اختبار

(42) جبر: أحاط إبراهيم حديقته الدائرية الشكل بسياج. إذا كان طول السياج 50 m ، فما نصف قطر الحديقة؟ قرب إجابتك إلى أقرب عدد صحيح.


8 C

7 D

10 A

9 B


(41) ما محيط $\odot T$ ؟ قرب إجابتك إلى أقرب عشر.




مراجعة تراكمية

استعمل مسطرةً لرسم صورة الشكل الناتجة عن تمدد مركزه B ومعامله k المحدد في كل من الأسئلة الآتية. (مهارة سابقة)

$$k = 3 \quad (46)$$




$$k = 2 \quad (45)$$




$$k = \frac{2}{5} \quad (44)$$




$$k = \frac{1}{5} \quad (43)$$



أوجد القيمة الدقيقة لمحيط كل دائرة مما يأتي: (الدرس 4-1)



(48)




(47)

حدّد ما إذا كان يدو لصورة كُل من الأشكال الآتية تماثل دوراني أم لا؟ وإذا كان كذلك، فانسخ الشكل في دفترك، وحدّد عليه مركز التماثل، واذكر رتبته ومقداره. (مهارة سابقة)



(52)



(51)



(50)




(49)


استعد للدرس اللاحق

أوجد قيمة x في كُل مما يأتي:


(55)



(54)



(53)



قياس الزوايا والأقواس

Measuring Angles and Arcs




رابط المدرس الرقمي

www.ien.edu.sa



لماذا؟
معظم الساعات في الأجهزة الإلكترونية عبارة عن ساعات رقمية، وهي الساعات التي تُظهر الوقت على شكل أرقام. وتُستعمل الساعات العادية في تزيين المنازل، أو استعمالها ساعات يدوية. وهذه الساعات لها عقارب أو مؤشرات متحركة تشير إلى الساعة والدقيقة، وأحياناً هناك مؤشر أو عقرب للثوانى.
ووجه هذه الساعة عبارة عن دائرة، وتكون العقارب الثلاث زوايا مركبة فيها.



الزوايا والأقواس الزاوية المركبة في الدائرة هي زاوية يقع رأسها في المركز، وضلعاها نصفا قطرتين في الدائرة. في الشكل المجاور $\angle ABC$ هي زاوية مركبة في $\odot B$.

تذكّر أن مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوي 360° ؛ لذا فإن الدرجة الواحدة تساوي $\frac{1}{360}$ من الدورة الكاملة حول نقطة، ويؤدي هذا إلى المفهوم الآتي:

مطلبتك

أضف إلى

مفهوم أساسى

مجموع قياسات الزوايا المركبة

التعبير اللفظي: مجموع قياسات الزوايا المركبة في الدائرة، والتي لا تحوي نقاطاً داخلية مشتركة يساوي 360° .

$$m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 360^\circ$$

مثال:

مثال 1

إيجاد قياس الزاوية المركبة

أوجد قيمة x في الشكل المجاور.

الحل




مجموع قياسات الزوايا المركبة $m\angle GFH + m\angle HFJ + m\angle GFJ = 360^\circ$

بالتعويض $130^\circ + 90^\circ + x = 360^\circ$

بالتبسيط $220^\circ + x = 360^\circ$

بطرح 220° من كلا الطرفين $x = 140^\circ$

تحقق من فهمك



الراية التعليمية
Ministry of Education
2022 - 1444

القوس هو جزءٌ من دائرة يحدّد بنقطتي طرفيه، وعند رسم زاوية مركبة، تنقسم الدائرة إلى قوسين، يرتبط قياس كلٍّ منهما بقياس الزاوية المركبة المقابلة له.

فيما سبق:

درست إيجاد قياسات الزوايا وتحديد الزوايا المتطابقة.

(مهارة سابقة)

والآن:

▪ أعين الزوايا المركبة، والأقواس الكبرى، والأقواس الصغرى، ونصف الدائرة وأجد قياسها.

▪ أجد طول القوس.

المفردات:

الزاوية المركبة
central angle

القوس
arc

القوس الأصغر
minor arc

القوس الأكبر
major arc

نصف دائرة
semicircle

الأقواس المتطابقة
congruent arcs

الأقواس المتجاورة
adjacent arcs

طول القوس
arc length

إرشادات للدراسة


تسمية الأقواس:
يسمى القوس الأصغر بنقطتي طرفيه ، أما القوس الأكبر ونصف الدائرة فيسمايان بنقطتي الطرفين بالإضافة إلى نقطة على القوس بينهما.

أضف إلى مطويتك

القوس	الأقواس وقياسها	قياسه
القوس الأصغر هو القوس الأقصر الذي يصل بين نقطتين على الدائرة.	يقل قياس القوس الأصغر عن 180° ، ويساوي قياس الزاوية المركزية المقابلة له. $m\widehat{AB} = m\angle ACB = x^\circ$	
القوس الأكبر هو القوس الأطول الذي يصل بين نقطتين على الدائرة.	يزيد قياس القوس الأكبر على 180° ، ويساوي 360° مطروحا منه قياس القوس الأصغر الذي يصل بين النقطتين نفسها. $m\widehat{ADB} = 360^\circ - m\widehat{AB} = 360^\circ - x^\circ$	
نصف الدائرة هي قوس تقع نقطتا طرفيه على قطر الدائرة.	قياس نصف الدائرة يساوي 180° $m\widehat{ADB} = 180^\circ$	

تصنيف الأقواس وايجاد قياساتها

مثال 2



قطر في $\odot K$ ، حدد ما إذا كان كل من الأقواس الآتية قوساً أكبر أو أصغر أو نصف دائرة، ثم أوجد قياسه.

\widehat{GH} (a)

. $m\widehat{GH} = m\angle GKH = 122^\circ$ قوس أصغر، وقياسه: \widehat{GH}

\widehat{GLJ} (c)

هو القوس الأكبر الذي يشتراك مع القوس الأصغر \widehat{GH} في نقطتي طرفيه.
إذن: $m\widehat{GLJ} = 180^\circ$.

\widehat{GLH} (b)

$$m\widehat{GLH} = 360^\circ - m\widehat{GH}$$



$$= 360^\circ - 122^\circ = 238^\circ$$

تحقق من فهمك

قراءة الرياضيات

الرمز

يقرأ الرمز $\widehat{...}$ القوس.
في الدائرة أدناه، \widehat{AB} يقرأ القوس \widehat{AEC} أما \widehat{AED} وكذلك AEC فيقرأ القوس AED .



قطر في $\odot R$ ، حدد ما إذا كان كل من الأقواس الآتية قوساً أكبر أو أصغر أو نصف دائرة، ثم أوجد قياسه.

\widehat{MNQ} (2C)


MNP (2B)

\widehat{MQ} (2A)

الأقواس المتطابقة هي الأقواس التي تقع في الدائرة نفسها، أو في دائرتين متطابقتين، ويكون لها القياس نفسه.

نظريّة 4.1

أضف إلى مطويتك



التعبير اللغطي: في الدائرة نفسها أو في دائرتين متطابقتين، يكون القوسان متطابقين، إذا وفقط إذا كانت الزاويتان المركزيتان المقابلتان لهما متطابقتين.


مثلاً: إذا كانت $\angle 2 \cong \angle 1$ ، فإن $\widehat{FG} \cong \widehat{HJ}$.

إذا كان $\widehat{FG} \cong \widehat{HJ}$ ، فإن $\angle 2 \cong \angle 1$.

مثال 3 من واقع الحياة

إيجاد قياس القوس من القطاعات الدائرية

رياضة: استعمل التمثيل بالقطاعات الدائرية المجاورة، لإيجاد كلّ من القياسات الآتية:



$$m\widehat{CD} \text{ (a)}$$

\widehat{CD} هو قوس أصغر.

$$m\widehat{CD} = m\angle CSD$$

$\angle CSD$ تمثل 18% من الكل أو 18% من الدائرة.

$$m\angle CSD = 0.18(360^\circ)$$

بالتبسيط

$$= 64.8^\circ$$

$$m\widehat{BC} \text{ (b)}$$

النسبتان المئويتان للكرة الطائرة والجري متساويتان؛ إذن الزاويتان المركزيتان متطابقتان. والقوسان المقابلان لهما متطابقان.

$$m\widehat{BC} = m\widehat{CD} = 64.8^\circ$$

تحقق من فهتمك




الربط مع الحياة

عرفت لعبة كرة الطائرة لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقلت إلى كندا عام 1900 م، لتصبح بعد ذلك من أكثر الرياضات شعبية في العالم.

$$m\widehat{FA} \text{ (3B)}$$

$$m\widehat{EF} \text{ (3A)}$$



الأقواس المجاورة هي أقواس في الدائرة تشتراك مع بعضها في نقطة واحدة فقط.

القوسان المجاوران في $\odot M$ ، \widehat{HJ} ، \widehat{JK} ، وكما هي الحال في الزوايا المجاورة، يمكنك جمع قياس الأقواس المجاورة.




مسلمة جمع الأقواس

مسلمة 4.1

التعبير اللغطي: قياس القوس المكون من قوسين متجاورين يساوي مجموع قياسي هذين القوسين.

$$m\widehat{XZ} = m\widehat{XY} + m\widehat{YZ}$$

مثال:



إيجاد قياس القوس باستعمال مسلمة جمع الأقواس

مثال 4

أوجد كلاً من القياسات الآتية في $\odot F$:

$$m\widehat{AD} \text{ (a)}$$

$$m\widehat{AD} = m\widehat{AE} + m\widehat{ED}$$

$$= m\angle AFE + m\angle EFD$$

$$= 63^\circ + 90^\circ = 153^\circ$$

$$m\widehat{ADB} \text{ (b)}$$

$$m\widehat{ADB} = m\widehat{AE} + m\widehat{EDB}$$

$$= 63^\circ + 180^\circ = 243^\circ$$

تحقق من فهتمك

$$m\widehat{CE} \text{ (4A)}$$

$$m\widehat{ABD} \text{ (4B)}$$



تنبيه !

طول القوس :

يُعطى طول القوس
بوحدات الطول مثل
السنتيمترات، أما قياس
القوس فيعطي
بالدرجات.

مفهوم أساسى

طول القوس


التعبير اللغظي: إذا كان طول القوس يساوي ℓ ومحيط الدائرة يساوي $2\pi r$
وقياس القوس بالدرجات يساوي x° . فإن نسبة طول
القوس إلى محيط الدائرة يساوي نسبة
قياس القوس بالدرجات إلى 360°

$$\frac{\ell}{2\pi r} = \frac{x^\circ}{360^\circ}$$

$$\ell = \frac{x^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi r$$


الرموز:

أي أن:




مثال 5 إيجاد طول القوس

أوجد طول \widehat{ZY} في كلٍ مما يأتي مقرّباً إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ:



(b)




(a)

صيغة طول القوس $\ell = \frac{x^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi r$
بالتعويض $= \frac{130^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi(5)$
باستعمال الحاسبة $\approx 11.34 \text{ cm}$

صيغة طول القوس $\ell = \frac{x^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi r$
بالتعويض $= \frac{75^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi(4)$
باستعمال الحاسبة $\approx 5.24 \text{ in}$


صيغة طول القوس $\ell = \frac{x^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi r$
بالتعويض $= \frac{75^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi(6)$
باستعمال الحاسبة $\approx 7.85 \text{ in}$




لاحظ أن \widehat{ZY} له القياس نفسه في المثلين 5a، 5c، ويتساوي 75° ، إلا أن لهما طولين مختلفين؛ بسبب وجودهما في دائرتين نصفا قطريهما مختلفان.

تحقق من فهمك


أوجد طول \widehat{AB} في كلٍ مما يأتي مقرّباً إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ:



(5C)



(5B)




(5A)


أوجد قيمة x في كلٍ من الشكلين الآتيين:

المثال 1

(2)



(1)




قطران في $\odot L$, \overline{HK} , \overline{IG} إذا كان كل قوس فيما يأتي قوساً أكبر أو أصغر أو نصف دائرة، ثم أوجد قياسه.

المثال 2


\widehat{HGK} (5)

\widehat{HI} (4)

\widehat{IHJ} (3)



ما يطلب به رواد المطاعم



6) مطعم: يعرض الشكل المجاور نتائج استطلاع حول ما يطلب به رواد المطاعم.

. $m\widehat{AB}$ (a)

. $m\widehat{BC}$ (b)

c) صنف نوع قوس قطاع الطعام الجيد.

المثال 3



المثال 4

$m\widehat{SPT}$ (7)


$m\widehat{QRT}$ (8)

$m\widehat{PQR}$ (9)


أوجد طول \overline{JK} مقارباً إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ في كلٍ من السؤالين الآتيين:

المثال 5

(11)




(10)




تدريب وحل المسائل

أوجد قيمة x في كلٍ مما يأتي:


المثال 1




(15)




(14)



(13)



(12)



المثال 2 **قطران في $\odot B$** ، حدد ما إذا كان كل قوس ممّا يأتي قوساً أكبر أو أصغر أو نصف دائرة، ثم أوجد قياسه.

$$\widehat{CG} \quad (18)$$


$$\widehat{AC} \quad (17)$$

$$\widehat{CD} \quad (16)$$

$$\widehat{GCF} \quad (20)$$

$$\widehat{CGD} \quad (19)$$

أفضل الأماكن لشراء الملابس




المثال 3 **تسوق** : يعرض الشكل المجاور نتائج استطلاع حول المكان المفضل لشراء الملابس، شمل مجموعة من الشباب.

(a) ما قياس القوس المقابل لفئة التسوق في كل من المجمعات التجارية وال محلات المتخصصة؟

(b) صُفْ نوع القوس المقابل لفئة المجمعات التجارية وفئة الأسواق الشعبية.

(c) هل توجد أقواس متطابقة في هذا الشكل؟ وضح إجابتك.



تسليه : استعمل العجلة الدوارة في الشكل المجاور، لإيجاد كل من القياسات الآتية:

$$m\widehat{JH} \quad (24)$$

$$m\widehat{FG} \quad (23)$$

$$m\widehat{JFH} \quad (26)$$


$$m\widehat{JKF} \quad (25)$$

$$m\widehat{GHK} \quad (28)$$

$$m\widehat{GHF} \quad (27)$$

$$m\widehat{JKG} \quad (30)$$

$$m\widehat{HK} \quad (29)$$



المثال 4 **قطر في $\odot P$** ، أوجد طول كل قوس ممّا يأتي مقرّباً إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.


. \widehat{RS} ، إذا كان نصف القطر يساوي 2 in . (31)

. \widehat{QT} ، إذا كان القطر يساوي 9 cm . (32)

. $PS = 4$ mm ، \widehat{QR} (33)

. $RT = 11$ ft ، \widehat{QRS} (34)

المثال 5



ساعات : يعرض الشكل المجاور الساعة التي وردت في فقرة “لماذا؟” في بداية هذا الدرس.


(35) ما قياس الزاوية المركزية الصغرى المحصورة بين عقرب الساعات والدقيقة؟ فسر الطريقة التي توصلت بها إلى إجابتك.

(36) إذا تضاعف قطر الدائرة، فما تأثير ذلك في طول القوس الأصغر بين الرقم 1 ، والرقم 12 ؟


تعُد ساعة مكة المكرمة أكبر ساعة في العالم، إذ يزيد قطر واجهتها عن 40 m . ويبلغ طول عقرب الدقيقة 22 m ، وطول عقرب الساعات 17 m ، وتبلغ كتلة كلٍّ منها 6 أطنان تقريباً.

أوجد قياس كل مما يأتي مقرّبًا للأطوال إلى أقرب جزء من مئة وقياسات الأقواس إلى أقرب درجة.



(39) نصف قطر $\odot K$



(38) $m \widehat{CD}$



(37) محيط $\odot S$




جبر: في $\odot C$ ، إذا كان $m\angle HCG = (2x)^\circ$ ، $m\angle HCD = (6x + 28)^\circ$ فأوجد قياس كل مما يأتي:

$m \widehat{HGF}$ (42)

$m \widehat{HD}$ (41)


$m \widehat{EF}$ (40)



(43) **الألعاب:** يأخذ مسار لعبة السفينة في مدينةألعاب شكل نصف دائرة كما في الشكل المجاور.

أوجد $m \widehat{AB}$ (a)

إذا كان $CD = 62$ ft، فما طول \widehat{AB} ? قرب إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.




(44) **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين للنظرية 4.1.

$\angle BAC \cong \angle DAE$

$\widehat{BC} \cong \widehat{DE}$

المطلوب:



(45) **هندسة إحداثية:** تمثل النقطة M نقطة الأصل في الشكل المجاور.

أوجد كلاً مما يأتي في $\odot M$ ، مقرّبًا للأطوال إلى أقرب جزء من مئة، وقياسات الأقواس إلى أقرب عشر درجة.

$m \widehat{JK}$ (c)


$m \widehat{KL}$ (b)

$m \widehat{JL}$ (a)

طول \overline{JK} (e)

طول \overline{JL} (d)

(46) **تمثيلات متعددة:** في هذا السؤال ستنستقصي العلاقة بين الأقواس والأوتار.




(a) **هندسياً:** ارسم دائرة فيها وتران متطابقان مثل \overline{AB} , \overline{CD} , \overline{EF} , \overline{GH} , \overline{IJ} . حدد مركز هذه الدائرة. كرر العملية مع دائرتين آخرين ووتران متطابقين في كلٍّ منها، على أن تكون أطوال الأوتار في الدوائر الثلاث مختلفة.

(b) **حسياً:** قص ثلث قطع من الورق الشفاف أكبر من كلٍّ من الدوائر الثلاث، ثم ثبّت ورقة شفافة من متصرفها مستعملًا دبوسًا عند مركز كل دائرة، ارسم القوس المقابل لأحد الوترتين في كل دائرة على الورقة الشفافة، ثم قم بتدوير قطعة الورق الشفاف حول الدبوس؛ لمقارنة طول القوس الذي رسمته بطول القوس المقابل للوتر الآخر.



مسائل مهارات التفكير العليا



- (47) **اكتشف الخطأ:** يقول إبراهيم: إن $\widehat{WZ} = \widehat{YZ}$ متطابقان؛ لأن زاويتهما المركزيتين متطابقتان، بينما يقول سالم: إنهما غير متطابقين. هل أيٌّ منهما على صواب؟
بِرْ إجابتك.

تبرير: حدد ما إذا كانت كلٌ من العبارات الآتية صحيحة دائمًا أو أحياناً أو ليست صحيحة أبداً. بِرْ إجابتك.

(48) قياس القوس الأصغر أقل من 180° .

(49) إذا كانت الزاوية المركزية منفرجة، فإن القوس المقابل لها قوس أكبر.


(50) يعتمد مجموع قياسي قوسين متجاورين في دائرة، على قياس نصف قطر تلك الدائرة.

(51) **مسألة مفتوحة:** ارسم دائرةً وعِنْ عَلَيْهَا ثالث نقاط، قدر قياس الأقواس الثلاثة الناتجة وغير المتداخلة، ثم استعمل المنقلة لإيجاد قياس كل منها، واتكتب على كل قوس قياسه.


(52) **تحدّ:** تشير عقارب ساعة إلى 8:10، ما قياس الزاوية المقابلة للقوس الأصغر بين عقربَي الساعة؟

(53) **اكتُب:** صُفِّي الأنواع الثلاثة للأقواس في الدائرة، وطريقة إيجاد قياس كل منها.

تدريب على اختبار




- (55) في $\odot B$ ، إذا كان: $m\angle LBM = (3x)^\circ$ ، $m\angle LBQ = (4x + 61)^\circ$ ،
فما قياس $\angle PBQ$ ؟



- 145 **C**
160 **D**

- أوجِد قيمة x ؟
120 **A**
135 **B**

مراجعة تراكمية



عُد إلى $\odot J$ في الشكل المجاور للإجابة عن كلٌ من الأسئلة الآتية: (مهارة سابقة)

(56) سُمّ مركز الدائرة.

(57) عِنْ وَتَرَا يكون قطرًا أيضًا.

(58) إذا كان $JN = 12.4$ ، فأوجِد $JM =$ ؟

مثل بيانياً المضلع المعطاه إحداثيات رؤوسه، ثم مثل صورته الناتجة عن تمددٍ مركزه نقطة الأصل ومعامله k المعطى في كلٌ من السؤالين الآتيين: (مهارة سابقة)

$$k = 0.25 ; A(-4, 4), B(4, 4), C(4, -4), D(-4, -4) \quad (60)$$

$$k = 3 ; X(-1, 2), Y(2, 1), Z(-1, -2) \quad (59)$$

استعد للدرس اللاحق



أوجِد قيمة x في كلٌ مما يأتي:

$$30^2 + 35^2 = x^2 \quad (63)$$

$$x^2 + 5^2 = 13^2 \quad (62)$$

$$24^2 + x^2 = 26^2 \quad (61)$$

الأقواس والأوتوار

Arcs and Chords

لماذا؟



يُستخدم الخياطون إطاراً دائرياً لشد الأقمشة ثم تطريز الزخارف عليها. يُظهر الشكل المجاور إطاراً دائرياً، مثبتاً عليه تطريز على شكل نجمة، ويمثل كل رأسين متجاورين من رؤوس النجمة نهايتي قوسٍ في الدائرة، أو نهايتي وتر يكون أحد أضلاع شكل سداسي رؤوسه على الدائرة.

الأقواس والأوتوار: لقد تعلمت في الدرس 1-4 أن الوتر هو قطعة مستقيمة يقع طرفاها على الدائرة، وإذا لم يكن الوتر قطراً للدائرة، فإن طرفيه يقسمانها إلى قوسين؛ أحدهما قوس أكبر والآخر أصغر.

أضف إلى
مطويتك

نظرية 4.2

التعبير اللغطي: في الدائرة نفسها أو في دائرتين متطابقتين، يكون القوسان الأصغران متطابقين، إذا و فقط إذا كان الوتران المتناظران لهما متطابقين.

مثال: $\widehat{FG} \cong \widehat{HJ}$, إذا و فقط إذا كان $\overline{FG} \cong \overline{HJ}$

ستبرهن الجزء 2 من النظرية 4.2 في السؤال 20

فيما سبق:


درست استعمال العلاقات بين الأقواس والأوتوار
لإيجاد قياسات مختلفة.

(الدرس 2-4)

والآن:

- أمّيز العلاقات بين الأقواس والأوتوار وأستعملها.

- أمّيز العلاقات بين الأقواس والأوتوار والأقطار وأستعملها.



برهان نظرية 4.2 (الجزء 1: دائرة واحدة)

المعطيات: $\odot P$ في $\widehat{QR} \cong \widehat{ST}$.

المطلوب: $\overline{QR} \cong \overline{ST}$

البرهان:

المبررات	العبارات
1) معطيات	$\odot P$ في $\widehat{QR} \cong \widehat{ST}$ (1)
2) إذا تطابقت الأقواس، فإن الزوايا المركزية المقابلة لها تكون متطابقة.	$\angle QPR \cong \angle SPT$ (2)
3) أنصاف أقطار الدائرة جميعها متطابقة.	$\overline{QP} \cong \overline{PR} \cong \overline{SP} \cong \overline{PT}$ (3)
SAS (4)	$\triangle PQR \cong \triangle PST$ (4)
5) العناصر المتناظرة في مثلثين متطابقين متطابقة.	$\overline{QR} \cong \overline{ST}$ (5)

استعمال الأوتوار المتطابقة لإيجاد قياس القوس

مثال 1 من واقع الحياة


حرف يدوية: إذا كان: $\overline{AB} \cong \overline{CD}$, $m\widehat{AB} = 60^\circ$ في الشكل المجاور، فأوجد $m\widehat{CD}$.

وتران متطابقان، إذن القوسان المقابلان لهما \widehat{AB} , \widehat{CD} متطابقان


$$m\widehat{AB} = m\widehat{CD} = 60^\circ$$

تحقق من فهمك

1) إذا كان $m\widehat{AB} = 78^\circ$ في الشكل أعلاه، فأوجد $m\widehat{CD}$.



مثال 2



جبر: إذا كان: $\odot J \cong \odot K$, $\widehat{MN} \cong \widehat{PQ}$, فأوجد PQ .

\widehat{MN} , \widehat{PQ} قوسان متطابقان في دائرتين متطابقتين،
لذا فإن الوترين MN , PQ متطابقان.

تعريف القطع المتطابقة


$$MN = PQ$$

$$\text{بالتعمييض} \quad 2x + 1 = 3x - 7$$

$$\text{بالتبسيط} \quad 8 = x$$

$$\text{إذن: } PQ = 3(8) - 7 = 17$$

تحقق من فهمك




(2) في $\odot W$, إذا كان $\widehat{RS} \cong \widehat{TV}$, فأوجد RS .

إرشادات للدراسة

منصف القوس:

في الشكل الآتي
 \widehat{FH}
منصف للقوس \widehat{JHG}



أضف إلى

مطويتك

نظريات


4.3 إذا كان قطر (أو نصف قطر) الدائرة عمودياً على وتر فيها،
فإنه يُنصف ذلك الوتر، ويُنصف قوسه.

مثال: إذا كان القطر \overline{AB} عمودياً على \overline{XY} في النقطة Z .
 $\overline{XZ} \cong \overline{ZY}$, $\widehat{XB} \cong \widehat{BY}$
فإن:

4.4 العمود المنصف لوتر في الدائرة هو قطر (أو نصف قطر) لها.

مثال: إذا كان \overline{AB} عموداً منصفاً للوتر \overline{XY} ،
فإن \overline{AB} قطر في $\odot C$.

ستبرهن النظريتين 4.3, 4.4 في السؤالين 21, 23 على الترتيب



استعمال نصف القطر العمودي على الوتر

مثال 3

في $\odot S$, إذا كان $m\widehat{PR} = 98^\circ$, فأوجد $m\widehat{PQ}$.

نصف القطر \overline{SQ} يعادل الوتر \overline{PR} ; لذا وبحسب النظرية 4.3 فإن

$$m\widehat{PQ} = m\widehat{QR} = m\widehat{PR}$$

$$m\widehat{PQ} = \frac{m\widehat{PR}}{2} = \frac{98^\circ}{2} = 49^\circ$$


تحقق من فهمك

(3) أوجد PR في $\odot S$.




استعمال القطر العمودي على الوتر

مثال 4 من واقع الحياة



زجاج ملون: يبين الشكل المجاور تصميمًا على نافذة ذات زجاج ملون، إذا كان \overline{GH} قطرًا طوله 30 in، و \overline{KM} وترًا طوله 22 in، فأوجد JL .

الخطوة 1: ارسم نصف القطر \overline{JK} .



فيتكون $\triangle JKL$ القائم الزاوية.

الربط مع الحياة

عند صناعة الزجاج الملون، يتم تسخينه حتى درجة حرارة 2000°، حتى يصبح لزجاً، ثم تضاف أكاسيد بعض المعادن فتكتسبه لوناً.

الخطوة 2: أوجد JK , KL .

بما أن $GH = 30$ in، فإن $JH = 15$ in، وبما أن نصف قطر الدائرة جميعها متطابقة، فإن $JK = 15$ in.

بما أن القطر \overline{GH} عمودي على \overline{KM} ، فإن \overline{GH} يُنصف الوتر \overline{KM} وفق النظرية 4.3.
إذن: $KL = \frac{1}{2}(22) = 11$ in

الخطوة 3: أوجد JL باستعمال نظرية فيثاغورس.

$$\text{نظرية فيثاغورس} \quad KL^2 + JL^2 = JK^2$$

$$\text{بالتعويض} \quad 11^2 + JL^2 = 15^2$$


$$\text{بالتبسيط} \quad 121 + JL^2 = 225$$

$$\text{بطرح 121 من كلا الطرفين} \quad JL^2 = 104$$

$$JL = \sqrt{104}$$

$$\text{إذن: } JL = \sqrt{104} \approx 10.20 \text{ in}$$

تحقق من فهمك




(4) أوجد TV في $\odot R$ مقررًا إجابتك إلى أقرب جزء من مائة.

إرشادات للدراسة

رسم القطع المستقيمة:
يمكنك إضافة أي معلومة معروفة إلى الشكل؛ لمساعدتك على حل السؤال، ففي المثال 4، رسم نصف القطر \overline{JK} .

أضف إلى مطويتك




نظريّة 4.5

التعبير اللفظي: في الدائرة نفسها أو في دائرتين متطابقتين، يكون الوتران متطابقين إذا و فقط إذا كان بُعداهما عن مركز الدائرة متساوين.

مثال: $\overline{FG} \cong \overline{JH}$ إذا و فقط إذا كان $LX = LY$

الأوتار المتساوية البُعد عن المركز

مثال 5



جبر: في $\odot A$ إذا كان $AB = XY = 22$ ، فأوجد AC .
بما أن الوترين \overline{XY} , \overline{RS} متطابقان. فإن بعديهما عن A متساويان.
إذن:

$$AB = AC$$

$$\text{بالتعويض} \quad 5x = 3x + 4$$

$$\text{بالتبسيط} \quad x = 2$$

$$AB = 5(2) = 10$$

إذن $AB = 10$

تحقق من فهمك


(5) في $\odot H$ إذا كان: $PQ = 3x - 4$, $RS = 14$ ، فأوجد قيمة x

يمكنك استعمال النظرية 4.4؛ لإيجاد النقطة التي تبعد مسافات متساوية عن ثلات نقاط ليست على استقامة واحدة، أو لتعيين مركز دائرة غير معلومة المركز.

إنشاءات هندسية


رسم الدائرة التي تمر بثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة

الخطوة 3 :




المستقيمان m , l يحويان قطرتين في الدائرة المارة بالنقاط الثلاث بحسب النظرية 4.4 ، ونقطة تقاطعهما هي مركز الدائرة. ضع رأس الفرجار عند النقطة D ، وارسم دائرة تمرُّ بالنقاط A, B, C

الخطوة 2 :



أنشئ العمودين m , l المنصفيين للقطعتين \overline{AB} , \overline{BC} .
وسم نقطة تقاطعهما D .





الخطوة 1 :



رسم ثلات نقاط A, B, C ليس على
استقامة واحدة، ثم ارسم القطعتين
 \overline{AB} , \overline{BC} المستقيمتين.

تأكد

المثالان 1, 2: أوجد قيمة x في كلٌ مما يأتي:



في $\odot P$ ، إذا كان: $JK = 10$, $m\widehat{JL} = 134^\circ$ ، فأوجد القياسات الآتية،
مقرّباً إجابتك إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم ذلك.

PQ (5)


المثالان 3, 4

$m\widehat{JL}$ (4)

المثال 5




(6) في $\odot J$ ، إذا كان: $GH = 9$, $KL = 4x + 1$

فأوجد قيمة x .





تدريب وحل المسائل

المثالان 2، 1 جبر: أوجد قيمة x في كلٍ مما يأتي:




$$\odot P \cong \odot Q \quad (11)$$



إذا كان طول قطر $\odot H$ يساوي 18 و $LM = 12$ فإذا كان طول نصف قطر $\odot A$ يساوي 14

و $m\widehat{LM} = 84^\circ$ ، فأوجد القياسين الآتيين مقرّباً
إجابتك إلى أقرب جزء من مائة، إذا لزم ذلك.



$$m\widehat{LK} \quad (14)$$

$$HP \quad (15)$$

$$CE \quad (12)$$


$$EB \quad (13)$$

المثالان 3، 4




الربط مع الحياة

في مناطق التزلج، يتم تثبيت سكة تمكّن المترّلجين من القيام بحركاتٍ بهلوانيةٍ.





(16) **تزلج:** سكة التزلج في الشكل المجاور تأخذ شكل قوس من دائرة، حيث \overline{BD} جزء من قطرها.
إذا كان قياس \widehat{ABC} يساوي 32% من الدائرة الكاملة،
فأوجد $?m\widehat{AB}$



(17) **طرق:** الحافة الخارجية للطريق المنحنية المبيّنة في الشكل المجاور جزء من $\odot C$ التي نصف قطرها 88 ft.
أوجد AB مقرّباً إجابتك إلى أقرب عشرة.




المثال 5

- (18) **جبر:** في $\odot S$ ، إذا كان: $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ ، فأوجد قيمة x .
 (19) **جبر:** في $\odot S$ ، إذا كان: $LM = 16$ ، $PN = 4x$ ، فأوجد قيمة x .



برهان: اكتب برهاناً من النوع المحدد في كلٍ من السؤالين الآتيين:

- (20) برهان ذو عمودين للنظرية 4.2 ،
المعطيات: $\overline{AB} \perp \overline{XY}$ في $\odot C$.
المطلوب: $\overline{XZ} \cong \overline{YZ}$ ، $\widehat{XB} \cong \widehat{YB}$.
- (21) برهان ذو عمودين للنظرية 4.3 ،
المعطيات: $\overline{QR} \cong \overline{ST}$ في $\odot P$.
المطلوب: $\widehat{QR} \cong \widehat{ST}$.




- (22) **تصميم:** صمم زيد شعاراً لمقهى كما في الشكل المجاور. إذا كانت أطوال الأوتار جميعها متساوية، فما قياس كل قوس؟ وما طول كل وتر؟

- (23) **برهان:** اكتب برهاناً ذو عمودين للنظرية 4.4.

- برهان:** اكتب برهاناً ذو عمودين للجزء المُشار إليه من النظرية 4.5 في كلٍ من السؤالين الآتيين.
 (24) إذا تساوى بُعداً وترٍ في دائرةٍ عن مركزها، فإن هذين الوترين متطابقان.
 (25) إذا تطابق وتران في دائرةٍ، فإن بُعدَيهما عن مركزها متساويان.

مسائل مهارات التفكير العليا





- (26) **تحدد:** الوتر \overline{AB} المشترك بين $\odot P$ ، $\odot Q$ يُعمد القطعة المستقيمة الواصلة بين مركزي هاتين الدائرتين، إذا كان $AB = 10$ ، فما طول \overline{PQ} ؟ وضح ذلك.

- (27) **تبرير:** \overline{AB} قطر في الدائرة و \overline{HG} وتر يتقاطع مع \overline{AB} في النقطة X ، فهل العبارة $HX = GX$ صحيحة دائمًا، أم أحياناً، أم غير صحيحة أبداً؟



(28) تحدٌ: الإنشاء الهندسي أدناه يوضح طريقة تعين مركز دائرة معطاة.



الخطوة 2: أنشئ العمود المنصف للوتر \overline{CD} وسمّه \overline{FG} . سُمّ نقطة تقاطع العمودين O .

الخطوة 1: ارسم الوتر \overline{AB} ، وأنشئ العمود المنصف للوتر \overline{AB} وسمّه \overline{CD} .

- (a) استعمل البرهان غير المباشر لإثبات أن \overline{CD} يمرّ بمركز الدائرة، مفترضاً أن مركز الدائرة لا يقع على \overline{CD} .
 (b) أثبت أن O هي مركز الدائرة.


إرشادات للدراسة

البرهان غير المباشر:
 تذكر أن البرهان غير المباشر هو برهان بالتناقض تفترض فيه أن المطلوب غير صحيح، ثم تصل إلى نتيجة تناقض المعطيات أو حقيقة مثبتة من قبل أو مسلمة أو تعريف.

(29) اكتب: إذا أصبح قياس قوس في دائرة ثلاثة أمثال قياسه الأصلي، فهل يصبح طول الوتر المقابل لهاذا القوس الجديد ثلاثة أمثال طول الوتر المقابل للقوس الأصلي؟ ارسم شكلاً يؤيد استنتاجك.


تدريب على اختبار

(31) في $\odot O$ ، قطر عمودي على الوتر \overline{CD} ، ويقطعه في النقطة E ، إذا كان: $AE = 2$ ، $OB = 10$ ، فما طول \overline{CD} ؟



- 4 **A**
6 **B**
8 **C**
12 **D**


إذا كان: $CW = WF$, $ED = 30$ ،
 فأوجد DF ؟




- 60 **A**
45 **B**
30 **C**
15 **D**

مراجعة تراكمية


أوجد قيمة x في كل مما يأتي: (الدرس 4-2)



(34)




(33)



(32)

(35) حرف يدوية: صممت شيماء مخططاً لتطريز 10 ورداتٍ على قطعة قماش، فرسمت 10 أشكال خماسية منتظمة طول ضلع كل منها 3.5 in، ثم رسمت نصف دائرة على كل ضلع، فتشكلت 10 ورداتٍ لكل منها خمس بتلاتٍ، فكم بوصة طول الشريط الذهبي الذي تحتاجه لترميز حواف جميع الوردات؟ قرب إجابتك إلى أقرب بوصة. (الدرس 4-1)

استعد للدرس اللاحق



جبر: أجب عن السؤالين الآتيين مستعيناً بالمعين $WXZY$:

(36) إذا كان: $m\angle 3 = (y^2 - 31)^\circ$ ، فأوجد y .

(37) إذا كان: $m\angle YWZ = 56^\circ$ ، فأوجد $m\angle XZY$.

4-4

الزوايا المحيطية Inscribed Angles

لماذا؟

فيما سبق:

درستُ إيجاد قياس الزوايا الداخلية للمضلعات.

(مهارة سابقة)

والآن:

▪ أجد قياسات الزوايا المحيطية.

▪ أجد قياسات زوايا المضلعات المحاطة بدائرة.


المفردات:

الزاوية المحيطية


inscribed angle

القوس المقابل

intercepted arc



يعلو مدخل قاعة احتفالات قوس على شكل نصف دائرة. زُين هذا المدخل بأشرطة ملونة، بحيث ثبّت أحد طرفي كل شريط عند النقطة A ، والطرف الآخر عند النقطة B . ثم رفعت الأشرطة، وتم تثبيت كل منها عند نقطة مختلفة على القوس مثل P ، كما في الشكل المجاور. لاحظ أن الزوايا المتكونة من هذه الأشرطة تبدو متطابقة، بغض النظر عن موقع النقطة P .



الزاوية المحيطية: الزاوية المحيطية هي زاوية يقع رأسها على الدائرة، ويحتوي ضلعها على وترتين في الدائرة. فالزاوية QRS هي زاوية محيطية في $\odot C$

القوس المقابل للزاوية المحيطية هو قوس يقع داخل الزاوية المحيطية، ويقع طرفاه على ضلعيها. القوس الأصغر \widehat{QS} في $\odot C$ هو القوس المقابل للزاوية QRS .

توجد ثلاث حالات للزاوية المحيطية في الدائرة.

الحالة الثالثة	الحالة الثانية	الحالة الأولى
يقع مركز الدائرة P خارج الزاوية المحيطية.	يقع مركز الدائرة P داخل الزاوية المحيطية.	يقع مركز الدائرة P على أحد ضلعي الزاوية المحيطية.

في الحالة الأولى يكون أحد ضلعي الزاوية المحيطية قطرًا للدائرة


والنظرية الآتية صحيحة لهذه الحالات الثلاث جميعها.

نظريّة الزاوية المحيطية

التعبير اللغوي: قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس القوس المقابل لها.

$$m\angle 1 = \frac{1}{2} m\widehat{AB}, m\widehat{AB} = 2m\angle 1$$

مثال:



ستبرهن النظرية 4.6 للحالتين الثانية والثالثة للزاوية المحيطية في السؤالين 28، 29 على الترتيب

وزارة التعليم


Ministry of Education

الدرس 4-4 الزوايا المحيطية 201

2022 - 1444

برهان

نظرية الزاوية المحيطية (الحالة الأولى)



المعطيات: $\angle B$ محيطية في $\odot P$.

$$\text{المطلوب: } m\angle B = \frac{1}{2}m\widehat{AC}$$


البرهان: تعلم أن $\angle B$ محيطية في $\odot P$, وأن \overline{PB} نصف قطر في $\odot P$.

ارسم نصف قطر آخر \overline{PC} حيث إن كل نقطتين تحددان مستقيماً واحداً، وهذا سيقودنا إلى:

المبررات	العبارات
1) أنصاف أقطار الدائرة جمیعها متطابقة.	$\overline{PB} \cong \overline{PC}$ (1)
2) تعريف المثلث المتطابق الضلعين	$\triangle PBC$ متطابق الضلعين. (2)
3) نظرية المثلث المتطابق الضلعين	$m\angle B = m\angle C$ (3)
4) نظرية الزاوية الخارجية	$m\angle APC = m\angle B + m\angle C$ (4)
5) بالتعويض (من الخطوة 3 في الخطوة 4 ثم الجمع)	$m\angle APC = 2m\angle B$ (5)
6) تعريف قياس القوس	$m\widehat{AC} = m\angle APC$ (6)
7) بالتعويض (من الخطوة 5 في الخطوة 6)	$m\widehat{AC} = 2m\angle B$ (7)
8) خاصية التمايز للمساواة	$2m\angle B = m\widehat{AC}$ (8)
9) خاصية القسمة للمساواة	$m\angle B = \frac{1}{2}m\widehat{AC}$ (9)

استعمال الزوايا المحيطية لايجاد قياسات

مثال 1




أوجد القياسين الآتيين مستعملًا الشكل المجاور:
 $m\widehat{PO}$ (b) $m\angle P$ (a)

$$m\widehat{PO} = 2m\angle N \\ = 2(56^\circ) = 112^\circ$$

$$m\angle P = \frac{1}{2}m\widehat{MN} \\ = \frac{1}{2}(70^\circ) = 35^\circ$$

تحقق من فهمك



أوجد القياسات الآتية مستعملًا الشكل المجاور:

$$m\angle C \text{ (1B)}$$


$$m\widehat{CF} \text{ (1A)}$$

هناك علاقة بين الزاويتين المحيطيتين اللتين تقابلان القوس نفسه في دائرة.

نظريّة 4.7

أضف إلى
مطويتك

التعبير اللفظي: إذا قابلت زاويتان محيطيتان في دائرة القوس نفسه أو قوسين متطابقين، فإن الزاويتين تكونان متطابقتين.




$$\angle B \cong \angle C, \text{ إذن } \widehat{AD} \text{ تقابلان } \angle B, \angle C.$$

مثال:

مثال 2

استعمال الزوايا المحيطية لإيجاد قياسات



جبر: أوجد $m\angle T$ مستعملاً الشكل المجاور.

$$\text{تعريف تطابق الزوايا} \quad \angle T \cong \angle U$$

$$m\angle T = m\angle U$$

$$\text{بالتعويض} \quad 3x - 5 = 2x + 15$$


بالتبسيط

$$x = 20$$

$$\therefore m\angle T = (3(20) - 5)^\circ = 55^\circ$$

تحقق من فهمك

(2) إذا كان: $m\angle S = (3x)^\circ$, $m\angle V = (x + 16)^\circ$ فأوجد $m\angle T$ مستعملاً الشكل أعلاه.



استعمال الزوايا المحيطية في البراهين

مثال 3

اكتب برهاناً ذا عمودين.

$$\widehat{JM} \cong \widehat{KL}$$

$$\triangle JMN \cong \triangle KLN$$

البرهان:


المبررات	العبارات
1) معطيات	$\widehat{JM} \cong \widehat{KL}$ (1)
2) إذا كانت الأقواس متطابقة؛ فإن الأوتار المقابلة لها تكون متطابقة أيضاً.	$\overline{JM} \cong \overline{KL}$ (2)
3) تعريف القوس المقابل.	$\angle M \cong \angle L$ (3)
4) الزوايا المحيطية التي تقابل القوس نفسه تكون متطابقة.	$\angle JNM \cong \angle KNL$ (4)
5) الزوايا المتناظرة بالرأس تكون متطابقة.	$\triangle JMN \cong \triangle KLN$ (5)
AAS (6)	$\triangle JMN \cong \triangle KLN$ (6)

تحقق من فهمك

(3) اكتب برهاناً ذا عمودين:

$$\widehat{QR} \cong \widehat{ST}, \widehat{PQ} \cong \widehat{PT}$$

$$\triangle PQR \cong \triangle PTS$$



إرشادات للدراسة

المضلعات المحاطة

بداية:

يكون المضلع محاطاً

بدائرة، إذا وقعت رؤوسه

جميعها على الدائرة

نفسها.

زوايا المضلعات المحاطة بدائرة: للمثلثات والأشكال رباعية المحاطة بدائرة خصائص خاصة.

النظرية 4.8

التعبير اللغطي: تقابل الزاوية المحيطية في مثلث قطر أو نصف دائرة، إذا وفقط إذا كانت هذه الزاوية قائمة.


مثال: إذا كانت \widehat{FJH} نصف دائرة، فإن $m\angle G = 90^\circ$.

إذا كان $m\angle G = 90^\circ$ ، فإن \widehat{FJH} هي نصف دائرة.

ويكون \overline{FH} قطرًا فيها.

أضف إلى

مطويةك



وزارة التربية والتعليم

Ministry of Education

2022 - 1444

الدرس 4-4 الزوايا المحيطية

ستبرهن النظرية 4.8 في السؤال 31


203

مثال 4

إيجاد قياسات زوايا المثلث المحاط بدائرة

جبر: أوجد $m\angle F$ مستعملًا الشكل المجاور.

قائم الزاوية؛ لأن $\angle G$ محاطة تقابل نصف دائرة.



نظريّة مجموع زوايا المثلث

$$m\angle F + m\angle G + m\angle H = 180^\circ$$

بالتعويض

$$(4x + 2)^\circ + 90^\circ + (9x - 3)^\circ = 180^\circ$$

بالتبسيط

$$(13x)^\circ + 89^\circ = 180^\circ$$

طرح 89 من كلا الطرفين

$$13x = 91$$

بقسمة كلا الطرفين على 13

$$x = 7$$

إذن: $m\angle F = (4(7) + 2)^\circ = 30^\circ$

تحقق من فهمك


(4) إذا كان $m\angle F = (7x + 2)^\circ$, $m\angle H = (17x - 8)^\circ$ ، فأوجد قيمة x مستعملًا الشكل أعلاه.

يمكنك إحاطة مختلف أنواع المثلثات، بما فيها المثلث القائم الزاوي بدائرة إلا أن أنواعًا معينة فقط من الأشكال رباعية يمكنك إحاطتها بدائرة.

نظرية 4.9

أضف إلى

مطويتك



التعبير اللغطي: إذا كان الشكل رباعي محاطاً بدائرة، فإن كل زاويتين متقابلتين فيه متكمالتان.

إذا كان الشكل رباعي $KLMN$ محاطاً بـ $\odot A$ ، فإن $\angle L, \angle N$ متكمالتان و $\angle K, \angle M$ متكمالتان أيضًا.

إرشادات للدراسة


الأشكال رباعية:

يمكن إثبات نظرية 4.9، بإثبات أن القوسين المقابلين لكل زاويتين متقابلتين في الشكل رباعي المحاط بدائرة يكوتان دائرة كاملة.

سوف تُبرهن النظرية 4.9 في السؤال 27

مثال 5 من واقع الحياة

إيجاد قياسات الزوايا



مجوهرات: يحتوي العقد الظاهر في الشكل على جوهرة بصورة مضلعي رباعي محاط بدائرة، أوجد $m\angle A, m\angle B$.

بما أن $ABCD$ شكل رباعي محاط بدائرة، فإن كل زاويتين متقابلتين فيه متكمالتان.

$$\text{كل زاويتين متقابلتين في رباعي دائري متكمالتين} \quad m\angle B + m\angle D = 180^\circ \quad m\angle A + m\angle C = 180^\circ$$

بالتعويض

$$(2x - 30)^\circ + x^\circ = 180^\circ \quad m\angle A + 90^\circ = 180^\circ$$

بالتبسيط

$$(3x)^\circ - 30^\circ = 180^\circ \quad m\angle A = 90^\circ$$

بإضافة 30 لـ كلا الطرفين

$$3x = 210$$

بقسمة كلا الطرفين على 3


$$x = 70$$

إذن: $m\angle A = 90^\circ, m\angle B = (2(70) - 30)^\circ = 110^\circ$

تحقق من فهمك


(5) المضلعي $WXYZ$ شكل رباعي محاط بـ $\odot V$ ،

أوجد $m\angle X, m\angle Y$.




أوجد كل قياس مما يأتي:



المثال 1



$m\widehat{RT}$ (2)



$m\angle B$ (1)




(4) علوم: يُبيّن الشكل المجاور انكسار أشعة الضوء في قطرة مطر لإنتاج ألوان الطيف، فإذا كان $m\widehat{ST} = 144^\circ$ ، فأوجد $m\angle R$ ؟


جبر: أوجد كلاً من القياسين الآتيين:

المثال 2

$m\angle B$ (6)



$m\angle H$ (5)




(7) برهان: اكتب برهانًا ذا عمودين.

المعطيات: \overline{SU} نصف.

$\triangle RVS \cong \triangle UVT$: المطلوب

جبر: أوجد قيمة كل مما يأتي:

المثال 3






المثالان 4, 5

$m\angle C, m\angle D$ (10)

x (9)

$m\angle R$ (8)



تدريب وحل المسائل




أوجد كل قياس مما يأتي:

المثال 1


$m\angle P$ (13)

$m\angle K$ (12)

$m\widehat{DH}$ (11)




المثال 2 جبر: أوجد كل قياسٍ ممّا يأتي:




$$m\angle A \text{ (16)}$$

$$m\angle C \text{ (17)}$$



$$m\angle R \text{ (14)}$$

$$m\angle S \text{ (15)}$$




المثال 3 (18) برهان: اكتب برهاناً ذا عمودين.

المعطيات: $m\angle T = \frac{1}{2}m\angle S$


المطلوب: $m\widehat{TUR} = 2m\widehat{US}$

المثال 4 جبر: أوجد قيمة كل ممّا يأتي:




$$x \text{ (20)}$$

$$m\angle C \text{ (22)}$$



$$x \text{ (19)}$$


$$m\angle T \text{ (21)}$$



$$m\angle H \text{ (24)}$$

$$m\angle G \text{ (26)}$$

المثال 5 جبر: أوجد كل قياسٍ ممّا يأتي:



$$m\angle T \text{ (23)}$$

$$m\angle Z \text{ (25)}$$

(27) برهان: اكتب برهاناً حراً للنظرية 4.9.

برهان: برهن النظرية 4.6 لحالتي الزاوية المحيطية في الدائرة فيما يأتي:

(28) الحالة الثانية: (29) الحالة الثالثة:



المعطيات: يقع المركز P خارج $\angle ABC$. المعطيات: يقع المركز P داخل $\angle ABC$.

قطر للدائرة.

قطر للدائرة.

$$m\angle ABC = \frac{1}{2}m\widehat{AC}$$

$$m\angle ABC = \frac{1}{2}m\widehat{AC}$$



برهان: اكتب برهاناً من النوع المحدد لكل من النظريتين الآتتين:

(31) النظرية 4.8 ، برهاناً ذا عمودين.

(30) النظرية 4.7 ، برهاناً ذا عمودين.



(32) تمثيلات متعددة: في هذا السؤال ستسقسي العلاقة بين القوسين المحصورين بين وترتين متوازيتين في الدائرة.

a) هندسياً: ارسم دائرة تحوي وترتين متوازيتين هما \overline{AB} , \overline{CD} مستعملاً الفرجار، ثم صل D , A برسم \overline{AD} .

b) عددياً: أوجد $m\angle A$, $m\angle D$ مستعملاً المقلة، ثم حدد $m\widehat{AC}$, $m\widehat{BD}$ ، ما العلاقة بين هذين القوسين؟ فسر إجابتك.

c) لفظياً: ارسم دائرةً أخرى وكرر الخطوتين a, b، ثم ضع تخميناً حول القوسين المحصورين بين وترتين متوازيتين في الدائرة.

مسائل مهارات التفكير العليا

تبير: حدد ما إذا كان يمكن إحاطة كل من الأشكال الرباعية الآتية بدائرة دائماً أو أحياناً أو لا يمكن أبداً. ببر إجابتك.

(36) شكل الطائرة الورقية

(35) المعين

(34) المستطيل

(33) المرربع


(37) تحد: إذا كان مربع ما محاطاً بدائرة، فما نسبة مساحة الدائرة إلى مساحة المربع؟

(38) اكتب: إذا كان مثلث قائم زواياه $90^\circ - 45^\circ - 45^\circ$ محاطاً بدائرة، وأعطيت نصف قطر الدائرة، فاشرح طريقة لإيجاد طولي ساقى هذا المثلث.


(39) مسألة مفتوحة: أوجد شعراً من واقع الحياة يحوي مضلعًا محاطاً بدائرة، وارسمه.

(40) اكتب: بين أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية في الدائرة، وإذا كانت هاتان الزاويتان تقابلان القوس نفسه، فما العلاقة بينهما؟

تدريب على اختبار




(42) إجابة قصيرة: قطر في الدائرة \overline{AB} المجاورة، و AC يساوي 8 in، BC يساوي 15 in، أوجد قطر الدائرة ونصف قطرها ومحيطها.



(41) إذا كان: $m\widehat{AC} = 160^\circ$ ، $m\angle BEC = 38^\circ$ ، فأوجد قيمة $m\angle AEB$ مستعملاً الدائرة المجاورة:

84° **D** 80° **C** 61° **B** 42° **A**

مراجعة تراكمية



إذا كان: 65° , $FL = 24 \text{ in}$, $HJ = 48 \text{ in}$, $m\widehat{HP} = 60^\circ$: (الدرس 3)

$m\widehat{PJ}$ (44) FG (43)

$m\widehat{HJ}$ (46) NJ (45)

استعد للدرس اللاحق



جبر: افترض أن B نقطة متصرف \overline{AC} ، استعمل المعلومات المعطاة في كل مما يأتي لإيجاد القياسات المجهولة:

$$AB = 10s + 2, AC = 49 + 5s, BC = ? \quad (48)$$

$$AB = 4x - 5, BC = 11 + 2x, AC = ? \quad (47)$$

Ministry of Education


2022 - 1444

الدرس 4-4 الزوايا المحيطية


207

اختبار منتصف الفصل

(10) في $\odot B$ ، إذا كان $CE = 13.5 \text{ cm}$ ، فأوجد BD مقرّباً إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.




(11) إذا كانت الدائرة تان أدناه متطابقتين، فأوجد قيمة x وطول الوتر. (الدرس 4-3)



أوجد القياس المطلوب في كلٍ من السؤالين الآتيين: (الدرس 4-4)


$$m\angle A \quad (13)$$

في الدائرة أدناه:




$$m\widehat{TU} \quad (12)$$

في الدائرة أدناه:



(14) اختيارات متعددة: أوجد قيمة x في الشكل أدناه: (الدرس 4-4)



5 C

90 D

1.8 A

46 B



(15) رُسم مربع طول ضلعه 14 cm ، بحيث تقع رؤوسه على دائرة، فما قطر هذه الدائرة؟

أجب عن الأسئلة 3-1، مستعيناً بالدائرة أدناه. (الدرس 4-1)

(1) سُمّ الدائرة.

(2) سُمّ قطرًا.

(3) سُمّ وتراً لا يكون قطرًا.

(4) درجة هوائية: قطر إطار دراجة هوائية يساوي 24 in (الدرس 4-1)

(a) أوجد محيط إطار الدراجة.

(b) ما المسافة بالبوصات التي تقطعها الدراجة عندما يدور إطارها 100 دورة؟


أوجد قطر ونصف قطر الدائرة المعطى محاطها في كلٍ من السؤالين الآتيين مقرّباً إجابتك إلى أقرب جزء من مئة. (الدرس 4-1)

4

$C = 78 \text{ ft}$ (6)

$C = 23 \text{ cm}$ (5)

(7) اختيارات متعددة: أوجد طول \widehat{BC} في الشكل أدناه مقرّباً إلى أقرب جزء من مئة: (الدرس 4-2)




30.79 cm C

2.20 cm A

61.58 cm D

4.40 cm B


(8) أفلام: قطر بكرة الفيلم الظاهر في الشكل أدناه 14.5 in (الدرس 4-2)



(a) أوجد $m\widehat{ADC}$.

(b) أوجد طول \widehat{ADC} .

(9) أوجد قيمة x في الشكل المجاور. (الدرس 4-3)



4-5

المماسات Tangents

لماذا؟


رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa





كانت الدراجات الهوائية تُحرّك ساقاً بدفع القدم على الأرض، أمّا الدّراجات الحديثة، فإنّها تستعمل الدواسات والسلال والتروس، حيث تدور السلسلة حول ترس دائريّة. ويُقاس طول السلسلة بين الترسين من نقطتي تماس السلسلة مع الترسين.



المماسات: **المماس** هو مستقيم يقع في المستوى نفسه الذي تقع فيه الدائرة

ويقطعها في نقطتينٍ واحدتينٍ فقط، تُسمى **نقطة التماس**. \overleftrightarrow{AB} مماس لـ $\odot C$ عند النقطة A ، ويُسمى كلّ من \overrightarrow{AB} , \overleftarrow{AB} مماساً للدائرة أيضًا.


المماس المشترك هو مستقيم أو نصف مستقيم أو قطعة مستقيمة تمس الدائرتين في المستوى نفسه، وفي الشكلين أدناه المستقيم ℓ مماس مشترك للدائرتين F , G .




تحديد المماسات المشتركة

مثال 1



ارسم المماسات المشتركة للدائرتين في كلٌّ مما يأتي، وإذا لم يوجد مماس مشترك، فاكتب "لا يوجد مماس مشترك".



هاتان الدائرتان لهما 4 مماسات مشتركة




هاتان الدائرتان لهما مماسان مشتركان



تحقق من فهمك

ارسم المماسات المشتركة للدائرتين في كلٌّ مما يأتي، وإذا لم يوجد مماس مشترك، فاكتب "لا يوجد مماس مشترك".



فيما سبق:

درستُ استعمال نظرية
فيثاغورس لإيجاد أطوال
أضلاع المثلث القائم
الزاوية.

(مهارة سابقة)

والآن:

- أستعمل خصائص المماسات لإيجاد قياسات تتعلق بالدائرة.
- أحل مسائل تتضمن المضلعات المحيطة بدائرة.

المفردات:

المماس

tangent

نقطة التماس

point of tangency

المماس المشترك


common tangent

أقصر مسافة من المماس إلى مركز الدائرة هي نصف القطر المار بنقطة التماس.

أضف إلى مطويتك

النظيرية 4.10

التعبير اللغطي: يكون المستقيم مماساً لدائرة في المستوى نفسه، إذا و فقط إذا كان عمودياً على نصف القطر عند نقطة التماس.



مثـال: يكون المستقيم ℓ مماساً لـ $\odot S$ ، إذا و فقط إذا كان $\ell \perp ST$.

ستبرهن جزأـي النظيرية 4.10 في السؤالين 24 ، 25

مثال 2 تحديد المماس

نصف قطر في $\odot J$ ، حدد ما إذا كانت \overline{KL} مماساً لـ $\odot J$ أم لا ، بـرر إجابتك.


اختبار ما إذا كان $\triangle KJL$ قائم الزاوية.

عكس نظرية فيثاغورس

$$8^2 + 15^2 \stackrel{?}{=} (8+9)^2$$


بالتبسيط

$$289 = 289 \checkmark$$



لذا فإن $\triangle KJL$ قائم الزاوية في $\angle JKL$ ، أي أن \overline{KL} عمودية على \overline{JL} عند النقطة L . وبحسب النظيرية 4.10 يكون \overline{KL} مماساً لـ $\odot J$

تحقق من فهمك



(2) حدد ما إذا كان \overline{GH} مماساً لـ $\odot F$ أم لا ، بـرر إجابتك.

يمكنك استعمال النظيرية 4.10 لإيجاد قيمة مجهولة.

مثال 3 استعمال المماس لإيجاد القيم المجهولة

مماس لـ $\odot G$ عند J ، أوجد قيمة x .

وفقاً للنظيرية 4.10 ، يكون $\overline{JH} \perp \overline{GH}$ ، إذن $\triangle GHJ$ قائم الزاوية.

نظرية فيثاغورس

$$GJ^2 + JH^2 = GH^2$$

$$GJ = x, JH = 12, GH = x + 8$$

$$x^2 + 144 = (x + 8)^2$$

بالضرب

$$x^2 + 144 = x^2 + 16x + 64$$


بالتبسيط

$$80 = 16x$$


بقسمة كلا الطرفين على 16

$$5 = x$$


تحقق من فهمك



أوجد قيمة x في كل من الشكلين الآتـين مفترضاً أن القطعة المستقيمة التي تبدو مماساً للدائرة، هي مماس فعلاً.



(3B)



إرشادات لحل المسألة

حل مسألة أبسط:

يمكنك استعمال

استراتيجية حل مسألة

أبسط ، برسم المثلث

القائم من دون الدائرة

وتقسيمه ، والشكل أدناه


يبين رسم المثلث في

المثال 3




يمكنك استعمال النظريتين 4.10، 4.8، لإنشاء مماسات الدائرة.


إنشاءات هندسية إنشاء مماس لدائرة من نقطة خارجها




الخطوة 4: ارسم $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{DC}$ ، تقابل قطراً للدائرة X ؛ إذن فهي زاوية قائمة؛ لذا فإن \overrightarrow{AD} مماس للدائرة C .



الخطوة 3: أنشئ الدائرة X بنصف قطر \overline{XC} ، وسمّ نقطتي تقاطع الدائرتين D, E .



الخطوة 2: أنشئ العمود \overline{l} وسمّ \overline{CA} ونقطة تقاطع \overline{l} مع \overline{CA} النقطة X .




الخطوة 1: ارسم الدائرة C مستعملاً الفرجار، وحدد نقطة خارجها، ثم ارسم \overline{CA} .

ستنتهي مماساً لدائرة من نقطةٍ عليها في السؤال 26

يمكنك أن ترسم مماسين للدائرة نفسها من نقطة واحدة خارجها.

نظريّة 4.11

التعبير اللغوي: إذا رسمت قطعتان مستقيمتان مماستان لدائرة من نقطة خارجها فإنهما متطابقتان.



مثال: إذا كان $\odot D$ مماسان $\overline{AB}, \overline{CB}$ مما يعادل $\overline{AB} \cong \overline{CB}$

ستبرهن النظرية 4.11 في السؤال 22

استعمال المماسات المتطابقة لإيجاد قياسات

مثال 4

جبر: إذا كان $\overline{AB}, \overline{CB}$ مماسان لدائرة D ، فأوجد قيمة x .

المماسان المرسومان من نقطة خارج الدائرة متطابقان

$$AB = CB$$

بالتعمييض $x + 15 = 2x - 5$

$$15 = x - 5$$


بطرح x من كلا الطرفين
بإضافة 5 لكلا الطرفين

$$20 = x$$


تحقق من فهمك



جبر: أوجد قيمة x في كلٌ من الشكلين الآتيين، مفترضاً أن القطعة المستقيمة التي تبدو مماساً لدائرة هي مماسٌ فعلًا.




(4B)



(4A)

**تحديد المضلعات
المحيطة بدائرة:**

إذا مسّت الدائرة بعض أضلاع المضلع ولم تمسها جميعها، فلا يُعد المضلع محيطًا بالدائرة، وهذا ما يتضح في الجدول.


مضلعات ليست محيطة بدائرة	مضلعات محيطة بدائرة
	

يمكنك استعمال النظرية 4.11؛ لإيجاد قياسات مجهولة في المضلعات المحيطة بدائرة.

إيجاد قياسات في المضلعات المحيطة بدائرة
مثال 5 من واقع الحياة

تصميم مصور: صمم منصور الشعار المبين في الشكل المجاور، إذا كان $\triangle ABC$ محيطًا بالدائرة G ، فأوجد محيطه.

الخطوة 1 : أوجد القياسات المجهولة.



بما أن $\triangle ABC$ يحيط بالدائرة G ، فإن $\overline{AE}, \overline{AD}$ مماسان للدائرة $\odot G$ ، وكذلك $\overline{BE}, \overline{BF}$ مماسان للدائرة $\odot G$.

مما يلي أن $\overline{CF}, \overline{CD}$ مماسات أيضًا.

إذن: $\overline{AE} \cong \overline{AD}, \overline{BF} \cong \overline{BE}, \overline{CF} \cong \overline{CD}$

. $AE = AD = 8 \text{ ft}, BF = BE = 7 \text{ ft}$

وبتطبيق مسلمة جمع القطع المستقيمة يتوج أن $CF + FB = CB$


. $CD = CF = 3 \text{ ft}$ ؛ لأن $CF = CB - FB = 10 - 7 = 3 \text{ ft}$

الخطوة 2 : أوجد محيط $\triangle ABC$.

المحيط يساوي:


$$AE + EB + BC + CD + DA = 8 + 7 + 10 + 3 + 8 = 36$$

إذن محيط $\triangle ABC$ يساوي 36 ft.




تحقق من فهمك ✓

5) الشكل الرباعي $RSTU$ محيط بالدائرة J ، إذا كان محيطه 18 وحدة، فأوجد قيمة x .


تأكد ✓


المثال 1) ارسم المماسات المشتركة للدائرةتين المجاورتين، وإذا لم يوجد مماس مشترك، فاكتبه ”لا يوجد مماس مشترك“.

حدد ما إذا كانت \overline{FG} في كلٍ من الشكلين الآتيين مماسًا للدائرة E أم لا، وبرر إجابتك.



(3)




(2)


المثال 1
المثال 2

المثالان 3، 4


أوجد قيمة x في كلٌ مما يأتي مفترضاً أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا.



(6)




(5)



(4)


(7) **هندسة الحدائق:** خطط مهندس ممرين للمشاة يُشَكِّلُان مماسين لبركتين دائريتين كما في الشكل أدناه. إذا كانت الأطوال معطاة بالأقدام، فأوجد قيمة كلٌ من x و y .



(8) **جبر:** المثلث JKL يحيط بالدائرة R .

(a) أوجد قيمة x .

(b) أوجد محيط $\triangle JKL$.




المثال 5

رسم المماسات المشتركة للدائرتين في كلٌ مما يأتي، وإذا لم يوجد مماس مشترك، فاكتب "لا يوجد مماس مشترك".

المثال 1




(12)



(11)




(10)




(9)

حدّد ما إذا كانت \overline{XY} مماسًا للدائرة المعطاة في كلٌ من السؤالين الآتيين أم لا، وبرر إجابتك.

المثال 2




(14)




(13)

أوجد قيمة x في كلٌ من الأسئلة الآتية مفترضاً أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا.


المثالان 3، 4



(17)




(16)




(15)

إذا كان المضلع يحيط بالدائرة، فأوجد قيمة x ، ثم أوجد محيط المضلع في كلٍ من السؤالين الآتيين:




(19)




(18)

أوجد قيمة x في كلٍ من السؤالين الآتيين، مفترضاً أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا، وقرب إجابتك إلى أقرب جزء من مائة.




(21)



إرشادات للدراسة

تحديد المماسات:

لا تفترض أن القطع المستقيمة مماسات لمجرد أنها تبدو في الشكل كذلك إلا إذا طلب إليك ذلك في السؤال. فيجب أن يحتوي الشكل على رمز الزاوية قائمة أو أن تكون الأطوال المبينة على الشكل تؤكد أن الزاوية قائمة.




اكتب برهانًا من النوع المحدد في كلٍ من السؤالين الآتيين:

(22) برهان ذي عمودين للنظرية 4.11

المعطيات: \overline{AC} مماس لـ $\odot H$ عند النقطة C .

المعطيات: \overline{AB} مماس لـ $\odot H$ عند النقطة B .

المطلوب: $\overline{AC} \cong \overline{AB}$



(23) **أقمار اصطناعية:** يرتفع قمر اصطناعيٌّ مسافة 720 km عن سطح


الأرض التي نصف قطرها 6360 km ، ويمكن منه رؤية المنطقة التي تقع بين المماسين \overline{BA} , \overline{BC} من سطح الأرض.

أوجد BA مقرًباً إجابتك إلى أقرب جزء من مائة.



الربط مع الحياة

يوجد أكثر من 8000 قطعة كبيرة من الركام المداري كالأقمار الاصطناعية ومخلفاتها التي تدور حول الأرض بسرعة 8 km في الثانية تقريبًا.




(24) **برهان:** اكتب برهانًا غير مباشر، لإثبات أنه إذا كان المستقيم مماسًا للدائرة، فإنه يكون عموديًّا على نصف قطرها (الجزء 1 من النظرية 4.10).

المعطيات: ℓ مماس للدائرة S عند T ; \overline{ST} نصف قطر في S .

المطلوب: $\ell \perp \overline{ST}$

(إرشاد: افترض أن ℓ ليس عموديًّا على \overline{ST}).



(25) **برهان:** اكتب برهانًا غير مباشر؛ لإثبات أنه إذا كان المستقيم عموديًّا على نصف قطر الدائرة عند نقطة التقائهما على الدائرة؛ فإنه مماسٌ لهذه الدائرة. (الجزء 2 من النظرية 4.10)


المعطيات: $\ell \perp \overline{ST}$, ℓ نصف قطر في S .

المطلوب: إثبات أن ℓ مماس للدائرة S .


(إرشاد: افترض أن ℓ ليس مماسًا للدائرة S).

(26) إنشاءات هندسية: أنشئ مماساً لدائرة من نقطة واقعة عليها باتباع الخطوات الآتية: ارسم $\odot A$ مستعملاً الفرجار. اختر نقطة P على الدائرة وارسم \overrightarrow{AP} ، ثم أنشئ مستقيماً عمودياً على \overrightarrow{AP} يمر بالنقطة P ، وسمّ المماس المستقيم t .

مسائل مهارات التفكير العليا



(27) تحدّ: \overline{PQ} مماس للدائرتين S, R كما في الشكل المجاور. أوجد PQ ، وبرّر إجابتك.




(28) مسألة مفتوحة: ارسم مثلثاً يحيط بدائرة، ومثلثاً محاطاً بدائرة.

(29) تبرير: $\overline{XY}, \overline{XZ}$ مماسان للدائرة A ، و \overline{XW} مماسان للدائرة B كما في الشكل المجاور. فسر لماذا تكون القطع المستقيمة $\overline{XY}, \overline{XZ}, \overline{XW}$ متطابقة رغم أن نصف قطرى الدائريتين مختلفان.

(30) اكتب: ما عدد مماسات الدائرة التي يمكن رسمها من نقطة خارجها، ومن نقطة عليها، ومن نقطة داخلها؟ برّر إجابتك.

تدريب على اختبار



(32) ما محيط المثلث المجاور؟

- 36 cm **C**
104 cm **D**

- 24 cm **A**
34.4 cm **B**


(31) نصف قطر $\odot P$ يساوي 10 cm ، و \overline{ED} مماس لها عند D ، وتقع F على $\odot P$ وعلى القطعة المستقيمة \overline{EP} إذا كان $ED = 24$ cm ، فما طول \overline{EF} ؟

- 21.8 cm **C**
26 cm **D**


- 10 cm **A**
16 cm **B**

مراجعة تراكمية


أوجد كل قياس مما يأتي: (الدرس 4-4)




$$m\widehat{VX} \quad (35)$$



$$m\angle B \quad (34)$$



$$m\widehat{JK} \quad (33)$$



$$m\widehat{KM} \quad (38)$$

في $\odot F$ ، إذا كان: $GK = 14$ cm ، $m\widehat{GK} = 142^\circ$ ، فأوجد كلاً من القياسات الآتية: (الدرس 4-3)

$$JK \quad (37)$$

$$m\widehat{GH} \quad (36)$$

استعد للدرس اللاحق



حل كلاً من المعادلات الآتية:

$$\text{وزارة التعليم} \quad x = \frac{1}{2}[(180 - 64)] \quad (41)$$

$$x + 12 = \frac{1}{2}[(180 - 120)] \quad (40)$$

$$15 = \frac{1}{2}[(360 - x) - 2x] \quad (39)$$

رابط المدرس الرقمي

www.iен.edu.sa

القاطع والمماس وقياسات الزوايا



Secant, Tangent, and Angle Measures

4-6

لماذا؟



معدل مجال الرؤية عند الإنسان يساوي 180° تقريباً، ولكن زاوية الرؤية في معظم آلات التصوير أضيق من ذلك بكثير، فهي تتراوح بين 20° و 50° . وتحدد زاوية الرؤية في آلات التصوير مقدار ما يمكن أن تلتقطه آلة التصوير على الفيلم من الأجسام المنحنية.



التقاطع على الدائرة أو داخلها: القاطع هو مستقيم يقطع الدائرة في نقطتين فقط، فالمستقيمان j , k هما قاطعن للدائرة C .

عندما يتقاطع قاطعان داخل دائرة، فإن الزوايا المكونة ترتبط بالأقواس التي تقابلها.

فيما سبق:

درست إيجاد أطوال القطع المستقيمة المكونة من مماسات لدائرة.

(الدرس 4-5)

والآن:

- أجد قياسات الزوايا المكونة من مستقيمين يتقاطعان داخل الدائرة أو عليها.

- أجد قياسات الزوايا المكونة من مستقيمين يتقاطعان خارج الدائرة.

المفردات:

القاطع



secant

اضف إلى
مطويتك

نظريّة 4.12

التعبير اللفظي: إذا تقاطع قاطعان أو وتران داخل دائرة، فإن قياس الزاوية المكونة من التقاطع يساوي نصف مجموع قياسي القوس المقابل لهذه الزاوية والقوس المقابل للزاوية التي تقابلها بالرأس.

$$m\angle 2 = \frac{1}{2} (m\widehat{DA} + m\widehat{BC}) \quad \text{و} \quad m\angle 1 = \frac{1}{2} (m\widehat{AB} + m\widehat{CD}) \quad \text{مثال:}$$



برهان

المعطيات:

المطلوب:

البرهان:

قطاعان للدائرة ويتقاطعان داخلها في M .
 $m\angle 1 = \frac{1}{2} (m\widehat{AB} + m\widehat{CD})$
 تعلم أن \overleftrightarrow{AC} , \overleftrightarrow{BD} قاطعان للدائرة، وأنهما يتقاطعان داخلها في M .

رسم القطعة المستقيمة BC ; لتحصل على المثلث MBC وهذا سيقودنا إلى ما يلي:

المبررات	العبارات
1) نظرية الزاوية الخارجية للمثلث	$m\angle 1 = m\angle MBC + m\angle MCB$ (1)
2) قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس القوس المقابل لها.	$m\angle MBC = \frac{1}{2} m\widehat{DC}$, $m\angle MCB = \frac{1}{2} m\widehat{BA}$ (2)
4) بالتعويض	$m\angle 1 = \frac{1}{2} m\widehat{DC} + \frac{1}{2} m\widehat{BA}$ (3)
4) خاصية التوزيع	$m\angle 1 = \frac{1}{2} (m\widehat{DC} + m\widehat{BA})$ (4)



إرشادات للدراسة

طريقة بديلة :

في المثال 1b، يمكنك إيجاد $m\angle DEB$ بحساب مجموع قياسي $\widehat{AC}, \widehat{BD}$ أو \widehat{A}, \widehat{B} .

$$m\widehat{AC} + m\widehat{BD}$$

$$\begin{aligned} &= 360^\circ - (m\widehat{AB} + m\widehat{CD}) \\ &= 360^\circ - (143^\circ + 75^\circ) \\ &= 142^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m\angle DEB &= \frac{1}{2}(m\widehat{AC} + m\widehat{BD}) \\ &= \frac{1}{2}(142^\circ) = 71^\circ \end{aligned}$$

استعمال القاطعين أو الوترين المتتقاطعين


مثال 1

أوجد قيمة x في كلٍ من الأشكال الآتية:

النظرية 4.12 $m\angle TVU = \frac{1}{2}(m\widehat{RS} + m\widehat{UT})$

بالتعميض $x^\circ = \frac{1}{2}(84^\circ + 130^\circ)$

بالتبسيط $= \frac{1}{2}(214^\circ) = 107^\circ$




الخطوة 1: أوجد $m\angle AEB$

النظرية 4.12 $m\angle AEB = \frac{1}{2}(m\widehat{AB} + m\widehat{DC})$

بالتعميض $= \frac{1}{2}(143^\circ + 75^\circ)$

بالتبسيط $= \frac{1}{2}(218^\circ) = 109^\circ$



الخطوة 2: أوجد قيمة x ؛ أي قياس $\angle DEB$.

$\angle AEB, \angle DEB$ زاويتان متكمالتان.

$$x^\circ = 180^\circ - 109^\circ = 71^\circ$$

النظرية 4.12 $m\angle GLH = \frac{1}{2}(m\widehat{HG} + m\widehat{KJ})$


بالتعميض $110^\circ = \frac{1}{2}(x^\circ + 97^\circ)$

بضرب كلا الطرفين في 2




$$220^\circ = (x^\circ + 97^\circ)$$

بطرح 97 من كلا الطرفين

$$123^\circ = x^\circ$$



تحقق من فهمك أوجد قيمة x في كلٍ من الأشكال الآتية :



تذكرة النظرية 4.6، والتي تنص على أن قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس القوس المقابل لها، وتبقى هذه النظرية صحيحة إذا كان أحد ضلعي الزاوية مماساً للدائرة، وتسمى الزاوية في هذه الحالة الزاوية المماسية.


أضف إلى

مطويتك

نظرية الزاوية المماسية

نظرية 4.13

التعبير اللغطي: إذا تقاطع مماس وقاطع عند نقطة التماس، فإن قياس كل زاوية متكونة من التقاطع يساوي نصف قياس القوس المقابل لها.




$$m\angle 2 = \frac{1}{2}m\widehat{ACB} \quad \text{و} \quad m\angle 1 = \frac{1}{2}m\widehat{AB}$$


مثال:

مثال 2 استعمال القاطع والمماس المتقاطعين

أوجد كلاً من القياسات الآتية:




$$\begin{aligned} \text{النظيرية 4.13} \quad m\angle QPR &= \frac{1}{2} m\widehat{PR} \\ \text{بالتعميض والتبسيط} \quad &= \frac{1}{2} (148^\circ) = 74^\circ \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} \text{النظيرية 4.13} \quad m\angle CDF &= \frac{1}{2} m\widehat{FD} \\ \text{بالتعميض} \quad &64^\circ = \frac{1}{2} m\widehat{FD} \\ \text{بضرب كلا الطرفين في 2} \quad &128^\circ = m\widehat{FD} \\ m\widehat{DEF} &= 360^\circ - m\widehat{FD} = 360^\circ - 128^\circ = 232^\circ \end{aligned}$$

تحقق من فهتمك

. $m\angle RQS = 238^\circ$ إذا كان: $m\widehat{QTS} = 238^\circ$



. $m\widehat{JLK} = 2A$ أوجد




التقاطع خارج الدائرة: يمكن أن يتقاطع قاطعان أو قاطع ومماس أو مماسان خارج الدائرة أيضاً، وهنا يرتبط قياس الزوايا المتكوتة بقياسي القوسين المقابلين لها.


نظيرية 4.14

التعبير اللفظي: إذا تقاطع قاطعان أو قاطع ومماس أو مماسان في نقطة خارج دائرة، فإن قياس الزاوية المتكوتة يساوي نصف الفرق الموجب بين قياسي القوسين الم مقابلين لها.


أمثلة:



قاطعان



قاطع ومماس



مماسان

$$m\angle A = \frac{1}{2} (m\widehat{DE} - m\widehat{BC}) \quad m\angle A = \frac{1}{2} (m\widehat{DC} - m\widehat{BC}) \quad m\angle A = \frac{1}{2} (m\widehat{BDC} - m\widehat{BC})$$


إرشادات للدراسة

القيمة المطلقة:


يمكن التعبير عن قياس $\angle A$ في الحالات جميعها بنصف القيمة المطلقة للفرق بين قياسي القوسين، وهكذا لا يؤثر ترتيب القوسين في نتيجة الحسابات.

مثال 3

أوجد كلاً من القياسين الآتيين:
 $m\angle L$ (a)





النظرية 4.14 $m\angle L = \frac{1}{2}(m\widehat{HJK} - m\widehat{HK})$
 بالتعويض $= \frac{1}{2}[(360^\circ - 102^\circ) - 102^\circ]$
 بالتبسيط $= \frac{1}{2}(258^\circ - 102^\circ) = 78^\circ$



النظرية 4.14 $m\angle A = \frac{1}{2}(m\widehat{CD} - m\widehat{BC})$
 بالتعويض $56^\circ = \frac{1}{2}(m\widehat{CD} - 95^\circ)$
 بضرب كلا الطرفين في 2 $112^\circ = m\widehat{CD} - 95^\circ$
 بإضافة 95 لكلا الطرفين $207^\circ = m\widehat{CD}$


تحقق من فهمك



يمكنك تطبيق خصائص القواطع المتقطعة، لحل مسائل من واقع الحياة.


تطبيق خصائص القواطع المتقطعة خارج الدائرة

علوم: يُبيّن الشكل أدناه انكسار شعاع ضوء في قطرة ماء، وانحرافه عن مساره عند النقاط C , B , A , إذا كان $m\angle D = 84^\circ$ و $m\widehat{AC} = 128^\circ$ ، فما قيمة $m\angle XY$ ؟




النظرية 4.14 $m\angle D = \frac{1}{2}(m\widehat{AC} - m\widehat{XY})$
 بالتعويض $= \frac{1}{2}(128^\circ - 84^\circ)$
 بالتبسيط $= \frac{1}{2}(44^\circ) = 22^\circ$

الربط مع الحياة



يتفاوت معامل الانكسار من وسط إلى آخر، ويعبر عن معامل الانكسار N لوسط شفاف ما بالصيغة $N = \frac{c}{V}$ حيث c سرعة الضوء في الفراغ و V سرعة الضوء في ذلك الوسط.



(4) أوجد قيمة x في الشكل المجاور.

تحقق من فهمك

قياس الزاوية	نماذج	موقع رأس الزاوية
نصف قياس القوس المقابل $m\angle 1 = \frac{1}{2}x^\circ$		على الدائرة
نصف مجموع قياسي القوس المقابل للزاوية، والقوس المقابل للزاوية التي تقابلها بالرأس. $m\angle 1 = \frac{1}{2}(x^\circ + y^\circ)$		داخل الدائرة
نصف الفرق الموجب بين قياسي القوسين المقابلين لها $m\angle 1 = \frac{1}{2}(x^\circ - y^\circ)$		خارج الدائرة

تأكد




أوجد كلاً من القياسات الآتية، مفترضاً أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا.

المثالان 2، 1

$$m\angle 2 \text{ (3)}$$

$$m\widehat{TS} \text{ (2)}$$

$$m\angle 1 \text{ (1)}$$






$$m\widehat{LP} \text{ (6)}$$


$$m\widehat{QTS} \text{ (5)}$$

$$m\angle H \text{ (4)}$$

المثالان 3، 4



7) **ألعاب بهلوانية:** ثبّت سطح مائل على البرميل الأول من مجموعة براميل رُبطة مع بعضها؛ ليقدم عليها لاعب السيرك عروضه المثيرة على دراجة نارية. ما قياس الزاوية التي يصنعها السطح المائل مع الأرض؟




تدريب وحل المسائل


أوجد كلاً من القياسات الآتية:

المثالان 2, 1


$m\angle K$ (10)




$m\angle JMK$ (9)




$m\angle 3$ (8)





$m\widehat{GJF}$ (13)



$m\angle DAB$ (12)



$m\widehat{PM}$ (11)



(14) **رياضة:** يُمثل الشكل المجاور ملعباً رياضياً متعدد الأغراض،

إذا كان: $m\widehat{ABC} = 200^\circ$ ، فأوجد كلاً من القياسين الآتيين:


$m\angle ACE$ (a)

$m\angle ADC$ (b)


أوجد كلاً من القياسات الآتية:

المثالان 3, 4



$m\widehat{SU}$ (17)



$m\widehat{XY}$ (16)




$m\angle A$ (15)



(18) **مجوهرات:** يظهر في الشكل المجاور جزء من قلادة،

و نقطتا تمسّك فيها، إذا كانت $x^\circ = 260^\circ$ ،

فأوجد قيمة y° ؟



(19) **تصوير:** استعدّ مصوّر لالتقاط صورة بآلية التصوير للعبة الدوّامة الدائرية،

بحيث كان خطّاً النظر مماسين لها، كما في الشكل المجاور.

a) إذا كانت زاوية الرؤية لآلية التصوير تساوي 35° ، فما قياس قوس الدوّامة


الذي سيظهر في الصورة؟

b) إذا أردت التقاط صورة لقوسٍ قياسه 150° ، فما قياس زاوية الرؤية


التي يجب استعمالها؟

جبر: أوجد قيمة x في كلٍ مما يأتي:


(22)





(21)



(20)



(23) فضاء: يدور قمر اصطناعي في مدار فوق خط الاستواء، أوجد قيمة x° ، وهي قياس القوس المرئي من الأرض للقمر الاصطناعي.



الربط مع الحياة

أول رائد فضاء سعودي هو صاحب اسمه الملكي الأمير سلطان بن سلمان ابن عبدالعزيز على متن مكوك الفضاء (ديسكفرى) في رحلة رقم STS-51G 29 من رمضان 1405هـ الموافق 17 يونيو 1985م.

برهان: اكتب برهاناً ذا عمودين لكل حالة من حالات النظرية 4.14.

(إرشاد: ارسم وتراً يصل نقطتي تقاطع القاطعان أو القاطع والمماس أو المماسان مع الدائرة).



(24) حالة 1

المعطيات: \overrightarrow{FM} مماس للدائرة و \overrightarrow{FL} قاطع لها

المطلوب: $m\angle F = \frac{1}{2}(m\widehat{LH} - m\widehat{GH})$

المعطيات: \overrightarrow{AD} و \overrightarrow{AE} قاطعان للدائرة


المطلوب: $m\angle A = \frac{1}{2}(m\widehat{DE} - m\widehat{BC})$



(26) حالة 3

المعطيات: \overrightarrow{RV} و \overrightarrow{RS} مماسان للدائرة

المطلوب: $m\angle R = \frac{1}{2}(m\widehat{SWT} - m\widehat{ST})$



برهان: اكتب برهاناً حراً للنظرية 4.13

(a) المعطيات: \overrightarrow{AB} مماس لـ $\odot O$ ، \overrightarrow{AC} قاطع لـ \overline{O}


المطلوب: إثبات أن $m\angle CAB = \frac{1}{2}m\widehat{CA}$

(b) برهن نظرية 4.13 إذا كانت الزاوية في فرع (a) زاوية منفرجة.

(28) **تمثيلات متعددة:** في هذا السؤال ستستكشف العلاقة بين النظريتين 8.6، 8.12، 8.13.

(a) هندسياً، انقل الشكل المجاور إلى دفترك. ثم ارسم ثلاثة أشكال متتالية

بحيث يتحرك موقع D مقترباً من C ، معبقاء C, A, B ثابتة في مواقعها.



(b) جدولياً: قدر قياس \widehat{CD} لكلٍ من الدوائر المتتالية، سجل قياسات

\widehat{CD} و \widehat{AB} في جدول، ثم أوجد قيمة x لكلٍ من هذه الدوائر.





(c) لفظياً: صِف العلاقة بين $m\widehat{AB}$ وقيمة x° عندما يقترب $m\widehat{CD}$ من الصفر. ما نوع $\angle AEB$ عندما يكون $m\widehat{CD} = 0$ ؟

(d) تحليلياً: اكتب برهاناً جرياً لإثبات ما توصلت إليه في الفقرة c.

مسائل مهارات التفكير العليا

(29) اكتب: اشرح كيفية إيجاد قياس الزاوية المكونة من تقاطع القاطع والمماس خارج الدائرة.

(30) تحدّ: إذا كانت الدائريتان أدناه متداخلتين
 (31) تبرير: $\triangle ABC$ متطابق الصلعين محاط بالدائرة D ,
 ماذا تستنتج عن $m\widehat{BC}$ و $m\widehat{AB}$ و $m\widehat{AC}$? وضح إجابتك.



(32) مسألة مفتوحة: ارسم دائرةً ومتاسين لها متقطعين، واستعمل المنقلة لقياس الزاوية المكونة، ثم أوجد قياس كلٍّ من القوسين الأكبر والأصغر المتكوّنين. ببر إجابتك.

(33) اكتب: رسمت دائرة محاطة بالمثلث PQR . إذا كان: $m\angle P = 50^\circ$, $m\angle Q = 60^\circ$ ، فصف طريقة إيجاد قياس الأقواس الثلاثة الصغرى المتكوّنة من نقاط التماس.

تدريب على اختبار

إذا كان: $m\angle AED = 95^\circ$, $m\widehat{AD} = 120^\circ$
 فأوجد $m\angle BAC$

إذا كان:
 $m\widehat{NR} = 62^\circ$, $m\widehat{NP} = 108^\circ$
 فما قيمة x ?
 64° C 23° A
 128° D 31° B

مراجعة تراكمية

أوجد قيمة x في كل مما يأتي، مفترضاً أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلاً. (الدرس 4-5)

(38)

(37)

(36)

(39) برهان: اكتب برهاناً ذا عمودين. (الدرس 4-4)

المعطيات: $\overline{RH} \perp \overline{TM}$ نصف دائرة، \widehat{MHT}

المطلوب: $\frac{TR}{RH} = \frac{TH}{HM}$

استعد للدرس اللاحق

حل كلاً من المعادلات الآتية:

وزارة التعليم
Ministry of Education
 $x^2 + 5x = -\frac{25}{4}$ (42)

$x^2 - 6x = -9$ (41)

$x^2 + 13x = -36$ (40)




قطع مستقيمة خاصة في الدائرة

Special Segments in a Circle



المادة:



الأوتار المتقاطعة داخل الدائرة: عندما يتقاطع وتران داخل دائرة، ينقسم كل منها جزأين، ففي الشكل المجاور، انقسم الوتر \overline{AC} إلى \overline{AB} و \overline{BC} ، وكذلك انقسم الوتر \overline{ED} إلى \overline{EB} و \overline{BD} .

تصف النظرية الآتية العلاقة بين القطع المستقيمة الأربع التي تكونت من تقاطع وترتين داخل دائرة.


فيما سبق:

درست إيجاد قياس الأقطار التي تتقاطع داخل متوازي الأضلاع.
(مهارة سابقة)

والآن:

- أجد قياسات الأوتار المتقاطعة داخل الدائرة.
- أجد قياسات القطع المستقيمة المتقاطعة خارج الدائرة.

اضف إلى
مطويتك



نظرية قطع الوتر

التعبير اللغطي: إذا تقاطع وتران في دائرة، فإن حاصل ضرب طولي جزأى الوتر الأول يساوي حاصل ضرب طولي جزأى الوتر الثاني.

$$AB \cdot BC = DB \cdot BE$$

مثال:


ستبرهن النظرية 4.15 في السؤال 15

استعمال تقاطع الوترين

مثال 1

أوجد قيمة x في كلٍ من الشكلين الآتيين:

$$AB \cdot BC = EB \cdot BD \quad (a)$$



$$5 \cdot 12 = x \cdot 10$$

$$60 = 10x$$

$$6 = x$$

بقسمة كلا الطرفين على 10

النظرية 4.15

بالتقسيم


بالضرب

بقسمة كلا الطرفين على 10

$$5 \cdot 12 = x \cdot 10$$

$$60 = 10x$$

$$6 = x$$



$$x^2 + 10x = x^2 + 9x + 8$$

$$10x = 9x + 8$$

$$x = 8$$

$$JK \cdot KL = PK \cdot KM$$


$$(x+10) \cdot x = (x+1)(x+8)$$

$$x^2 + 10x = x^2 + 9x + 8$$


$$10x = 9x + 8$$

$$x = 8$$

أوجد قيمة x في كلٍ من الشكلين الآتيين :



(1B)




تحقق من فهتمك

إيجاد قياس قطع مستقيمة في الدائرة

مثال 2 من واقع الحياة

علوم: شكل قوس المطر الحقيقي دائرة كاملة، ولا يظهر لنا منها إلا القوس الذي يظهر فوق أفق الكره الأرضية. ما نصف قطر الدائرة التي تحوي قوس المطر الظاهر في الشكل أدناه؟




افهم:

المعطيات: قوس المطر الظاهر جزء من دائرة
 \overline{AC} وتر في الدائرة
 \overline{DB} عمود منصف للوتر

المطلوب: إيجاد طول نصف قطر الدائرة التي تحوي قوس المطر الظاهر.

خطط:

رسم نموذجاً للمسألة، بما أن \overline{DE} تنصف الوتر \overline{AC} ، فإن \overline{DE} قطُرٌ في الدائرة. استعمل ناتج ضرب أطوال الأوتار المتقطعة لإيجاد طول قطر الدائرة.



النظرية 4.15

بالتعميض

بالضرب

$$AB \cdot BC = DB \cdot BE$$

$$2.5 \cdot 2.5 = 0.7 \cdot BE$$

$$6.25 = 0.7BE$$

حل:


$$8.9 \approx BE$$

$$DE = DB + BE$$

$$\approx 0.7 + 8.9$$

$$= 9.6$$

بما أن قطر الدائرة يساوي 9.6 mi تقريباً، فإن نصف قطرها يساوي $4.8 \approx 9.6 \div 2$



تحقق: استعمل عكس نظرية فيثاغورس؛ للتحقق من أن المثلث المتكون من نصف القطر وجزء من الوتر وجزء من القطر في الدائرة قائم الزاوية.

مسلمة جمع القطع المستقيمة

$$DB + BF = DF$$

بالتعميض

$$0.7 + BF = 4.8$$

بطرح 0.7 من الطرفين

$$BF = 4.1$$

نظرية فيثاغورس

$$BF^2 + BC^2 = CF^2$$

بالتعميض

$$4.1^2 + 2.5^2 \stackrel{?}{=} 4.8^2$$

بالتبسيط

$$23.06 \approx 23.04 \quad \checkmark$$

تحقق من فهمك



(2) **مصلى قبة الصخرة:** هو أحد أهم معالم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وتعتبر قبته من أهم وأبرز المعالم المعمارية الإسلامية، فهي عبارة عن قبة كروية قطر الدائرة التي تحتوي على القوس الممار بالقمة هي 20 m، ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة فيها عن الجزء الأسطواني الذي يحملها 15m، أوجد المسافة بين طرفي القبة؟



الربط مع الحياة

كلما كانت الشمس قريبة من الأفق، زاد الجزء الذي تراه من قوس المطر. عند غروب الشمس، يمكنك رؤية قوس المطر على شكل نصف دائرة، بحيث تصنع أعلى نقطة في هذا القوس زاوية مقدارها 42 درجة فوق الأفق.


إرشادات لحل المسألة

ارسم شكلاً:

عند حل المسائل اللفظية المتعلقة بالدوائر، يفضل أن ترسم شكلاً وتضع عليه قياسات كل عناصر الدائرة المعطاة، وأن تسمى القياس المجهول برمز متغير لمساعدتك على اختيار خطة الحل المناسبة.

قطع مستقيمة تقاطع خارج الدائرة: الأوتار غير المتوازية في الدائرة وغير المتقطعة داخلها، يمكن أن تمتد لتشكل قواطع تقاطع خارج الدائرة.

أضف إلى مطويتك



نظريّة القاطع 4.16

التعبير اللفظي: إذا رسم قاطعان لدائرة من نقطة خارجها، فإن حاصل ضرب طول القاطع الأول في طول الجزء الخارجي منه، يساوي حاصل ضرب طول القاطع الثاني في طول الجزء الخارجي منه.

$$AC \cdot AB = AE \cdot AD \quad \text{مثال:}$$

ستبرهن النظريّة 4.16 في السؤال 16

إرشادات للدراسة

تبسيط نص النظريّة:
كل طرفٍ من طرفي المعادلة في مثال النظريّة 4.16 هو ناتج ضرب طول الجزء الخارجي من القاطع في طول القاطع بـكامله.

مثال 3

استعمال تقاطع القاطعين

أوجد قيمة x في الشكل المجاور.

النظريّة 4.16

$$JG \cdot JH = JL \cdot JK$$

بالتعويض

$$(x + 8)8 = (10 + 6)6$$

بالضرب


$$8x + 64 = 96$$

بطرح 64 من كلا الطرفين

$$8x = 32$$

بقسمة كلا الطرفين على 8

$$x = 4$$




تنبيه!


استعمال المعادلة الصحيحة:

تأكد من أنك تجد ناتج ضرب طول القاطع في طول القطعة الخارجية منه، وليس في طول القطعة الداخلية منه.

تحقق من فهمك



(3B)




(3A)

يمكنك استعمال معادلة مشابهة لمعادلة النظريّة 4.16 عندما يتقطع مماس وقاطع خارج الدائرة، وفي هذه الحالة المماس أو قطعة المماس التي يقع أحد طرفيها على الدائرة تمثل قطعة المماس الخارجية، وقطعة المماس الكلية في آنٍ معًا.

نظريّة 4.17

أضف إلى مطويتك




التعبير اللفظي: إذا رسم مماس وقاطع لدائرة من نقطة خارجها، فإن مربع طول المماس يساوي حاصل ضرب طول القاطع في طول الجزء الخارجي منه.

$$JK^2 = JL \cdot JM \quad \text{مثال:}$$

ستبرهن النظريّة 4.17 في السؤال 17

استعمال المماس والقاطع

مثال 4



إذا كانت \overline{PQ} مماساً للدائرة كما في الشكل المجاور، فأوجد قيمة x مقرّباً إجابتك إلى أقرب عشرٍ.

النظرية 4.17

بالتعويض

بالضرب

بطرح 64 من كلا الطرفين

$$PQ^2 = QR \cdot QS$$

$$8^2 = x(x + 7)$$

$$64 = x^2 + 7x$$

$$0 = x^2 + 7x - 64$$

استعمل القانون العام لحل المعادلة التربيعية؛ لأن المقدار غير قابل للتحليل.

القانون العام

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = 1, b = 7, c = -64$$

$$= \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4(1)(-64)}}{2(1)}$$

بالتبسيط


$$= \frac{-7 \pm \sqrt{305}}{2}$$

باستعمال الحاسبة

$$\approx -12.2 \text{ أو } 5.2$$

وبما أنه لا يمكن أن تكون الأطوال سالبة، فإن قيمة x تساوي 5.2 تقريرياً.

تحقق من فهمك




4) \overline{AB} مماس للدائرة في الشكل المجاور، أوجد قيمة x مقرّباً إجابتك إلى أقرب عشرٍ.


تأكد

الأمثلة 4, 3, 1


أوجد قيمة x في كلٍ من الأشكال الآتية، مفترضاً أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة، هي مماساتٌ فعلًا.




(2)




(1)



(4)



(3)









5) آثار: يبيّن الشكل المجاور صورة جزء مكسور من إناءٍ فخاريٍ دائريٍ وُجدَ في موقع أثري. إذا كانت \overline{QS} جزءاً من قطر الدائرة، فما محيط الإناء الفخاري الأصلي؟ قرب إجابتك إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ.

المثال 2

الأمثلة 1, 3, 4


أوجد قيمة x في كلٍ من الأشكال الآتية مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة، هي مماسات فعلًا، وقرب إجابتك إلى أقرب عشر.




(11) **كعك:** توزع سلْمَى الكعك في حفل. إذا كانت أبعاد القطعة المتبقية من الكعكة كما في الشكل المجاور، فماً قطر الكعكة الأصلية؟

أوجد قيم المتغيرات في كلٍ من الأشكال الآتية، مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا، وقرب إجابتك إلى أقرب عشر.


المثال 2



(14)



(13)



(12)

برهان: اكتب برهانًا من النوع المحدد لـ كلٍ من النظريات الآتية:

(إرشاد: ارسم أوتارًا تصل نقاط القطع المستقيمة المتقطعة داخل الدائرة أو خارجها بالدائرة)

(16) برهان حرٌ للنظرية 4.16




(15) برهان ذي عمودين للنظرية 4.15

المعطيات: المعطيات: \overline{AC} و \overline{AE} قاطعان دائرة.

المعطيات: \overline{AC} و \overline{DE} وتران متقطعان في B .

المطلوب: $AB \cdot AC = AD \cdot AE$

المطلوب: $AB \cdot BC = EB \cdot BD$




(17) برهان ذي عمودين للنظرية 4.17

المعطيات: \overline{JK} مماس، \overline{JM} قاطع

المطلوب: $JK^2 = JL \cdot JM$

مسائل مهارات التفكير العليا




- (18) اكتشف الخطأ: يحسب كل من خالد وعبدالعزيز قيمة x في الشكل المجاور .
فكتب خالد المعادلة: $3(5) = 2x$ ، بينما كتب عبدالعزيز المعادلة:
 $3(8) = 2(2 + x)$. هل أيٌّ منهما كتب المعادلة الصحيحة؟ بره إجابتك.

(19) تبرير: إذا تقاطع وتران في مركز دائرة، فهل تكون قياسات الأقواس المحصورة بينهما متساوية أحياناً، أم دائماً، أو غير متساوية أبداً؟

(20) اكتب: إذا تقاطع وتران داخل الدائرة، فصفِ العلاقة بين جزأى الأول وجزأى الثاني.

تدريب على اختبار

- (22) إجابة مطولة: \overline{BA} , \overline{BC} مماسان للدائرة في الشكل أدناه، $m\angle ABC = 70^\circ$




- (a) اكتب معادلتين تربطان بين x° و y° .
(b) أوجد قيمة كل من x° و y° .


- (21) مماس للدائرة، و R , S نقطتان عليها ، ما قيمة x مقربة إلى أقرب عشرة؟

5.7 C 7.6 A

4.8 D 6.4 B



مراجعة تراكمية



- (23) نسيج: بعد أن تغزل خيوط الصوف، يتم صبغها، ثم تُمرر على مجموعة من البكرات لكي تجف، والشكل المجاور يُظهر إحدىمجموعات البكرات، لاحظ أن خيط الصوف يبدو كأنه يتقاطع بعضه مع بعض عند النقطة C ، ولكنه في الواقع غير ذلك.
أوجد $m\widehat{BH}$ مستعملاً معلومات الشكل. (الدرس 4-6)

هندسة إحداثية: مثل بيانياً الشكل وصورته الناتجة عن الإزاحة المعطاة في كلٍّ مما يأتي: (الدرس 4-2)

(24) $\triangle KLM$ الذي رؤوسه: $K(5, -2)$, $L(-3, -1)$, $M(0, 5)$; إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليسار و 4 وحدات إلى أسفل.

(25) الشكل الرباعي $PQRS$ الذي رؤوسه: $P(1, 4)$, $Q(-1, 4)$, $R(-2, -4)$, $S(2, -4)$; إزاحة مقدارها 5 وحدات إلى اليسار و 3 وحدات إلى أعلى.

استعد للدرس اللاحق

اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم الذي عُلم ميله ومقطع u له في كلٍّ مما يأتي:

$m = \frac{5}{8}$, $(0, -6)$ (28)

وزارة التعليم
Ministry of Education

2022 - 1444

الدرس 7-4 قطع مستقيمة خاصة في الدائرة 229

$m = 2$, $(0, 8)$ (27)

$-4 = y$, المقطع (26)

$m = -1$, $b: -3$ (30)

$\frac{1}{3} = y$, المقطع (29)

معادلة الدائرة

Equation of Circle



يمكنك استعمال TI-nspire لاستكشاف معادلة الدائرة.


رسم دائرة في المستوى الإحداثي

نشاط

الخطوة 1: رسم دائرة.



- افتح صفحة تطبيق الرسوم البيانية بالضغط على المفاتيح **[menu]** **[esc]** **[on]**:
- ارسم دائرة بالضغط على مفتاح **[menu]** ثم اختار **8: الهندسة** ومنها

2: الأشكال الهندسية واختر **1: الدائرة** ، ثم ضع المؤشر في أي مكان خالٍ لا يقع على أي من المحورين واضغط لرسم نقطة المركز، ومن ثم اسحب لرسم الدائرة ثم اضغط **[esc]** ثم **[enter]**.




الخطوة 2: اكتب معادلة الدائرة.

- عرض معادلة الدائرة، اضغط على المفتاح **[menu]** ، ثم اختر **1: الإجراءات** ومنها **8: الإحداثيات والمعادلات** ، ثم الضغط على محيط الدائرة لظهور المعادلة، قم بوضع المؤشر في مكان مناسب لكتابة المعادلة فيه، ثم اضغط **[enter]**
- بالمثل اضغط على مركز الدائرة، ثم ضع المؤشر في مكان مناسب لكتابة إحداثيّ مركز الدائرة واضغط **[esc]** ثم **[enter]**.



الخطوة 3: غير معادلة الدائرة.

- استعمل المؤشر واضغط على مركز الدائرة وحرّك المركز ثم لاحظ كيف تتغير معادلة الدائرة. أو ظلل إحداثيّ مركز الدائرة وابحث إحداثيّ آخرین لمركز دائرة أخرى ولاحظ كيف يتغير موقع الدائرة ومعادلتها.
- استعمل الأسهم لسحب المركز من نقطة المرکز ونقلها للمكان الذي تريده، ثم اضغط **[enter]**.



الخطوة 4: رسم دائرة مرکزها نقطة الأصل.

- حرّك الدائرة كما فعلت في الخطوة 3، وضع مرکزها عند نقطة الأصل، أو استعمل المؤشر واضغط على محيط الدائرة وفي الوقت نفسه اضغط على الأسهم ثم اطلق المؤشر واستعمل الأسهم لتتكبر الدائرة أو تصغيرها ثم اضغط **[enter]** ولاحظ أثر ذلك في معادلة الدائرة.

تحليل النتائج:

- كيف تتغيّر معادلة الدائرة عند تحريك مركزها؟
- كيف تتغيّر معادلة الدائرة عندما يزيد نصف قطرها أو ينقص؟
- ما معادلة الدائرة التي يقع مرکزها عند نقطة الأصل، ونصف قطرها 4؟ فسر إجابتك.
- ما معادلة الدائرة التي يقع مرکزها عند النقطة (h, k) ، ونصف قطرها r ؟ فسر إجابتك.




4-8

معادلة الدائرة Equation of Circle

لماذا؟

تستعمل أبراج الاتصالات الهاتفية إشارات الراديو لبث مكالمات الهواتف النقالة. ويعطي كل برج منطقة دائرية. وتُصمم الأبراج بحيث تلتقط إشارات البث في أي مكان ضمن منطقة التغطية.



معادلة الدائرة: بما أن نقاط الدائرة جميعها تبعد مسافات متساوية عن مركزها، فإنه يمكنك إيجاد معادلتها باستعمال صيغة المسافة بين نقطتين أو نظرية فيثاغورس.

إذا مثل (y, x) نقطة على دائرة مركزها عند نقطة الأصل كما في الشكل المجاور، فإنه يمكنك أن تستعمل نظرية فيثاغورس؛ لتجد أن معادلة هذه الدائرة $x^2 + y^2 = r^2$.

وإذا لم يقع مركز الدائرة عند نقطة الأصل، ولكن عند النقطة (h, k) كما في الشكل المبين في المفهوم الأساسي أدناه، فإنه يمكنك أن تستعمل صيغة المسافة بين نقطتين لتحصل على معادلة الدائرة.

صيغة المسافة بين نقطتين

$$d = r, (x_1, y_1) = (h, k), (x_2, y_2) = (x, y)$$

بتربيع كلا الطرفين

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$r = \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2}$$

$$r^2 = (x - h)^2 + (y - k)^2$$

فيما سبق:

درست كتابة معادلة المستقيم وتمثيله بيانياً في المستوى الإحداثي.

(مهارة سابقة)

والآن:

- أكتب معادلة الدائرة.
- أمثل الدائرة بيانياً في المستوى الإحداثي.

المفردات:


الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة

standard form
of an equation
of a circle

مفهوم أساسي

الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة

أضف إلى
مطويتك



الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة التي مركزها (h, k) ، وطول نصف قطرها r هي: $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$.

الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة تسمى أيضاً صيغة المركز ونصف القطر.

كتابة معادلة الدائرة باستعمال المركز ونصف القطر

مثال 1

اكتب معادلة الدائرة في كل مما يأتي:

a) مركزها عند $(-8, 1)$ ، وطول نصف قطرها 7

$$\text{معادلة الدائرة} \quad (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$(h, k) = (-8, 1), r = 7 \quad (x - 1)^2 + [y - (-8)]^2 = 7^2$$

بالتبسيط $(x - 1)^2 + (y + 8)^2 = 49$

b) الدائرة الممثلة بيانياً في الشكل المجاور.


مركز الدائرة عند $(0, 4)$ وطول نصف قطرها 3

$$\text{معادلة الدائرة} \quad (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$(h, k) = (0, 4), r = 3 \quad (x - 0)^2 + (y - 4)^2 = 3^2$$

بالتبسيط $x^2 + (y - 4)^2 = 9$

تحقق من فهمك



1A) مركزها نقطة الأصل، ونصف قطرها $\sqrt{10}$. 1B) مركزها النقطة $(-4, 1)$ ، وقطرها 8.

Ministry of Education

إرشادات للدراسة

معادلة الدائرة:

في المثال 1. لاحظ أن معادلة الدائرة بقيت على الصورة القياسية، إذ ليس من الضروري فك التربيع.

مثال 2

كتابة معادلة الدائرة باستعمال مركزها ونقطة عليها

اكتب معادلة الدائرة في كلٌ مما يأتي:
a) مركزها $(-2, 4)$ ، وتمر بالنقطة $(-6, 7)$.


الخطوة 1: أوجد نصف القطر باستعمال صيغة المسافة بين نقطتين.

$$\begin{aligned} \text{صيغة المسافة بين نقطتين} \quad r &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ (x_1, y_1) = (-2, 4), (x_2, y_2) = (-6, 7) \quad &= \sqrt{[-6 - (-2)]^2 + (7 - 4)^2} \\ &= \sqrt{25} = 5 \end{aligned}$$

الخطوة 2: اكتب معادلة الدائرة باستعمال: $h = -2$, $k = 4$, $r = 5$

$$\begin{aligned} \text{معادلة الدائرة} \quad (x - h)^2 + (y - k)^2 &= r^2 \\ h = -2, k = 4, r = 5 \quad &[x - (-2)]^2 + (y - 4)^2 = 5^2 \\ &\text{بالتبسيط} \quad (x + 2)^2 + (y - 4)^2 = 25 \end{aligned}$$

b) الدائرة الممثلة بيانياً جانباً.



الخطوة 1: أوجد نصف القطر باستعمال صيغة المسافة بين نقطتين

$$\begin{aligned} \text{صيغة المسافة بين نقطتين} \quad r &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(5 - 3)^2 + [1 - (-2)]^2} \\ &= \sqrt{13} \end{aligned}$$

الخطوة 2: اكتب معادلة الدائرة باستعمال: $h = 3$, $k = -2$, $r = \sqrt{13}$

$$\begin{aligned} \text{معادلة الدائرة} \quad (x - h)^2 + (y - k)^2 &= r^2 \\ h = 3, k = -2, r = \sqrt{13} \quad &(x - 3)^2 + [y - (-2)]^2 = (\sqrt{13})^2 \\ &\text{بالتبسيط} \quad (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 13 \end{aligned}$$

تحقق من فهمك

2A) مركزها $(5, 4)$ ، وتمر بالنقطة $(-3, 4)$.


2B) مركزها $(-5, -3)$ ، وتمر بالنقطة $(0, 0)$.

تمثيل الدوائر بيانياً: يمكنك تحليل معادلة الدائرة؛ لتجد معلوماتٍ تساعدك على تمثيلها بيانياً في المستوى الإحداثي.

مثال 3

تمثيل الدائرة بيانياً

أوجد مركز ونصف قطر الدائرة التي معادلتها: $9 = (x - 4)^2 + (y + 1)^2$ ، ثم مثّلها بيانياً.
أعد كتابة المعادلة: $9 = (x - 4)^2 + (y + 1)^2$ بالصيغة القياسية لإيجاد المركز ونصف القطر بسهولة.



$$\begin{aligned} (x - 4)^2 + [y - (-1)]^2 &= 3^2 \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 &= r^2 \end{aligned}$$

لذا فإن: $h = 4$, $k = -1$, $r = 3$. أي أن المركز عند النقطة $(4, -1)$ ، ونصف قطر 3 وحدات.

تحقق من فهمك

إرشادات للدراسة

صيغة الجذر:

في المثال 2b، من الأفضل ترك نصف القطر على صورة الجذر؛ لأن نصف القطر سُرِّبع عند كتابة معادلة الدائرة.

إرشادات للدراسة

مسلمات إقليدس:

لقد درست ثلاثة من مسلمات إقليدس في درس 5-2، وهناك مسلمة أخرى لإقليدس، وهي أنه يمكنك رسم دائرة وحيدة بنصف قطر معلوم باختيار أي نقطة لتكون مركزاً لهذه الدائرة.

مثال 4 من واقع الحياة


استعمال ثلاث نقاط لكتابة معادلة الدائرة

أعاصير: وُضعت ثلاث صفارات للتحذير من الأعاصير في ثلاثة مواقع استراتيجية على دائرة حول مدينة، اكتب معادلة الدائرة التي وُضعت عليها الصفارات الثلاث إذا كانت إحداثيات موقعها هي: $A(-8, 3)$, $B(-4, 7)$, $C(-4, -1)$.

فهم: المعطيات: إحداثيات ثلاث نقاط تقع على الدائرة هي:

$$A(-8, 3), B(-4, 7), C(-4, -1)$$

المطلوب: كتابة معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط الثلاث.



خطوة: مثل $\triangle ABC$ بيانياً، ثم أنشئ عمودين منصفين لاثنين من أضلاعه؛ لتعيين مركز الدائرة، حيث إن العمود المنصف لوتر في الدائرة هو قطر (أو نصف قطر) لها، وأوجد طول نصف قطر الدائرة، ثم استعمل المركز ونصف القطر لكتابة معادلتها.

حل: أنشئ عمودين منصفين لضلعين، يظهر من الرسم أن مركز الدائرة يقع عند النقطة $(-4, 3)$ ، ونصف قطر 4

اكتب المعادلة:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$[x - (-4)]^2 + (y - 3)^2 = 4^2$$

$$(x + 4)^2 + (y - 3)^2 = 16$$

تحقق: ارسم دائرة مركزها $(-4, 3)$ ونصف قطرها 4 ، ثم تحقق من أنها تمر بالنقاط الثلاث المعطاة.

تحقق من فهمك

4) اكتب معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط: $R(1, 2)$, $S(-3, 4)$, $T(-5, 0)$



الربط مع الحياة

في الولايات المتحدة يُسجل 1000 إعصار تقريباً خلال السنة الواحدة. أكثر هذه الأعاصير تدميراً هي الأعاصير التي تبلغ سرعتها 250 mi/h أو أكثر، فقد يصل عرض مسارها التدميري إلى 50 mi.

تأكد

المثالان 1, 2


اكتب معادلة الدائرة في كلٌ مما يأتي:

(2) مركزها $(3, 1)$ ، ونصف قطرها 14


(1) مركزها $(9, 0)$ ، ونصف قطرها 5

(4) مركزها $(-5, 3)$ ، وتمر بالنقطة $(1, -4)$.

(3) مركزها نقطة الأصل، وتمر بالنقطة $(2, 2)$.



(6)



(5)

أوجد مركز ونصف قطر الدائرة المعطاة معادلتها في كلٌ مما يأتي، ثم مثّلها بيانياً.

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16 \quad (7)$$

$$x^2 + (y + 1)^2 = 4 \quad (8)$$

$$(x + 3)^2 + y^2 - 9 = 0 \quad (9)$$

المثال 3

المثال 4

المثال 4

(10) **اتصالات:** مُثلت ثلاثة أبراج هواتف نقالة بالنقاط: $X(6, 0)$, $Y(8, 4)$, $Z(3, 9)$. عين موقع برج آخر يبعد مسافات متساوية عن هذه الأبراج الثلاثة، ثم اكتب معادلة الدائرة التي تقع عليها الأبراج الثلاثة.

المثالان 2 ، 1:


اكتب معادلة الدائرة في كلٌ مما يأتي:

- (12) مركزها $(1, 6)$ ، ونصف قطرها 7
 (13) مركزها $(-2, 0)$ ، ونصف قطرها $\sqrt{11}$
 (14) مركزها $(-9, 8)$ ، ونصف قطرها 4
 (15) مركزها $(6, -4)$ ، وتمرُّ بالنقطة $(0, 6)$.


(11) مركزها نقطة الأصل، ونصف قطرها 4

(16) مركزها $(0, 4)$ ، ونصف قطرها 6

(17) مركزها $(-3, 6)$ ، وتمرُّ بالنقطة $(0, 0)$.



(18)



(17)

19) طقس: أظهرت شاشة رadar حلقات دائريّة مركزها إعصار. إذا كان مركز شاشة الرادار هو نقطة الأصل، والحلقة الأولى تبعد 15 mi عن المركز، والمسافة بين كل حلقتين متتاليتين 15 mi، فما معادلة الحلقة الثالثة؟

أوجد مركز ونصف قطر الدائرة المعطاة معادلتها في كلٌ مما يأتي، ثم مثلها بيانياً.

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4 \quad (21)$$

$$x^2 + y^2 = 36 \quad (20)$$

$$(x - 8)^2 + y^2 = 64 \quad (23)$$

$$(x + 4)^2 + (y - 2)^2 = 16 \quad (22)$$

المثال 3

اكتب معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط المعطاة في كلٌ من السؤالين الآتيين، ثم مثلها بيانياً.

$$F(3, -3), G(3, 1), H(7, 1) \quad (25)$$

$$A(1, 6), B(5, 6), C(5, 0) \quad (24)$$

المثال 4

26) صاروخ: اختلاف حجم محرك الصاروخ، يؤدي إلى وصوله إلى ارتفاعات مختلفة، وكلما زاد الارتفاع الذي يصل إليه الصاروخ، كبرت الدائرة التي سيهبط فيها، وفي ظروف الريح الطبيعية يكون طول نصف قطر دائرة الهبوط ثلاثة أمثال ارتفاع الصاروخ.

a) اكتب معادلة دائرة هبوط صاروخ وصل إلى ارتفاع 300 ft، مفترضاً أن مركز الدائرة هو نقطة الأصل.

b) ما طول نصف قطر دائرة هبوط صاروخ وصل إلى ارتفاع 1000 ft؟

27) إذاعة: تبُث إذاعة محلية برامجهَا، فتعطي منطقةً لا يزيد بعدها عن برج البث أكبر من 60 km، إذا كان البرج يقع على بعد 40 km غرباً و 50 km شرقاً من منزل خالد.

a) إذا كان منزل خالد عند نقطة الأصل في المستوى الإحداثي، فاكتب المعادلة التي تمثل الموقف ومثلها بيانياً.


b) ماذا يمثل هذا المنحنى؟ وهل يمكن أن يلتقط خالد البث من البرج الإذاعي؟ اشرح إجابتك.

أوجد مركز ونصف قطر الدائرة التي معادلتها: $x^2 + 6x + y^2 - 2y = 15$.

29) اكتب معادلة الدائرة التي قطرها 12، ويقع مركزها في الربع الثاني، وتمسُّ كلاً من المستقيمين $y = -4$ ، $x = 1$.



(30) تمثيلات متعددة: في هذا السؤال ستسقصي المحل الهندسي المركب لنقطتين، وهو المحل الهندسي الذي يتحقق أكثر من شرطٍ مختلفٍ.



a) **جدولياً:** اختر نقطتين A و B في المستوى الإحداثي، واتكتب إحداثيات 5 نقاط في المستوى تبعد مسافات متساوية عن كل من A و B .

b) **بيانياً:** مثل المحل الهندسي لهذه النقاط بيانياً.

c) **لظيفياً:** صِفِ المحل الهندسي للنقاط جميعها التي تبعد مسافات متساوية عن زوج من النقاط.

d) **بيانياً:** استعمل التمثيل البياني الذي حصلت عليه من الفرع b؛ لتحدد المحل الهندسي لجميع النقاط في المستوى، والتي تبعد مسافة AB عن النقطة B ، ومثله بيانياً.

e) **لظيفياً:** صِفِ المحل الهندسي لجميع النقاط في المستوى، والتي تبعد مسافات متساوية عن نقطة واحدة. ثم صِفِ المحل الهندسي المركب لجميع النقاط التي تبعد مسافات متساوية عن A و B ، وتبعد مسافة AB عن B . واذكر ماذا يمثل بيانياً؟

إرشادات للاختبار

استعمال الصيغ:

تدَّرَّكْ أنه إذا كان السؤال

يُوَظِّفُ المستوى

الإحداثي، فاستعمل

صيغتي المسافة

بين نقطتين ونقطة


المنتصف وكذلك صيغة

الميل لحل السؤال،

وللتَّأكُّد من صحة حلَّك.

مسائل مهارات التفكير العليا

(31) تحدّ: اكتب برهاناً إحداثياً لإثبات أنه إذا قابلت الزاوية المحصورة قطرًا في الدائرة كما في الشكل المجاور ، فإنها قائمة.



(32) تبرير: معادلة دائرة هي: $(x - 5)^2 + (y + 7)^2 = 16$. إذا أجريت إزاحة لمركزها بمقدار 3 وحدات إلى اليمين و 9 وحدات إلى أعلى، فما معادلة الدائرة الجديدة؟ برر إجابتك.

(33) مسألة مفتوحة: عَيِّن ثالث نقاط في المستوى الإحداثي ليست على استقامةٍ واحدةٍ، وارسم مثلثاً رؤوسه هذه النقاط، ثم أنشئ الدائرة التي تحيط به.

(34) اكتب: اشرح العلاقة بين صيغة المسافة بين نقطتين ومعادلة الدائرة .

تدريب على اختبار

(36) إذا كان نصف قطر $\odot F$ يساوي 4، وإحداثياً مركزها هما $(-4, 0)$ ، فأي النقاط الآتية تقع على $\odot F$ ؟

(4, 3) **C**

(4, 0) **A**

(-4, 4) **D**

(0, 4) **B**

(35) أيُّ المعادلات الآتية تمثل معادلة الدائرة التي مركزها $(6, 5)$ ، وتمر بالنقطة $(2, 8)$ ؟

$$(x - 6)^2 + (y - 5)^2 = 5^2 \quad \text{A}$$

$$(x - 5)^2 + (y - 6)^2 = 7^2 \quad \text{B}$$

$$(x + 6)^2 + (y + 5)^2 = 5^2 \quad \text{C}$$

$$(x - 2)^2 + (y - 8)^2 = 7^2 \quad \text{D}$$

مراجعة تراكمية

أوجد قيمة x في كلٍ مما يأتي: (الدرس 4-7)



دليل الدراسة والمراجعة

ملخص الفصل

المفاهيم الأساسية

الدائرة ومحيطها (الدرس 4-1)

- محيط الدائرة يساوي πd أو $2\pi r$.

الزوايا والأقواس والأوتار والزوايا المحيطية (الدروس 4-2 إلى 4-4)

- مجموع قياسات الزوايا المركزية في الدائرة يساوي 360° .
- طول القوس يتناسب تناسياً طردياً مع محيط الدائرة.
- قطر الدائرة العمودي على وتر فيها، ينصفه وينصف القوسين المتقابلين لهذا الوتر.
- قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس القوس الذي تقابلة.

المماس والقاطع وقياسات الزوايا

(الدرسان 4-5, 4-6)

- يقطع المماس الدائرة في نقطة واحدة بالضبط، ويكون عمودياً على نصف قطر المار بنقطة التماس.
- مماساً الدائرة المرسومان من نقطة واحدة خارجها يكونان متطابقين.
- قياس الزاوية المتكوّنة من تلاقي قاطعين خارج الدائرة، يساوي نصف الفرق الموجب بين قياسي القوسين المتقابلين لها.
- قياس الزاوية المتكوّنة من قاطع ومماس يساوي نصف قياس القوس المقابل لهذه الزاوية.

قطع مستقيمة خاصة في الدائرة ومعادلة الدائرة

(الدرسان 4-7, 4-8)

- يمكن إيجاد أطوال الأوتار المتقاطعة في الدائرة باستعمال حاصل ضرب أطوال أجزاء هذه الأوتار.
- معادلة الدائرة التي مركزها (h, k) ونصف قطرها r هي:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

منظم أفكار

الـ طويات

تأكد من أن المفاهيم الأساسية
مدونة في مطويتك.

مفردات أساسية	
القوس الأصغر (ص. 187)	الدائرة (ص. 178)
القوس الأكبر (ص. 187)	المركز (ص. 178)
نصف دائرة (ص. 187)	نصف قطر (ص. 178)
الأقواس المتطابقة (ص. 187)	الوتر (ص. 178)
الأقواس المتجاورة (ص. 188)	القطر (ص. 178)
الدوائر المتطابقة (ص. 189)	طول القوس (ص. 179)
الزاوية المحيطية (ص. 201)	الدائرةان المتشابهان
القوس المقابل (ص. 201)	في المركز (ص. 179)
المماس (ص. 209)	محيط الدائرة (ص. 180)
نقطة التماس (ص. 209)	بأي (π) (ص. 180)
المماس المشترك (ص. 209)	المضلع المحاط بدائرة (ص. 181)
القاطع (ص. 216)	الدائرة الخارجية (ص. 181)
	الزاوية المركزية (ص. 186)
	القوس (ص. 186)

اختبار المفردات

بين ما إذا كانت كل جملة مما يأتي صحيحة أو غير صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فضع كلمة من القائمة أعلاه مكان الكلمة التي تحتها خط؛ لتجعل الجملة صحيحة:


- أي قطعة مستقيمة يقع طرفاها على الدائرة فهي نصف قطر للدائرة.
- الوتر المار بمركز الدائرة هو قطر فيها.
- يقع رأس الزاوية المركزية عند مركز الدائرة، ويحتوي ضلعاها على نصف قطرين للدائرة.
- القوس الذي قياسه أقل من 180° هو قوس أكبر.
- القوس المقابل للزاوية المحيطية هو القوس الذي يقع طرافاه على ضلعي الزاوية المحيطية، ويقع داخلها.
- النقطة الوحيدة التي يتقاطع فيها مستقيم مع دائرة في المستوى نفسه هي المماس المشترك.
- القاطع هو المستقيم الذي يقطع الدائرة في نقطة واحدة بالضبط.
- تكون الدائرةان متحدين في المركز، إذ ويفقظ إذا كان نصف قطريهما متطابقين.

4-1

الدائرة ومحيطها (ص 185-178)

مثال 1

أوجد محيط $\odot A$.



صيغة محيط الدائرة

$$C = 2\pi r$$

بالتعميض

$$= 2\pi(10)$$

باستعمال الحاسبة

$$\approx 62.83$$


محيط $\odot A$ يساوي 62.83 in تقريباً.

استعمل الدائرة في الشكل أدناه للإجابة عن الأسئلة 9-11:

(9) سُمّ الدائرة.

(10) سُمّ نصف قطر للدائرة.

(11) سُمّ وترا لا يكون قطراً.



أوجد القطر ونصف القطر للدائرة المُعطى محيطها في كلٍ مما يأتي، مقرِّباً إجابتك إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ.

$$C = 26.7 \text{ yd} \quad (13)$$

$$C = 43 \text{ cm} \quad (12)$$

$$C = 225.9 \text{ mm} \quad (15)$$


$$C = 108.5 \text{ ft} \quad (14)$$

4-2

قياس الزوايا والأقواس (ص 193-186)

مثال 2

أوجد قيمة x° في الشكل الآتي:



مجموع قياسات
الزوايا المركزية

$$m\angle QVR + m\angle RVS + m\angle SVT + m\angle TVU + m\angle UVQ = 360^\circ$$

بالتعميض

$$167^\circ + x^\circ + 77^\circ + x^\circ + 26^\circ = 360^\circ$$

بالتبسيط

$$270^\circ + 2x^\circ = 360^\circ$$


بالطرح

$$2x^\circ = 90^\circ$$


$$x^\circ = 45^\circ$$



أوجد قيمة x° في كلٍ من السؤالين الآتيين:




(17)



(16)

(18) كتب: أجرى معلم مسحًا حول الكتب التي يفضل طلابه قراءتها، ومثل النتائج التي حصل عليها بالقطاعات الدائرية كما في الشكل أدناه، أجب عما يأتي:

الكتب التي يفضلها الطلاب




(a) أوجد $m\widehat{BC}$

(b) أوجد $m\widehat{AE}$

(c) صِفْ قوس القطاع الدائري الذي يمثل فئة السيرة.

الأقواس والألوار (ص 200-194)

مثال 3
جبر: في ⊙E، إذا كان $EG = EF$ ، فأوجد AB .



الوتران \overline{EG} , \overline{EF} متطابقان، لأن بعديهما عن E متساويان.
إذن:


$$\text{النظرية 4.5} \quad AB = CD$$

$$\text{بالتعمير} \quad 3x - 9 = 2x + 3$$

$$\text{بإضافة 9 لكلا الطرفين} \quad 3x = 2x + 12$$

$$\text{بطرح } 2x \text{ من كلا الطرفين} \quad x = 12$$

$$\text{إذن: } AB = 3(12) - 9 = 27$$



(19) أوجد قيمة x في الشكل المجاور.

في ⊙K، إذا كان: $MN = 16$, $m\widehat{MLN} = 98^\circ$
فأوجد كل قياس مما يأتي مقرّباً إجابتك
إلى أقرب جزء من مائة.

$$LN \quad (21)$$

$$m\widehat{NJ} \quad (20)$$



(22) بُسْتَنَة: يُبيّن الشكل عريشًا يعلوه
قوس من دائرة، إذا كان \overline{CD} جزءاً من
قطرها ويساوي 28% من الدائرة
كاملة، فأوجد $m\widehat{CB}$.


الزوايا المحيطية (ص 207-201)

4-4

مثال 4

أوجد $m\angle B$ و $m\angle D$

بما أن $ABCD$ محاط بدائرة، إذن
الزوايا المتقابلتان متكاملتان.



تعريف الزوايا المتكاملة

$$m\angle D + m\angle B = 180^\circ$$

$$\text{بالتعمير} \quad (23x + 12) + (21x - 8) = 180^\circ$$

$$\text{بالتبسيط} \quad (44x + 4)^\circ = 180^\circ$$

$$\text{بالطرح} \quad 44x = 176$$

$$\text{بالقسمة} \quad x = 4$$



$$\text{إذن: } m\angle D = (23(4) + 12)^\circ = 104^\circ$$

$$\text{و } m\angle B = (21(4) - 8)^\circ = 76^\circ$$


أوجد كلاً من القياسين الآتيين:

$$m\widehat{GH} \quad (24)$$


$$m\angle 1 \quad (23)$$



(25) شعارات: إذا كان $m\angle 1 = 42^\circ$
في الشعار المجاور،
فأوجد $m\angle 5$.



مثال 5



إذا كانت \overline{KL} مماساً لـ $\odot M$ عند K كما في الشكل المجاور، فأوجد قيمة x .

من النظرية 10: $\overline{MK} \perp \overline{KL}$; إذن $\triangle MKL$ مثلث قائم الزاوية.

نظرية فيثاغورس

$$KM^2 + KL^2 = ML^2$$

بالتعميض

$$x^2 + 17^2 = (x + 10)^2$$

بالضرب

$$x^2 + 289 = x^2 + 20x + 100$$

بالتبسيط

$$289 = 20x + 100$$

بالطرح

$$189 = 20x$$


بالقسمة

$$9.45 = x$$

(26) **خيال علمي:** كتب جابر قصة قصيرة، وذكر فيها أن الانقلال أو السفر الفوري بين كوكب معين ثانوي الأبعاد وقمره، يكون ممكناً إذا كان مسار الانقلال مماساً لها. ارسم المسارات الممكنة جميعها.




(27) أوجد قيمة كل من x و y مفترضاً أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلاً، مقرباً إجابتك إلى أقرب عشرة.



مثال 6

أوجد قيمة x في الشكل المجاور.



نصف دائرة؛ لأن \overline{CB} قطر فيها.

$$\text{إذن: } m\widehat{CAB} = 180^\circ$$

النظرية 4.14

$$m\angle D = \frac{1}{2} (m\widehat{CB} - m\widehat{EB})$$

بالتعميض

$$45^\circ = \frac{1}{2} (180 - 10x)^\circ$$

بالضرب


$$90 = 180 - 10x$$

$$-90 = -10x$$


$$9 = x$$

أوجد القياسين الآتيين:


$$m\widehat{AC} \quad (29)$$



$$m\angle 1 \quad (28)$$



(30) **تصوير:** أراد أحمد أن يلتقط صورةً لبرتقالة، فأخذ اللقطة كما في الشكل أدناه، حيث كان خطأ النظر مماسين لها. إذا كان قياس زاوية الرؤية لآلية التصوير 34° ، فأوجد $m\widehat{ACB}$.




دليل الدراسة والمراجعة

قطع مستقيمة خاصة في الدائرة (ص 224-229)

4-7

مثال 7

أوجد قطر الدائرة M .

النظرية 4.15

$$VW \cdot WX = YW \cdot WZ$$

بالتعميض

$$17 \cdot 17 = 10.5 \cdot WZ$$

بالتبسيط

$$289 = 10.5 \cdot WZ$$

بقسمة كلا الطرفين على 10.5

$$27.5 \approx WZ$$

مسلمة جمع القطع المستقيمة

$$YZ = YW + WZ$$

بالتعميض


$$YZ = 10.5 + 27.5$$

بالتبسيط


$$YZ = 38$$

أوجد قيمة x في كلٍ من السؤالين الآتيين:


(32)



(31)



(33) **آثار:** وجد حمزة جزءاً من طبق أثريٍ مكسورٍ في أثناء حفره حفارة لزراعة شجرة. ما محيط الطبق الأصلي؟ قرب إجابتك إلى أقرب جزءٍ من مائة.




معادلة الدائرة (ص 231-235)

4-8

مثال 8

اكتب معادلة الدائرة الممثلة بيانياً أدناه.



مركز الدائرة (6, 4) ونصف قطرها 5

معادلة الدائرة

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$r = 5, (h, k) = (6, 4)$$

بالتبسيط

$$(x - 6)^2 + (y - 4)^2 = 5^2$$

$$(x - 6)^2 + (y - 4)^2 = 25$$

اكتب معادلة الدائرة في كلٍ مما يأتي:

(34) مركزها (-2, 4) ونصف قطرها 5

(35) مركزها (1, 2) وقطرها 14

(36) **أحشاب:** يتعلم عادل في موقع

تدريب خارج البيت إجراءات

السلامة عند قطع الأخشاب،

يتضمن هذا التدريب تكوين دائرة

بذراعه الممدودة؛ للتأكد من عدم


إصابة أي شيء فوقه عندما يقطع

الأخشاب. إذا كان امتداد ذراعه

يصل إلى 19 in وطول مقبض آلة

قطع الخشب 15 in، فما معادلة

دائرة السلامة بالنسبة لعادل مفترضاً أن مركز الدائرة هو نقطة الأصل؟




اختبار الفصل

(9) اختبار من متعدد: ما عدد النقاط المشتركة بين الدائريتين المتحدلتين في المركز؟


2 C
3 D

0 A
1 B


(10) حدد ما إذا كانت \overline{FG} مماساً لـ $\odot E$. ببر إجابتك.



(11) اختبار من متعدد: أيُّ الأشكال أدناه يُمثل دائرة تحيط بمضلع؟




C



A




D



B



(12) أوجد محيط المثلث في الشكل المجاور، مفترضاً أن القطع المستقيمة التي تبدو كأنها مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا.



أوجد كلاً من القياسات الآتية:

x (14)

$m\angle T$ (13)



(15) أزهار: أرادت هند أن تحوّط جذع شجرة بحوض من الأزهار. إذا كان مركز جذع الشجرة هو نقطة الأصل، وأرادت هند أن يتمتد الحوض 3 ft من مركز الشجرة، فما المعادلة التي تمثل الحد الخارجي لحوض الأزهار؟


وزارة التعليم

Ministry of Education


2022 - 1444

(1) برك سباحة: عمق بركة سباحة سطحها دائري الشكل 4 ft، وطول قطر سطحها 25 ft، أوجد محيط سطح هذه البركة مقرّباً إلى أقرب قدم؟


(2) أوجد القيمة الدقيقة لمحيط الدائرة الآتية:




أوجد قيمة x في كل ممّا يأتي:




(4)



(3)




(6)



(5)

(7) اختبار من متعدد: ما طول \overline{ED} في الشكل أدناه؟





25 C

5 A

88.5 D

15 B




(8) إذا كانت $\odot M \cong \odot N$ ، فأوجد قيمة x .



الإِعْدَادُ لِلَاختِباراتِ

خصائص الدائرة

الدائرة هي الشكل الوحيد الذي تكون فيه للزوايا والأقواس والقطع المستقيمة التي تقطع الدائرة خصائص وعلاقات خاصة. ويفترض أن تكون قادرًا على تعين عناصر الدائرة وكتابية معادلتها، وإيجاد قياسات الأقواس والزوايا والقطع المستقيمة في الدائرة.

 $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 360^\circ$  $l = \frac{x^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi r$	 $r = \frac{1}{2}d$ $d = 2r$ $C = 2\pi r \text{ أو } \pi d$
---	--

استراتيجية لتطبيق خصائص الدائرة

الخطوة 1

مراجعة عناصر الدائرة و العلاقات بينها.

- تتضمن العناصر الأساسية: نصف القطر والقطر والوتر والقوس والمماس والقاطع.
- ادرس النظريات الأساسية للدائرة وخصائصها، بالإضافة إلى العلاقة بين عناصر الدائرة.

الخطوة 2

اقرأ نص المسألة، وادرس أي شكل مُعطى بدقة وعنايةً.

- حدد المطلوب من المسألة.
- ضع على الشكل المعلومات التي تتضمنها المسألة، وأي معلومات أخرى يمكن أن تُحدّدها.
- حدد أي النظريات أو الخصائص التي يمكن تطبيقها في حالة هذه المسألة.

الخطوة 3


حل المسألة، ثم تحقق من حلّك.

- طبق النظريات أو الخصائص لحل المسألة.
- تتحقق من إجابتك، وتأكد من كونها مقبولة ومنطقية.



مثال

اقرأ المسألة جيداً، وحدد المطلوب فيها ، ثم استعمل المعطيات لحلها.



أوجد قيمة x في الشكل المجاور:

4 C

2 A

6 D

3 B

اقرأ المسألة وادرس الشكل جيداً. أعطيت دائرة فيها وتران متقابلان لقوسرين متطابقين. يكون الوتران متطابقين إذا وفقط إذا كان القوسان الأصغران المقابلان لهما متطابقين. يمكنك استعمال هذه الخاصية لتكوين معادلة بدلالة x ، ومن ثم حلها.

تعريف القطع المتطابقة

$$4x - 2 = 6x - 10$$

بالطرح

$$4x - 6x = -10 + 2$$

بالتبسيط

$$-2x = -8$$

بقسمة كلا الطرفين على -2

$$\frac{-2x}{-2} = \frac{-8}{-2}$$


بالتبسيط

$$x = 4$$

إذن قيمة x تساوي 4، فالإجابة هي C، تحقق من إجابتك بتعويض 4 في كل من عبارتي الوترتين، ستجد أن طولي الوترين متساويان.


تمارين ومسائل

2) يحيط المثلث RST بالدائرة في الشكل أدناه، ما محيط هذا المثلث؟



اقرأ كل سؤالٍ مما يأتي. ثم اكتب الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة.

1) أوجد قيمة x في الشكل أدناه:



37 وحدة C

33 وحدة A

6 C

4 A

40 وحدة D

36 وحدة B


7 D

5 B

اختبار تراكمي

أسئلة الاختيار من متعدد

- 4) نصف قطر $P\odot$ في الشكل أدناه يساوي 5 ، إذا كان $PR = 3$ ، فما طول \overline{QS} ؟




8 C

10 D

4 A

5 B

- 5) في $\odot M$ ، إذا كان: $\widehat{AB} \cong \widehat{BC} \cong \widehat{CA}$ ، وكان \overrightarrow{CD} مماساً لـ $\odot M$ عند النقطة C كما في الشكل أدناه، فما قياس $\angle ACD$ ؟




90° C

120° D

30° A

60° B

- 6) إذا كانت \overline{HK} مماساً للدائرة L في الشكل أدناه، فأوجد القيمة . $\odot L$ الدقيقة لمحيط L



43.96 cm C


20π cm D

7π cm A

14π cm B

اقرأ كل سؤال مما يأتي، ثم اكتب رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة.

- 1) إذا كان $ABCD$ معيناً، وكان $\angle ABC = 70^\circ$ ، فأوجد $m\angle 1$



70° C

125° D

45° A

55° B

- 2) يقول محمد: ”إذا كنت تقيل في جدة، فإنك تقيل في المملكة العربية السعودية“ ، أي الافتراضات الآتية تبدأ به برهاناً غير مباشر لهذه العبارة؟


A افترض أن شخصاً لا يقيم في جدة.

B افترض أن شخصاً لا يقيم في المملكة العربية السعودية.

C افترض أن شخصاً لا يقيم في المملكة العربية السعودية، ولا يقيم في جدة.

D افترض أن شخصاً يقيم في السعودية، ويقيم في جدة.

- 3) أوجد قيمة x في الشكل أدناه:



26 C

28 D

19 A

23 B


إرشادات للاختبار

السؤال 3: استعمل خصائص الدائرة، لكتابة المعادلة وحلها لإيجاد قيمة x .


أسئلة ذات إجابات قصيرة

اكتب إجاباتك في ورقة الإجابة.


- (7) هل للشكل الآتي تماثل دوراني؟
وإذا كان كذلك، فأوجد رتبة هذا التماثل.



- (11) أوجد قيمة x في الشكل أدناه مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلاً.




- (12) ما طول \overline{EF} في المثلث أدناه؟



أسئلة ذات إجابات مطولة

اكتب إجابتك في ورقة الإجابة مبينًا خطوات الحل.


- (13) استعمل الدائرة في الشكل أدناه لحل الأسئلة الآتية:




- a) ما مركز الدائرة؟
b) ما نصف قطر الدائرة؟
c) اكتب معادلة الدائرة.

- (8) الشكل أدناه مربع محاط بدائرة طول ضلعه 5 cm


ما محيط هذه الدائرة؟ قرب إجابتك إلى أقرب عشر سنتيمتر.



- (9) أوجد قيمة x في الشكل الآتي، مبينًا خطوات الحل.



- (10) تنصف $\angle CAB$ كما في الشكل المجاور، أوجد قيمة x .



هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	إذا لم تستطع الإجابة عن ...
4-8	مهارة سابقة	4-5	2-4	4-7	4-4	3-5	4-5	4-6	4-3	4-2	مهارة سابقة	1-5	فعد إلى الدرس ...

مراجعة بعض المصطلحات والرموز

الرمز في المرحلة الثانوية	الرمز في المرحلة المتوسطة	المصطلح باللغة العربية
x	س	الإحداثي السيني
y	ص	الإحداثي الصادي
h	ل	ارتفاع
$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	الجذر التربيعي
$m \angle A B C$	ق د أ ب ج	قياس زاوية
\angle	د	زاوية
(a, b)	(أ، ب)	زوج مرتب
b	ق	قاعدة
d	٢ نق	قطر دائرة
A, B قطعة مستقيمة طرفاها	أب قطعة مستقيمة طرفاها أ، ب	قطعة مستقيمة
C	مح	محيط الدائرة
C	م	مركز الدائرة
A	م	مساحة
A, B مستقيم يمر بالنقطتين	أب مستقيم يمر بالنقطتين أ و ب	مستقيم
d	ف	المسافة بين نقطتين
r	نق	نصف قطر الدائرة
A, B نصف مستقيم يمر بالنقطة B وطرفه	أب نصف مستقيم	نصف مستقيم
	م	نقطة الأصل

المهندسة الإحداثية

على خط الأعداد:

$$d = |a - b|$$

في المستوى الإحداثي:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

في الفراغ:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, x_2 \neq x_1$$

المسافة بين نقطتين

الميل

على خط الأعداد:

$$M = \frac{a + b}{2}$$

في المستوى الإحداثي:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

نقطة المنتصف

في الفراغ:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

المحيط

$$C = \pi d \quad \text{أو} \quad C = 2\pi r$$

الدائرة

$$P = 4s$$

المربع

$$P = 2\ell + 2w$$

المستطيل

المساحة

$$A = bh \quad \text{أو} \quad A = \frac{1}{2}d_1 d_2$$

المُعَيْن

$$^2A = s$$

المربع

$$A = \frac{1}{2}bh$$

المثلث

$$A = bh \quad \text{أو} \quad A = \ell w$$

المستطيل

$$A = \pi r^2$$

الدائرة

$$A = bh$$

متوازي الأضلاع

$$A = \frac{N}{360} \cdot \pi r^2$$

القطاع الدائري

$$A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$$

شبه المنحرف

المساحة الجانبية

$$L = \frac{1}{2}P\ell$$

الهرم

$$L = Ph$$

المنشور

$$L = \pi r\ell$$

المخروط

$$L = 2\pi rh$$

الأسطوانة

المساحة الكلية للسطح

$$T = \pi r\ell + \pi r^2$$

المخروط

$$T = Ph + 2B$$

المنشور

$$T = 4\pi r^2$$

الكرة

$$T = 2\pi rh + 2\pi r^2$$

الأسطوانة

$$T = \frac{1}{2}P\ell + B$$

الهرم

الحجم

$$V = \frac{1}{3}Bh$$

الهرم

$$V = s^3$$

المكعب

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

المخروط

$$V = \ell wh$$

متوازي المستويات

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

الكرة

$$V = Bh$$

المنشور

$$V = \pi r^2 h$$

الأسطوانة



المعادلات في المستوى الإحداثي

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

معادلة الدائرة

$$y = mx + b$$

معادلة المستقيم
بصيغة الميل والمقطع

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

الصيغة التربيعية

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

معادلة المستقيم
بصيغة الميل ونقطة

حساب المثلثات

$$a^2 + b^2 = c^2$$

نظرية فيثاغورس

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

قانون الجيب

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

قانون جيب التمام

الرموز

متوازي أضلاع	\square	q أو p	$p \vee q$	العامد	a
المحيط	P	المسافة بين النقطتين A و B	AB	مساوٍ تقريرًا لـ	\approx
عمودي على	\perp	يساوي	$=$	القوس الأصغر الذي طرفاه A و B	\widehat{AB}
بأي (ط) النسبة التقريرية	π	لا يساوي	\neq	القوس الأكبر الذي طرفاه A و C	\widehat{ABC}
طول ضلع من مضلع	s	أكبر من	$>$	مساحة المضلع أو الدائرة أو القطاع الدائري	A
مشابه	\sim	أكبر من أو يساوي	\geq	مساحة قاعدة المنشور أو الأسطوانة أو الهرم أو المخروط	B
الجيب	\sin	صورة A	A'	العبارة الشرطية الثانية:	$p \leftrightarrow q$
المستقيم ℓ ، طول المستطيل، طول القوس، الارتفاع الجانبي	ℓ	أقل من	$<$	p إذا وفقط إذا q	
الميل	m	أقل من أو يساوي	\leq	دائرة مركزها P	$\odot P$
الظل	\tan	المساحة الجانبية	L	محيط الدائرة	C
مساحة السطح الكلية	T	قياس القوس AB بالدرجات	$m\widehat{AB}$	العبارة الشرطية: إذا كان p فإن q	
المثلث	Δ	نقطة المتتصف	M	$p \rightarrow q$	
الحجم	V	نفي العبارة p	$\sim p$	مطابق لـ	\cong
عرض المستطيل	w	(x, y, z) الثلاثي المرتب		$q \wedge p$	$p \wedge q$
		موازي لـ	\parallel	جيب التمام	\cos
		ليس موازيًا لـ	\nparallel	درجة	$^\circ$

