

المتجهات في المستوى الاثني


المتجهات 1

فيما سبق

درست العمليات على
المتجهات باستعمال
مقياس الرسم

والآن

١ | اجري العمليات على
المتجهات في المستوى
الاحداثي وأمثلها بيانيا
٢ | اكتب المتجه باستعمال
متجهي الوحدة






لماذا ؟

تؤثر الرياح في سرعة الطائرة واتجاه حركتها؛ لذا يستعمل قائد الطائرة مقاييس مدرّجة؛ لتحديد السرعة والاتجاه الذي يجب على الطائرة السير فيه؛ لمعادلة أثر الرياح ، وعادة ما يتم إجراء هذه الحسابات باستعمال المتجهات في المستوى الإحداثي.



المتجهات 1



الصورة الإحداثية لمتجه

مفهوم أساسي

الصورة الإحداثية لـ $\overrightarrow{AB}$ الذي نقطة بدايته $A(x_1, y_1)$ ، ونقطة نهايته $B(x_2, y_2)$ هي :

$$\langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle$$

المتجهات 1

مثال 1

أوجد الصورة الإحداثية لـ $\overrightarrow{AB}$ ، الذي نقطة بدايته $A(-4, 2)$ ، ونقطة نهايته $B(3, -5)$

الصورة الإحداثية $\overrightarrow{AB} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle$

$(x_1, y_1) = (-4, 2)$, $(x_2, y_2) = (3, -5)$

بسّط $= \langle 3 - (-4), -5 - 2 \rangle$

$= \langle 7, -7 \rangle$

التعبير عن
المتجه بالصورة
الإحداثية

تحقق منه فهمك



المتجهات 1

أوجد الصورة الإحداثية لـ $\overline{AB}$ المُعطاة نقطتا بدايته ونهايته في كلٍّ مما يأتي:

(1B) $A(0, 8), B(-9, -3)$

(1A) $A(-2, -7), B(6, 1)$

المتجهات 1



طول المتجه في المستوى الإحداثي

مفهوم أساسي

إذا كان $\mathbf{v}$ متجهًا، نقطة بدايته (x_1, y_1) ، ونقطة نهايته (x_2, y_2) ، فإن طول $\mathbf{v}$ يُعطى بالصيغة:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

وإذا كانت $\langle a, b \rangle$ هي الصورة الإحداثية للمتجه $\mathbf{v}$ فإن:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

المتجهات 1

مثال 2

أوجد طول $\overrightarrow{AB}$ الذي نقطة بدايته $A(-4, 2)$ ، ونقطة نهايته $B(3, -5)$.

$$\begin{aligned} \text{قانون المسافة بين نقطتين} \quad |\overrightarrow{AB}| &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ (x_1, y_1) &= (-4, 2) , (x_2, y_2) = (3, -5) &= \sqrt{[3 - (-4)]^2 + (-5 - 2)^2} \\ \text{بسّط} &= \sqrt{98} \approx 9.9 \end{aligned}$$

التحقق علمت من المثال 1 أن: $\overrightarrow{AB} = \langle 7, -7 \rangle$ ؛ وعليه فإن: $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{7^2 + (-7)^2} = \sqrt{98}$ ✓

ايجاد طول
المتجه

تحقق من فهمك

المتجهات 1

أوجد طول $\overline{AB}$ المعطاة نقطتا بدايته ونهايته في كلٍّ مما يأتي:

$A(0, 8), B(-9, -3)$ (2B)

$A(-2, -7), B(6, 1)$ (2A)

المتجهات 1



لنر

أوجد الصورة الإحداثية، وطول $\overline{AB}$ ، المُعطاة نقطتا بدايته ونهايته في كلٍّ ممَّا يأتي: (المثالان 1, 2)

(2) $A(2, -7), B(-6, 9)$

(1) $A(-3, 1), B(4, 5)$

المتجهات 1



مفهوم أساسي

العمليات على المتجهات

إذا كان $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2 \rangle$ متجهين، و k عددًا حقيقيًا، فإن:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2 \rangle \quad \text{جمع متجهين}$$

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \langle a_1 - b_1, a_2 - b_2 \rangle \quad \text{طرح متجهين}$$

$$k\mathbf{a} = \langle ka_1, ka_2 \rangle \quad \text{ضرب متجه في عدد حقيقي}$$

المتجهات 1

مثال 3

أوجد كلاً مما يأتي للمتجهات $a = \langle 2, 5 \rangle$, $b = \langle -3, 0 \rangle$, $c = \langle -4, 1 \rangle$:

$c + a$ (a)

$$\begin{aligned} c + a &= \langle -4, 1 \rangle + \langle 2, 5 \rangle \\ &= \langle -4 + 2, 1 + 5 \rangle = \langle -2, 6 \rangle \end{aligned}$$

$b - 2a$ (b)

$$\begin{aligned} b - 2a &= b + (-2)a \\ &= \langle -3, 0 \rangle + (-2)\langle 2, 5 \rangle \\ &= \langle -3, 0 \rangle + \langle -4, -10 \rangle = \langle -7, -10 \rangle \end{aligned}$$

أعد كتابة الطرح كعملية جمع

عوض

اضرب متجهًا في عدد حقيقي، واجمع متجهين

العمليات على
المتجهات

المتجهات 1

تحقق من فهمك

أوجد كلاً مما يأتي للمتجهات: $\mathbf{a} = \langle 2, 5 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle -3, 0 \rangle$, $\mathbf{c} = \langle -4, 1 \rangle$:

$$-3\mathbf{c} \quad (3B)$$

$$4\mathbf{c} + \mathbf{b} \quad (3A)$$

$$2\mathbf{c} + 4\mathbf{a} - \mathbf{b} \quad (3C)$$

المتجهات 1

لدرج




إذا كان: $f = \langle 8, 0 \rangle$, $g = \langle -3, -5 \rangle$, $h = \langle -6, 2 \rangle$ ، فأوجد
كلًا مما يأتي: (مثال 3)

$$f + 2h \quad (8)$$

$$4h - g \quad (7)$$

مقطعة توضيحي

المتجهات 1



المتجهات 1



تاريخ الرياضيات

ويليام رومان هاميلتون
(1805-1865)

طور الرياضي الأيرلندي هاميلتون
نظرية في نظام الأعداد؛ لتوسيع
الأعداد المركبة، ونشر العديد من
المحاضرات فيها. يُذكر أن العديد
من المفاهيم الأساسية في تحليل
المتجهات يعتمد على هذه النظرية.

متجهات الوحدة: يُسمّى المتجه الذي طوله 1 **متجه الوحدة**، ويرمز له بالرمز u ، ولإيجاد متجه الوحدة u الذي له نفس اتجاه المتجه v ، اقسم المتجه v على طوله $|v|$.

$$u = \frac{v}{|v|} = \frac{1}{|v|}v$$

وبذلك يكون $u = \frac{v}{|v|}$. ونكون قد عبّرنا عن المتجه غير الصفري v في صورة حاصل ضرب متجه وحدة بنفس اتجاه v في عدد حقيقي.

المتجهات 1

مثال 4

أوجد متجه الوحدة u الذي له نفس اتجاه $v = \langle -2, 3 \rangle$.

$$u = \frac{1}{|v|}v$$

متجه وحدة باتجاه v

$$= \frac{1}{|\langle -2, 3 \rangle|} \langle -2, 3 \rangle$$

عوض

$$= \frac{1}{\sqrt{(-2)^2 + 3^2}} \langle -2, 3 \rangle$$

$$|\langle a, b \rangle| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{13}} \langle -2, 3 \rangle$$

بسط

$$= \left\langle \frac{-2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}} \right\rangle$$

اضرب متجه في عدد حقيقي

$$= \left\langle \frac{-2\sqrt{13}}{13}, \frac{3\sqrt{13}}{13} \right\rangle$$

أنطق المقام

التحقق بما أن u تمثل حاصل ضرب v في عدد موجب فإن له اتجاه v نفسه. تحقق من أن طول u هو 1.

$$|u| = \sqrt{\left(\frac{-2}{\sqrt{13}}\right)^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{13}}\right)^2}$$

قانون المسافة بين نقطتين

$$= \sqrt{\frac{4}{13} + \frac{9}{13}}$$

بسط

$$= \sqrt{1} = 1 \checkmark$$

بسط

ايجاد متجه
وحدة له نفس
اتجاه متجه
معطى

تحقق منه فهمك

المتجهات 1

أوجد متجه الوحدة الذي له نفس اتجاه المتجه المُعطى في كلِّ ممَّا يأتي:

$$x = \langle -4, -8 \rangle \quad (4B)$$

$$w = \langle 6, -2 \rangle \quad (4A)$$

المتجهات 1


لنر

أوجد متجه وحدة له اتجاه المتجه v نفسه في كل ممّا يأتي:


$$v = \langle 9, -3 \rangle \quad (14)$$

$$v = \langle -2, 7 \rangle \quad (13)$$


المتجهات 1



يُرمز لمتجهي الوحدة بالاتجاه الموجب لمحور x ، والاتجاه الموجب لمحور y بالرمزين $\mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle$ ، $\mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle$ على الترتيب كما في الشكل 1.2.3. كما يُسمَّى المتجهان $\mathbf{i}$ ، $\mathbf{j}$ متجهي الوحدة القياسيين.



الشكل 1.2.4



الشكل 1.2.3

ويمكن استعمال هذين المتجهين للتعبير عن أي متجه $\mathbf{v} = \langle a, b \rangle$ على الصورة $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ كما في الشكل 1.2.4؛ وذلك لأن:



وزارة التعليم

Ministry of Education

2021 - 1443

$$\mathbf{v} = \langle a, b \rangle$$

$$= \langle a, 0 \rangle + \langle 0, b \rangle$$

$$= a\langle 1, 0 \rangle + b\langle 0, 1 \rangle$$

$$= a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$$

$$\langle 1, 0 \rangle = \mathbf{i}, \langle 0, 1 \rangle = \mathbf{j}$$

تسمى الصورة $a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ توافقاً خطياً للمتجهين $\mathbf{i}$ ، $\mathbf{j}$. ويُقصد بها كتابة المتجه بدلالة متجهي الوحدة $\mathbf{i}$ ، $\mathbf{j}$.

المتجهات 1

مثال 5

إذا كانت نقطة بداية المتجه $\overrightarrow{DE}$ هي $D(-2, 3)$ ، ونقطة نهايته $E(4, 5)$ ، فاكتب $\overrightarrow{DE}$ على صورة توافقٍ خطيٍّ لمتجهي الوحدة $\mathbf{i}, \mathbf{j}$.

أولاً، أوجد الصورة الإحداثية لـ $\overrightarrow{DE}$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{DE} &= \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle && \text{الصورة الإحداثية} \\ &= \langle 4 - (-2), 5 - 3 \rangle \\ &= \langle 6, 2 \rangle && \text{بسّط} \end{aligned}$$

ثم أعد كتابة المتجه على صورة توافقٍ خطيٍّ لمتجهي الوحدة.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{DE} &= \langle 6, 2 \rangle && \text{الصورة الإحداثية} \\ &= 6\mathbf{i} + 2\mathbf{j} && \langle a, b \rangle = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} \end{aligned}$$

كتابة متجه على
صورة توافقٍ
خطي

تحقق منه فهمك

المتجهات 1

اكتب المتجه $\overrightarrow{DE}$ المُعطى نقطتا بدايته ونهايته على صورة توافقٍ خطيٍّ لمتجهي الوحدة $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ في كلِّ ممَّا يأتي :

$$D(-3, -8), E(7, 1) \quad (5B)$$

$$D(-6, 0), E(2, 5) \quad (5A)$$

المتجهات 1


لدرّب

اكتب $\overrightarrow{DE}$ ، المُعطاة نقطتا بدايته ونهايته في كلّ ممّا يأتي على صورة توافقٍ خطّي لمتجهي الوحدة $\mathbf{i}, \mathbf{j}$: (مثال 5)

$D(9, -6), E(-7, 2)$ (20)

$D(4, -1), E(5, -7)$ (19)

المتجهات 1



ويمكن كتابة المتجه $\mathbf{v} = \langle a, b \rangle$ ، باستعمال زاوية الاتجاه التي يصنعها $\mathbf{v}$ مع الاتجاه الموجب لمحور x . فمن الشكل 1.2.5 يمكن كتابة $\mathbf{v}$ على الصورة الإحداثية، أو على صورة توافق خطي لمتجهي الوحدة $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ كما يأتي:

الصورة الإحداثية	$\mathbf{v} = \langle a, b \rangle$
عوض	$= \langle \mathbf{v} \cos \theta, \mathbf{v} \sin \theta \rangle$
توافق خطي من $\mathbf{i}, \mathbf{j}$	$= \mathbf{v} (\cos \theta) \mathbf{i} + \mathbf{v} (\sin \theta) \mathbf{j}$

المتجهات 1

مثال

أوجد الصورة الإحداثية للمتجه $\mathbf{v}$ الذي طوله 10 ، وزاوية اتجاهه 120° مع الأفقي .

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \langle |\mathbf{v}| \cos \theta, |\mathbf{v}| \sin \theta \rangle \\ &= \langle 10 \cos 120^\circ, 10 \sin 120^\circ \rangle \\ &= \left\langle 10 \left(-\frac{1}{2} \right), 10 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right\rangle \\ &= \langle -5, 5\sqrt{3} \rangle \end{aligned}$$


الصورة الإحداثية للمتجه $\mathbf{v}$ بدلالة $\theta, |\mathbf{v}|$

$|\mathbf{v}| = 10, \theta = 120^\circ$

$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}, \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

بسّط

التحقق مثل بيانياً: $\mathbf{v} = \langle -5, 5\sqrt{3} \rangle \approx \langle -5, 8.7 \rangle$ ، تجد أن قياس الزاوية التي يصنعها $\mathbf{v}$ مع الاتجاه الموجب لمحور x هي 120° كما في الشكل المجاور،



$$|\mathbf{v}| = \sqrt{(-5)^2 + (5\sqrt{3})^2} = 10 \checkmark$$

إيجاد الصورة
الإحداثية

تحقق منه فهمك

المتجهات 1

أوجد الصورة الإحداثية للمتجه $\mathbf{v}$ المُعطى طوله وزاوية اتجاهه مع الأفقي في كلِّ ممَّا يأتي :

$$|\mathbf{v}| = 24, \theta = 210^\circ \quad (6B)$$

$$|\mathbf{v}| = 8, \theta = 45^\circ \quad (6A)$$

المتجهات 1



لنر

الاتجاه الموجب لمحور x في كل ممّا يأتي:

$$|\mathbf{v}| = 16, \theta = 330^\circ \quad (26)$$

$$|\mathbf{v}| = 12, \theta = 60^\circ \quad (25)$$

المتجهات 1



من الشكل (1.2.5) تستنتج أنه يمكن إيجاد زاوية اتجاه المتجه $\mathbf{v} = \langle a, b \rangle$ مع الاتجاه الأفقي (الموجب لمحور x)
بحل المعادلة المثلثية: $\tan \theta = \frac{|\mathbf{v}| \sin \theta}{|\mathbf{v}| \cos \theta}$ ، أو $\tan \theta = \frac{b}{a}$.

المتجهات 1

مثال 7

أوجد زاوية اتجاه كل من المتجهات الآتية مع الاتجاه الموجب لمحور x .

$$\mathbf{p} = 3\mathbf{i} + 7\mathbf{j} \quad (\mathbf{a})$$

$$\text{معادلة زاوية الاتجاه} \quad \tan \theta = \frac{b}{a}$$

$$a = 3, b = 7 \quad \tan \theta = \frac{7}{3}$$

$$\text{حل بالنسبة إلى } \theta \quad \theta = \tan^{-1} \frac{7}{3}$$

من خلال الصورة الإحداثية للمتجه $x = 3, y = 7$ ، فإن المتجه يقع في الربع الأول، إذن:

$$\text{استعمل الآلة الحاسبة} \quad \theta \approx 66.8^\circ$$

أي أن زاوية اتجاه المتجه $\mathbf{p}$ هي 66.8° تقريبًا كما في الشكل 1.2.6.

$$\mathbf{r} = \langle 4, -5 \rangle \quad (\mathbf{b})$$

$$\text{معادلة زاوية الاتجاه} \quad \tan \theta = \frac{b}{a}$$


$$a = 4, b = -5 \quad \tan \theta = \frac{-5}{4}$$

$$\text{حل بالنسبة إلى } \theta \quad \theta = \tan^{-1} \left(-\frac{5}{4} \right)$$


من خلال الصورة الإحداثية للمتجه $x = 4 > 0, y = -5 < 0$ ، فإن المتجه يقع في الربع الرابع وبالتالي زاويته

$$\text{استعمل الآلة الحاسبة} \quad \theta \approx -51.3^\circ$$

بما أن $\mathbf{r}$ يقع في الربع الرابع، كما في الشكل 1.2.7، فإن: $\theta \approx 360^\circ - 51.3^\circ = 308.7^\circ$



الشكل 1.2.6



الشكل 1.2.7

زوايا الاتجاه
للمتجهات

تحقق منه فهمك

المتجهات 1

أوجد زاوية اتجاه كلٍّ من المتجهين الآتين مع الاتجاه الموجب لمحور x .

$$\langle -3, -8 \rangle \text{ (7B)}$$

$$-6i + 2j \text{ (7A)}$$

المتجهات 1


لدرج

أوجد زاوية اتجاه كل من المتجهات الآتية مع الاتجاه الموجب لمحور x : (مثال 7)

$$-2i + 5j \quad (30)$$

$$3i + 6j \quad (29)$$

مثال من واقع الحياة ٨




كرة قدم: يركض حارس مرمى في لعبة كرة القدم للأمام بسرعة 5 m/s ، ليرمي الكرة بسرعة 25 m/s ، بزاوية 40° مع الأفقي . أوجد محصلة السرعة ، واتجاه حركة الكرة .

بما أن اللاعب يتحرك للأمام بشكل مستقيم ، فإن الصورة الإحداثية لمتجه سرعة اللاعب v_1 هي $\langle 5, 0 \rangle$ ، وتكون الصورة الإحداثية لمتجه سرعة الكرة v_2 هي :

$$\begin{aligned} v_2 &= \langle |v_2| \cos \theta, |v_2| \sin \theta \rangle \\ |v_2| &= 25, \theta = 40^\circ \\ &= \langle 25 \cos 40^\circ, 25 \sin 40^\circ \rangle \\ &\approx \langle 19.2, 16.1 \rangle \end{aligned}$$

اجمع المتجهين v_1 ، v_2 جبرياً؛ لتجد متجه محصلة السرعة r .



$$\begin{aligned} r &= v_1 + v_2 \\ &= \langle 5, 0 \rangle + \langle 19.2, 16.1 \rangle \\ &= \langle 24.2, 16.1 \rangle \end{aligned}$$

طول متجه المحصلة هو $|r| = \sqrt{24.2^2 + 16.1^2} \approx 29.1$. وتكون زاوية اتجاه المحصلة مع الأفقي هي θ حيث :

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{16.1}{24.2} \\ \theta &= \tan^{-1} \frac{16.1}{24.2} \approx 33.6^\circ \end{aligned}$$

أي أن محصلة سرعة الكرة هي 29.1 m/s تقريباً ، وتصنع زاوية قياسها 33.6° مع الأفقي تقريباً .

تطبيق
العمليات على
المتجهات

تحقق منه فهمك

المتجهات 1

(8) كرة قدم: أوجد محصلة السرعة، واتجاه حركة الكرة إذا تحرك اللاعب إلى الأمام بسرعة 7 m/s

لدرّب

المتجهات 1


(43) تبرير: إذا كان a, b متجهين متوازيين، فعبر عن كلٍّ من المتجهين بالصورة الإحداثية مبينًا العلاقة بين a, b .

(55) ما طول المتجه الذي نقطة بدايته $(2, 5)$ ، ونقطة نهايته $(-3, -4)$ ؟

$\sqrt{2}$ A $\sqrt{82}$ C




$\sqrt{26}$ B $\sqrt{106}$ D

مسابقات




مقطعة توضيحي

المتجهات 1



المتجهات في المستوى الإحداثي



الواجب المنزلي



