

الضرب الداخلي
والضرب الاتجاهي
للمتجهات في
الفضاء

المتجهات 1

فيما سبق

درست الضرب
الداخلي لمتجهين في
المستوى

والآن

١| أجد الضرب الداخلي لمتجهين
والزاوية بينهما في الفضاء
٢| أجد الضرب الاتجاهي
للمتجهات وأستعمله في إيجاد
المساحة والحجوم


المتجهات 1



لماذا؟

يستعمل طارق المتجهات؛ ليتحقق ممّا إذا كان خطّ سير طائرتين متوازيين أم لا؛ وذلك بمعرفة إحداثيات نقطتي الإقلاع، ونقطتين تصلان إليهما بعد فترة زمنية معينة.

الضرب الداخلي في الفضاء إيجاد الضرب الداخلي لمتجهين في الفضاء يشبه إيجاد لمتجهين في المستوى، وكما هي الحال مع المتجهات في المستوى، يتعامد متجهان غير صفريين في الفضاء، إذا وفقط إذا كان حاصل ضربهما الداخلي صفرًا.



المتجهات 1

مثال 1

أوجد حاصل الضرب الداخلي للمتجهين u, v في كل مما يأتي، ثم حدّد ما إذا كانا متعامدين أم لا:

(b) $u = \langle 3, -3, 3 \rangle, v = \langle 4, 7, 3 \rangle$

$$u \cdot v = 3(4) + (-3)(7) + 3(3) \\ = 12 + (-21) + 9 = 0$$

وبما أن $u \cdot v = 0$ ، فإن u, v متعامدان.

(a) $u = \langle -7, 3, -3 \rangle, v = \langle 5, 17, 5 \rangle$

$$u \cdot v = -7(5) + 3(17) + (-3)(5) \\ = -35 + 51 + (-15) = 1$$

وبما أن $u \cdot v \neq 0$ ، فإن u, v غير متعامدين.

ايجاد الضرب
الداخلي لتحديد
المتجهات
المتعامده

المتجهات 1

تحقق من فهمك

أوجد حاصل الضرب الداخلي للمتجهين u, v في كل مما يأتي، ثم حدّد ما إذا كانا متعامدين أم لا:

$$u = \langle 4, -2, -3 \rangle, v = \langle 1, 3, -2 \rangle \quad (1B)$$

$$u = \langle 3, -5, 4 \rangle, v = \langle 5, 7, 5 \rangle \quad (1A)$$

المتمهات 1

لارب

أوجد الضرب الداخلي للمتجهين u, v في كل مما يأتي، ثم حدد ما إذا كانا متعامدين أم لا: (مثال 1)


(2) $u = \langle 5, 0, -4 \rangle, v = \langle 6, -1, 4 \rangle$

(1) $u = \langle 3, -9, 6 \rangle, v = \langle -8, 2, 7 \rangle$

المتجهات 1

مثال 2

أوجد قياس الزاوية θ بين $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ ، إذا كان: $\mathbf{u} = \langle 3, 2, -1 \rangle, \mathbf{v} = \langle -4, 3, -2 \rangle$ ، إلى أقرب جزء من عشرة.



$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|} \quad \text{الزاوية بين متجهين}$$

$$\mathbf{u} = \langle 3, 2, -1 \rangle, \mathbf{v} = \langle -4, 3, -2 \rangle \quad \cos \theta = \frac{\langle 3, 2, -1 \rangle \cdot \langle -4, 3, -2 \rangle}{|\langle 3, 2, -1 \rangle| |\langle -4, 3, -2 \rangle|}$$

$$\cos \theta = \frac{-4}{\sqrt{14} \sqrt{29}} \quad \text{أوجد الضرب الداخلي، وطول كل من المتجهين}$$

$$\theta = \cos^{-1} \frac{-4}{\sqrt{406}} \approx 101.5^\circ \quad \text{بسّط وحل بالنسبة إلى } \theta$$

أي أن قياس الزاوية بين $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ هو 101.5° تقريبًا.

الزاوية بين
متجهيه في
الفضاء

تحقق منه فهمك

المتجهات 1

(2) أوجد قياس الزاوية بين المتجهين: $u = -4i + 2j + k$, $v = 4i + 3k$ ، إلى أقرب منزلة عشرية. -

المتجهات 1

لنر




أوجد قياس الزاوية θ بين المتجهين u, v في كل مما يأتي، وقرب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة: (مثال 2)

(9) $u = \langle -8, 1, 12 \rangle, v = \langle -6, 4, 2 \rangle$


(8) $u = \langle 6, -5, 1 \rangle, v = \langle -8, -9, 5 \rangle$

مقطعة توضيحي

المتجهات 1



المتجهات 1



الضرب الاتجاهي هو نوع آخر من الضرب بين المتجهات في الفضاء، وبخلاف الضرب الداخلي، فإن **الضرب الاتجاهي** لمتجهين a, b هو متجه وليس عددًا، ويُرمز له بالرمز $a \times b$ ، ويُقرأ a cross b ، ويكون المتجه $a \times b$ عموديًا على المستوى الذي يحوي المتجهين a, b .

الضرب الاتجاهي للمتجهات في الفضاء

مفهوم أساسي

إذا كان: $a = a_1i + a_2j + a_3k, b = b_1i + b_2j + b_3k$ ، فإن الضرب الاتجاهي للمتجهين a, b

هو المتجه: $a \times b = (a_2b_3 - a_3b_2)i - (a_1b_3 - a_3b_1)j + (a_1b_2 - a_2b_1)k$

إذا طبقنا قاعدة حساب قيمة محدّدة من الدرجة الثالثة على المحدّدة أدناه، والتي تتضمن متجهات الوحدة i, j, k ، وإحداثيات كل من a, b ، فإننا نتوصل إلى القاعدة نفسها للمتجه $a \times b$.

$$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

بوضع متجهات الوحدة i, j, k في الصف 1
بوضع إحداثيات a في الصف 2
بوضع إحداثيات b في الصف 3

$$\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} k$$

$$a \times b = (a_2b_3 - a_3b_2)i - (a_1b_3 - a_3b_1)j + (a_1b_2 - a_2b_1)k$$



المتجهات 1

مثال 3

أوجد الضرب الاتجاهي للمتجهين: $\mathbf{u} = \langle 3, -2, 1 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle -3, 3, 1 \rangle$ ، ثم بين أن $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ يعامد كلياً من $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$.

$$\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{v} = -3\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k} \quad \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -2 & 1 \\ -3 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

قاعدة إيجاد قيمة محدّدة الدرجة الثالثة


أوجد قيمة محدّدة الدرجة الثانية

بسّط

الصورة الإحداثية

$$\begin{aligned} &= \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= (-2 - 3)\mathbf{i} - [3 - (-3)]\mathbf{j} + (9 - 6)\mathbf{k} \\ &= -5\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 3\mathbf{k} \\ &= \langle -5, -6, 3 \rangle \end{aligned}$$

ولإثبات أن $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ يعامد كلياً من $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ جبرياً، أوجد الضرب الداخلي $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ مع كل من $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$.



$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v}$$

$$\begin{aligned} &= \langle -5, -6, 3 \rangle \cdot \langle -3, 3, 1 \rangle \\ &= -5(-3) + (-6)(3) + 3(1) \\ &= 15 + (-18) + 3 = 0 \checkmark \end{aligned}$$

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u}$$

$$\begin{aligned} &= \langle -5, -6, 3 \rangle \cdot \langle 3, -2, 1 \rangle \\ &= -5(3) + (-6)(-2) + 3(1) \\ &= -15 + 12 + 3 = 0 \checkmark \end{aligned}$$

بما أن حاصل الضرب الداخلي في الحالتين يساوي صفراً، فإن $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ عمودي على كل من $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$.

تنبيه!
الضرب الاتجاهي
يطبق الضرب الاتجاهي على
المتجهات في نظام الإحداثيات
الثلاثي الأبعاد فقط، ولا
يطبق على المتجهات في
المستوى الإحداثي.

تحقق منه فهمك

المتجهات 1

أوجد الضرب الاتجاهي للمتجهين u, v في كل مما يأتي، ثم بين أن $u \times v$ يعامد كلا من u, v .

(3B) $u = \langle -2, -1, -3 \rangle, v = \langle 5, 1, 4 \rangle$ مزارعة

(3A) $u = \langle 4, 2, -1 \rangle, v = \langle 5, 1, 4 \rangle$

المتجهات 1

لأرب

أوجد الضرب الاتجاهي للمتجهين u, v في كل مما يأتي، ثم بين أن $u \times v$ عمودي على كل من u, v : (مثال 3)

(13) $u = \langle 4, 7, -2 \rangle, v = \langle -5, 9, 1 \rangle$

(12) $u = \langle -1, 3, 5 \rangle, v = \langle 2, -6, -3 \rangle$

المتجهات 1

مثال 4

أوجد مساحة متوازي الأضلاع الذي فيه: $u = 2i + 4j - 3k, v = i - 5j + 3k$ ضلعان متجاوران.

الخطوة 1 أوجد $u \times v$

$$u = 2i + 4j - 3k, v = i - 5j + 3k \quad u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 4 & -3 \\ 1 & -5 & 3 \end{vmatrix}$$

بإيجاد قيمة محدّدة الدرجة الثالثة

$$= \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -5 & 3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} k$$

بإيجاد قيمة محدّدة الدرجة الثانية

$$= -3i - 9j - 14k$$

الخطوة 2 أوجد طول $u \times v$



طول متجه في الفضاء

$$|u \times v| = \sqrt{(-3)^2 + (-9)^2 + (-14)^2}$$

$$= \sqrt{286} \approx 16.91$$

بسّط

أي أن مساحة متوازي الأضلاع في الشكل 1.5.1 ، تساوي 16.91 وحدة مربعة تقريباً.



الشكل 1.5.1

مساحة متوازي
أضلاع في
الفضاء



تحقق من فهمك

التمارين 1

(4) أوجد مساحة متوازي الأضلاع الذي فيه: $u = -6i - 2j + 3k, v = 4i + 3j + k$ ضلعان متجاوران .

المتجهات 1



لدرّب

أوجد مساحة متوازي الأضلاع الذي فيه u, v ضلعان متجاوران في كلّ مما يأتي: (مثال 4)

(17) $u = \langle 4, 3, -1 \rangle, v = \langle 7, 2, -2 \rangle$

(16) $u = \langle -9, 1, 2 \rangle, v = \langle 6, -5, 3 \rangle$

المتجهات 1



الضرب القياسي الثلاثي إذا التقت ثلاثة متجهات في مستويات مختلفة في نقطة البداية، فإنها تكون أحرفاً متجاورة لمتوازي سطوح، وهو عبارة عن مجسم له ستة أوجه، كل وجه منها على شكل متوازي أضلاع كما في الشكل 1.5.2 أدناه، إن القيمة المطلقة للضرب القياسي الثلاثي لهذه المتجهات يُمثل حجم متوازي السطوح.

مفهوم أساسي

الضرب القياسي الثلاثي

إذا كان: $t = t_1i + t_2j + t_3k$, $u = u_1i + u_2j + u_3k$, $v = v_1i + v_2j + v_3k$

$$t \cdot (u \times v) = \begin{vmatrix} t_1 & t_2 & t_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

فإن الضرب القياسي الثلاثي للمتجهات t, u, v يُعرف كالاتي

المتجهات 1

مثال 5

أوجد حجم متوازي السطوح الذي فيه: $t = 4i - 2j - 2k$, $u = 2i + 4j - 3k$, $v = i - 5j + 3k$ أحرف متجاورة.

$$\begin{aligned} t &= 4i - 2j - 2k \\ u &= 2i + 4j - 3k \\ v &= i - 5j + 3k \end{aligned} \quad t \cdot (u \times v) = \begin{vmatrix} 4 & -2 & -2 \\ 2 & 4 & -3 \\ 1 & -5 & 3 \end{vmatrix}$$



أوجد قيمة محدّدة المصفوفة من الرتبة 3×3

بسّط

$$= \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -5 & 3 \end{vmatrix} (4) - \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} (-2) + \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} (-2)$$

$$= -12 + 18 + 28 = 34$$

أي أن حجم متوازي السطوح في الشكل 1.5.2 هو $|t \cdot (u \times v)|$ ، ويساوي 34 وحدة مكعبة.



الشكل 1.5.2

تحقق منه فهمك

المتجهات 1

(5) أوجد حجم متوازي السطوح الذي فيه: $t = 2j - 5k$, $u = -6i - 2j + 3k$, $v = 4i + 3j + k$

المتجهات 1

لدرّب

أوجد حجم متوازي السطوح الذي فيه t, u, v أحرف متجاورة في كلّ مما يأتي: (مثال 5)

(21) $t = \langle 2, -3, -1 \rangle, u = \langle 4, -6, 3 \rangle, v = \langle -9, 5, -4 \rangle$

(20) $t = \langle -1, -9, 2 \rangle, u = \langle 4, -7, -5 \rangle, v = \langle 3, -2, 6 \rangle$

لدرج


المختبرات 1

54) أيُّ مما يأتي متجهان متعامدان؟




- A $\langle 1, 0, 0 \rangle , \langle 1, 2, 3 \rangle$
- B $\langle 1, -2, 3 \rangle , \langle 2, -4, 6 \rangle$
- C $\langle 3, 4, 6 \rangle , \langle 6, 4, 3 \rangle$
- D $\langle 3, -5, 4 \rangle , \langle 6, 2, -2 \rangle$

43) تحدّد: إذا كان: $u = \langle 4, 6, c \rangle , v = \langle -3, -2, 5 \rangle$ ، فأوجد قيمة c التي تجعل: $u \times v = 34i - 26j + 10k$.

مسابقات




مقطعة توضيحي



نظام الإحداثيات الثلاثي الأبعاد

الثلاثي المرتب

شكل كتابة النقطة في الفضاء



الضرب القياسي الثلاثي

$$\mathbf{t} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \begin{vmatrix} t_1 & t_2 & t_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

الضرب الاتجاهي

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b}$$

متجه عمودي على المستوى الذي يحوي المتجهين

المختبرات 1

الواجب المنزلي



